

# Ex. VII.8.4

Contexte : d'objectif de cet exercice est de souligner quelques points importants sur la notion de "somme directe" de sous-espaces vectoriels.

Les énoncés pertinents du cours sont ceux nommés VII.1.22 à VII.1.27 et en particulier la Prop. VII.1.24 et la ~~Def~~ Définition VII.1.25.

Sur l'utilisation de la Prop. VII.1.24 : d'énoncé de la Prop. VII.1.4 donne trois moyens de vérifier qu'une somme de s.e.v. est unique. Attention cependant : le troisième critère est très diff. à utiliser dès qu'on a à traiter trois s.e.v. ou plus.

de cas de deux s.e.v. :

Soit  $E$  un  $K$ -e.v. et  $F$  et  $G$  deux s.e.v. de  $E$ . Le troisième critère de la Prop. VII.1.24 dit que  $F$  et  $G$  sont en somme directe si, et seulement si  $F \cap G = \{0\}$ . Il est donc facile à vérifier.

de cas de trois s.e.v. :

Soit  $E$  un  $K$ -e.v. et  $F, G, H$  trois s.e.v. de  $E$ . Le troisième critère <sup>(de la Prop. VII.1.24)</sup> assure que  $F, G$  et  $H$  sont en somme directe si, et seulement si :

~~Les~~  $F \cap (G+H)$ ,  $G \cap (F+H)$  et  $H \cap (F+G)$  sont tous égaux à  $\{0\}$ . Pour s'en convaincre, il faut donc calculer  $G+H$ ,  $F+H$ ,  $F+G$  et ensuite les trois intersections ci-dessus.

C'est souvent très pénible. Pour cette raison, on utilisera plutôt le premier critère.

La même chose vaut (en plus) pour quatre ou plus.

**Attention:** Si  $E$  est un  $\mathbb{K}$ -ev et  $F, G, H$  des sev de  $E$ . Il se peut fort bien que l'on ait  $F \cap G = F \cap H = G \cap H = \{0\}$  et que, pourtant,  $F, G, H$  ne soient pas en somme directe.

C'est le cas, par ex., lorsque  $E = \mathbb{R}^2$   
 $F = \mathbb{R}(1,0)$ ,  $G = \mathbb{R}(1,1)$ ,  $H = \mathbb{R}(0,1)$ .

En effet, l'identité

$$-(1,0) + (1,1) - (0,1) = (0,0)$$

contredit le critère (i) de la Prop. 11.14

Comme conseillé plus haut, pour montrer que  $F, G$  et  $H$  sont en somme directe, on va utiliser le premier critère de la Prop. VI.1.24.

On a donc des applications  $f, g, h$  respectivement dans  $F, G$  et  $H$ , on suppose que  $f+g+h=0$  et on doit montrer que cela entraîne que  $f=g=h=0$ .

L'égalité  $f+g+h=0$  signifie que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) + g(x) + h(x) = 0.$$

Mais, par déf. de  $G$  et  $H$ ,  $g(0) = h(0) = 0$ . On a donc  $f(0) = 0$ . Et, comme  $f$  est constante,  $f = 0$ .

Soit maintenant  $x > 0$ . On a  $f(x) = 0$  (cf. ci-dessus) et  $g(x) = 0$  par déf. de  $G$ . Donc  $h(x) = 0$ . Ceci vaut aussi, par définition ~~et~~ de  $H$ , pour tout  $x \leq 0$ . Donc  $h = 0$ .

On démontre de la même façon que  $g = 0$ . Le premier critère de la Prop. VI.1.24 assure alors que la somme de  $F, G$  et  $H$  est directe :

$$F + G + H = F \oplus G \oplus H \subseteq E.$$

④ Il reste à démontrer que  $F + G + H = E$ , c'est à dire que toute application de  $\mathbb{R}$  de  $\mathbb{R}$  peut être "décomposée" comme somme d'une application de  $F$ , d'une dans  $G$  et d'une dans  $H$ .

Soit  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une telle application. On a les applications suivantes :

$$f_0: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad ; \text{ c'est un élt de } F ;$$

$$x \mapsto f(0)$$

$$f^+: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad , \text{ c'est un élt de } G ;$$

$$x \mapsto 0 \quad \text{si } x \geq 0$$

$$x \mapsto f(x) - f(0) \quad \text{si } x < 0$$

$$f^-: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad , \text{ c'est un élément de } H$$

$$x \mapsto 0 \quad \text{si } x \leq 0$$

$$x \mapsto f(x) \quad \text{si } x > 0$$

Il est clair, par ailleurs, que

$$f = f_0 + f^+ + f^-.$$

Donc  $E = F + G + H$ .

Concl.:  $E = F \oplus G \oplus H$ .