

## Feuille d'exercices 5

*Remarque* : Tous les exercices ne seront pas traités en séance de TD, j'indiquerai au fur et à mesure sur la page du forum (<http://cours-jussieu-nombres.monforum.com/cours-et-td-2008-vf7.html>) les exercices que nous aurons abordés.

**Une série de Dirichlet** est une série de la forme

$$F(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha_n}{n^s}$$

La variable  $s$  peut être réelle ou complexe ; ici nous ne considérerons que  $s$  réel. La somme de la série  $F(s)$  est appelée la fonction génératrice de  $\alpha_n$ . La théorie des séries de Dirichlet met en jeu des questions délicates de convergence. Nous ne traiterons pas ces questions dans cette feuille et on renvoie à la feuille 6 pour quelques uns des résultats connus sur ce sujet. Pour la suite nous utiliserons simplement les faits élémentaires suivants :

- (i) Si la série  $\sum \alpha_n n^{-s}$  est absolument convergente pour  $s_0$ , elle est alors absolument convergente pour tout  $s$  tel que  $s \geq s_0$ .
- (ii) Si la série  $\sum \alpha_n n^{-s}$  est absolument convergente pour  $s > s_0$ , alors la série peut être différenciée terme à terme pour tout  $s > s_0$ .
- (iii) Si  $\sum_n \alpha_n n^{-s} = 0$  pour  $s > s_0$  alors  $\alpha_n = 0$  pour tout  $n$ .
- (iv) Deux séries de Dirichlet absolument convergentes peuvent être multipliées suivant la règle

$$\left(\sum \alpha_n n^{-s}\right)\left(\sum \beta_n n^{-s}\right) = \sum \gamma_n n^{-s}$$

avec  $\gamma_n = \sum_{\substack{n_1, n_2 \\ n_1 n_2 = n}} \alpha_{n_1} \beta_{n_2}$ .

**Exercice 1.** (1) Soit  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$  une fonction multiplicative, i.e.  $f(nm) = f(n)f(m)$  pour  $(n, m) = 1$ . On suppose en outre que la série  $\sum_n |f(n)|n^{-s}$  est absolument convergente. Montrez l'égalité

$$\sum_n f(n)n^{-s} = \prod_p (1 + f(p)p^{-s} + f(p^2)p^{-2s} + \dots)$$

Sous les mêmes hypothèses de convergence, si de plus on a  $f(mn) = f(m)f(n)$  pour tout  $n, m$ , montrer que

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n)n^{-s} = \prod_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{1 - f(p)p^{-s}}$$

En déduire que la série  $\sum_{p \in \mathcal{P}} 1/p$  est divergente.

(2) Exemples :

- (a)  $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$  converge pour  $s > 1$ . On peut montrer cf. plus loin que  $\zeta(2n) = \frac{2^{2n-1} B_n \pi^{2n}}{(2n)!}$ , et que  $\zeta(s)(s-1) \rightarrow_{s \rightarrow 1} 1$ .
- (b) Soit  $\mu : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$  définie par  $\mu(1) = 1$ ,  $\mu(n) = 0$  si  $n$  a un facteur carré et sinon  $\mu(p_1 p_2 \dots p_k) = (-1)^k$  pour  $p_1, \dots, p_k$  distincts deux à deux. Montrer que  $\mu$  est multiplicative et que  $\sum_{d|n} \mu(d)$  vaut 1 si  $n = 1$  et 0 si  $n > 1$ . En déduire que

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s}$$

(c) Montrer que

$$\frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varphi(n)}{n^s}$$

pour  $s > 2$  et où  $\varphi$  est l'indicatrice d'Euler.

(d) Montrer que

$$\zeta^2(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d(n)}{n^s}$$

pour  $s > 1$  et où  $d(n)$  est le nombre de diviseur de  $n$  en incluant 1 et  $n$ .

(e) Montrer que

$$\zeta(s)\zeta(s-k) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma_k(n)}{n^s}$$

pour  $s > 2$  et où  $\sigma_k(n)$  est la somme des puissances  $k$ -ième des diviseur de  $n$ .

(3) Formule d'inversion de Möbius : pour  $f$  une fonction multiplicative soit

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d)$$

Prouver la formule d'inversion de Möbius

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d)\mu\left(\frac{n}{d}\right)$$

et donner en une interprétation avec les séries génératrices.

Réciproquement si  $g : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$  est telle que  $f(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right)g(d)$  pour tout  $n$ , montrer que  $g(n) = \sum_{d|n} f(d)$ .

(4) D'autres exemples :

(a) Soit  $\Lambda(n) = \log p$  si  $n = p^m$  et 0 sinon. Montrer que

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum \Lambda(n)n^{-s}$$

pour  $s > 1$ . En déduire que

$$\Lambda(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) \log d \quad \log n = \sum_{d|n} \Lambda(d)$$

(b) Soit  $d_k(n)$  le nombre de façons d'exprimer  $n$  comme le produit de  $k$  facteurs positifs (parmi ceux-ci un nombre quelconque peuvent être égaux à 1). Montrer que pour  $s > 1$  :

$$\zeta^k(s) = \sum \frac{d_k(n)}{n^s}$$

(c) Soit  $l(n) = (-1)^\rho$  où  $\rho$  est le nombre de facteurs premiers de  $n$ , où les facteurs multiples sont comptés avec multiplicité. Montrer que pour  $s > 1$  :

$$\frac{\zeta(2s)}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} l(n)n^{-s}$$

(d) Montrer que

$$\frac{\zeta(s)}{\zeta(2s)} = \sum |\mu(n)|n^{-s}$$

puis que pour  $s > 1$

$$\frac{\zeta(s)}{\zeta(ks)} = \sum q_k(n)n^{-s}$$

où  $q_k(n) = 0$  ou  $1$  suivant que  $n$  a ou n'a pas de puissance  $k$ -ième comme facteur.

**Exercice 2.** Soit  $\varphi$  l'indicatrice d'Euler :

(i) Montrez qu'il existe deux constantes  $\kappa, c$  telles que pour tout  $n \geq 1$ , on ait  $\varphi(n) \geq cn^\kappa$ .

(ii) Montrez que pour  $s > \kappa^{-1}$  réel, on a

$$\sum_{a \geq 0} \varphi(p^a)^{-s} = 1 + \frac{1}{(p-1)^s(1-p^{-s})}.$$

(iii) On pose  $G(s) = \prod_p (1 + (p-1)^{-s} - p^{-s})$  où le produit est étendu à l'ensemble des nombres premiers. Vérifiez que

$$\sum_{n \geq 1} \varphi(n)^{-s} = \zeta(s)G(s)$$

où  $\zeta$  est la fonction zêta de Riemann.

**Exercice 3.** Soit  $k$  un entier  $\geq 0$  et  $s$  un nombre réel  $> k$ . Pour  $n \geq 1$ , on pose  $\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k$ .

(i) Vérifiez que  $\zeta(s)\zeta(s-k) = \sum_{n \geq 1} \frac{\sigma_k(n)}{n^s}$ .

(ii) Montrez que si  $m$  et  $n$  sont deux entiers positifs premiers entre eux, on a  $\sigma_k(mn) = \sigma_k(m)\sigma_k(n)$ .

(iii) Calculez  $\sigma_k(p^a)$  quand  $p$  est premier et  $a \geq 0$ .

(iv) Vérifiez que

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sigma_k(n)}{n^s} = \prod_p (1 - (p^k + 1)p^{-s} + p^{k-2s})^{-1}.$$

**Exercice 4.** En admettant le théorème des nombres premiers  $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}$ , donnez des équivalents quand  $N$  et  $x$  tendent vers l'infini de :

$$p_N, \quad \sum_{n=1}^N p_n, \quad \sum_{p \leq x} p, \quad \sum_{p \leq x} \ln p, \quad \sum_{p \leq x} p^{-1}, \quad \sum_{p \leq x} \frac{\ln p}{p}$$

où  $p_n$  désigne le  $n$ -ième nombre premier. On désigne par  $d_n$  le ppcm des entiers  $1, 2, 3, \dots, n$  : vérifiez que  $\ln d_n \sim n$  pour  $n \rightarrow \infty$ .

### Fonction zêta de Riemann et fonctions $L$

La fonction zêta de Riemann est définie pour  $\text{Re}(s) > 1$  par la série  $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$ . Cette fonction et ses généralisations (fonctions zêta de Dedekind, de Hasse-Weil, et plus généralement les fonctions  $L$  de Dirichlet, des formes modulaires, représentations automorphes...) jouent un rôle central en arithmétique. En particulier leurs valeurs aux entiers contiennent une multitude de renseignements concernant l'arithmétique des objets auxquelles elles sont en fait attachées.

**Exercice 5. Prolongement analytique et valeurs aux entiers négatifs et aux entiers positifs pairs** Soit  $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{s-1} dt$  la fonction  $\Gamma$  d'Euler.

- (1) Montrer que  $\Gamma$  est holomorphe pour  $\operatorname{Re}(s) > 0$  et satisfait l'équation fonctionnelle  $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ . En déduire que l'on peut la prolonger méromorphiquement sur  $\mathbb{C}$  tout entier.
- (2) Montrer que si  $\operatorname{Re}(s) > 1$  alors

$$\zeta(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{+\infty} \frac{t^{s-1}}{e^t - 1} dt$$

- (3) Soit  $f$  une fonction  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}_+$  à décroissance rapide à l'infini. Montrer que la fonction

$$L(f, s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{+\infty} f(t) t^{s-1} dt$$

définie pour  $\operatorname{Re}(s) > 0$ , admet un prolongement holomorphe à  $\mathbb{C}$  tout entier et que pour  $n \in \mathbb{N}$ , on a  $L(f, -n) = (-1)^n f^{(n)}(0)$ .

- (4) Déduire de (3) que

(i)  $\zeta$  a un prolongement méromorphe à  $\mathbb{C}$  tout entier, holomorphe en dehors d'un pôle simple en  $s = 1$  de résidu 1.

(ii) pour  $n \in \mathbb{N}$ , on a  $\zeta(-n) = (-1)^n \frac{B_{n+1}}{n+1} \in \mathbb{Q}$ , où  $B_n$  est le  $n$ -ième nombre de Bernouilli, i.e.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{B_n t^n}{n!} = \frac{t}{e^t - 1}$

$$B_0 = 1, \quad B_1 = -\frac{1}{2}, \quad B_2 = \frac{1}{6}, \quad B_4 = -\frac{1}{30}, \quad \dots, \quad B_{12} = -\frac{691}{2730}$$

- (5) En vous servant de l'égalité classique

$$\pi \coth \pi z = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left( \frac{1}{z+n} + \frac{1}{z-n} \right)$$

montrer que pour  $k \geq 1$  entier, on a

$$\pi^{-2k} \zeta(2k) = \frac{2^{2k-1} (-1)^k}{(2k)!} B_{2k} \in \mathbb{Q}$$

**Quelques résultats connus sur  $\zeta$**  : la philosophie générale est que "les fonctions  $L$  savent tout", reste à savoir les faire parler.

- Kummer : si  $p \geq 3$  premier ne divise pas  $\zeta(-1), \zeta(-3), \dots, \zeta(2-p)$  alors  $p$  ne divise pas le nombre de classes d'idéaux du corps  $\mathbb{Q}(e^{2i\pi/p})$ ;
- Mazur et Wiles : ont donné une formule faisant intervenir le groupe des classes d'idéaux des  $\mathbb{Q}(e^{2i\pi/p^n})$ , pour calculer la puissance de  $p$  qui divise exactement le numérateur de  $\zeta(-2k-1)$ ;
- Rivoal : il existe une infinité de  $\zeta(2k+1)$  qui sont irrationnels;
- **Hypothèse de Riemann** : hormis les zéros triviaux en les  $-2n$ , tous les autres sont sur la droite critique  $\operatorname{Re}(s) = 1/2$  : ce que l'on sait :
  - les zéros non triviaux sont dans la bande critique  $0 < \operatorname{Re}(s) < 1$  et même dans une certaine zone...

- il y a une infinité de zéros sur la droite critique ;
- au moins 1/3 des zéros sont sur la droite critique.

Elle a des applications très importantes sur la répartition des nombres premiers :

$$\pi(x) = \text{Li}(x) + \mathcal{O}(\sqrt{x} \log x)$$

où  $\text{Li}(x) := \int_2^x \frac{dt}{\ln t}$  : le théorème des nombres premiers donne  $\pi(x) \sim \text{Li}(x)$ .

### Généralisations

- **La fonction zêta de Dedekind d'un corps de nombres** : soit  $K/\mathbb{Q}$  une extension finie d'anneau des entiers  $\mathcal{O}_K$ . On rappelle que pour un idéal  $\mathfrak{A}$  de  $\mathcal{O}_K$ , on note  $N(\mathfrak{A})$  le cardinal de  $\mathcal{O}_K/\mathfrak{A}$ . La fonction zêta de Dedekind  $\zeta_K$  est alors

$$\zeta_K(s) = \sum_{\mathfrak{A} \subset \mathcal{O}_K} N(\mathfrak{A})^{-s} = \prod_{\mathfrak{P} \subset \mathcal{O}_K} (1 - N(\mathfrak{P})^{-s})^{-1}$$

où la somme porte sur les idéaux non nuls de  $\mathcal{O}_K$  et le produit sur les idéaux premiers de  $\mathcal{O}_K$  : si  $K = \mathbb{Q}$ , on retombe sur la fonction  $\zeta$  de Riemann. On a les résultats suivants :

- $\zeta_K$  admet un prolongement méromorphe à  $\mathbb{C}$  tout entier, holomorphe en dehors d'un pôle simple en  $s = 1$  ;
- le résidu en  $s = 1$  de  $\zeta_K$  est donné par la formule analytique du nombre de classes :

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s - 1) \zeta_K(s) = \frac{2^{r_1} (2\pi)^{r_2} h_K R_K}{\omega_K \sqrt{\Delta_K}}$$

où  $\Delta_K$  est le discriminant de  $K$ ,  $r_1$  et  $2r_2$  sont respectivement le nombre de racines réelles et complexes du polynôme minimal d'un élément primitif,  $\omega_K$  est le cardinal du sous-groupe de torsion du groupe des unités,  $h_K$  est le cardinal du groupe des classes d'idéaux et  $R_K$  est le régulateur ;

- $\zeta_K$  vérifie l'équation fonctionnelle  $\xi_K(s) = \xi_K(1 - s)$  avec

$$\xi_K(s) = \left( \frac{\Gamma(s/2)}{\pi^{s/2}} \right)^{r_1} \cdot \left( \frac{\Gamma(\frac{s+1}{2})}{\pi^{\frac{s+1}{2}}} \right)^{r_2} \cdot \Delta_K^{s/2} \cdot \zeta_K(s)$$

- si  $k \leq 0$ , on a  $\zeta_K(k) \in \mathbb{Q}$  ; si  $K$  est totalement réel alors  $\pi^{-2k[K:\mathbb{Q}]} \zeta_K(2k) \in \sqrt{\Delta_K} \mathbb{Q}$  pour  $k \geq 1$  entier.

- **La fonction zêta de Hasse-Weil** : soit  $f_1, \dots, f_n \in \mathbb{Z}[X_1, \dots, X_d]$ . On définit pour tout premier  $p$  et tout  $r \geq 1$  :

$$N_{p,r} = |\{x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{F}_p^d / f_1(x) = \dots = f_n(x) = 0\}|$$

ainsi que la fonction zêta

$$Z_p(T) = \exp\left(\sum_{r=1}^{+\infty} \frac{N_{p,r}}{r} T^r\right)$$

On a alors les faits suivants :

- **conjectures de Weil prouvées par l'école de Grothendieck** :  $Z_p(T) \in \mathbb{Q}(T)$  et si  $(f_1, \dots, f_n) \cap \mathbb{Z} = 0$ , alors il existe  $M \geq 0$  tel que si  $p \geq M$ , il existe des polynômes  $P_{i,p}, Q_{i,p}$  à coefficients entiers de terme constant égal à 1 dont tous les zéros sont de valeur absolue  $p^{-i/2}$  avec

$$Z_p(T) = \prod_{i=0}^{2d} \frac{P_{i,p}(T)}{Q_{i,p}(T)}$$

- pour  $i$  fixé, en multipliant le produit  $\prod_{p \geq M} \frac{P_{i,p}(p^{-s})}{Q_{i,p}(p^{-s})}$  par un produit de facteurs d'Euler pour  $p < M$  et un produit de facteurs Gamma du type  $\pi^{-(s+k)/2} \Gamma(\frac{s+k}{2})$ , on construit une fonction  $L_i(s)$  que l'on conjecture vérifier les deux points suivants :
  - (i)  $L_i(s)$  a un prolongement méromorphe à tout le plan complexe et une équation fonctionnelle du type  $L_i(s) = \pm N_i^{-s} L_i(i+1-s)$  où  $N_i$  est un entier dont tous les diviseurs premiers sont  $\leq M$  ;
  - (ii) **Hypothèse de Riemann généralisée** : les zéros et les pôles de  $L_i(s)$  sont tous sur la droite citique  $\text{Re}(s) = \frac{i+1}{2}$  (et en  $\frac{i}{2}, \frac{i}{2} + 1$  pour  $i$  pair)
- **Fonctions  $L$  des formes modulaires** : si  $\Gamma$  est un sous-groupe d'indice fini de  $SL_2(\mathbb{Z})$  et si  $k \in \mathbb{Z}$ , une fonction  $f : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ , où  $\mathcal{H}$  est le demi-plan de Poincaré, est dite **modulaire de poids  $k$  pour  $\Gamma$** , si elle est  $\mathcal{C}^\infty$  et si l'on a :
  - (i)  $f(z) = f|_k \gamma(z) := (cz+d)^{-k} f(\gamma z)$  pour tout  $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$  ;
  - (ii)  $f$  est à croissance lente à l'infini, i.e. quelque soit  $\gamma \in SL_2(\mathbb{Z})$ , quels que soient  $a < b \in \mathbb{R}$ , il existe  $C \in \mathbb{R}$  tel que l'on ait au voisinage de  $y = +\infty$

$$\sum_{z \in [a+iy, b+iy]} |f|_k \gamma(z)| = O(y^C).$$

On note  $M_k(\Gamma)$  le  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel des formes modulaires de poids  $k$ . Il existe en particulier  $N \in \mathbb{N} - \{0\}$  tel que  $f(z+N) = f(z)$  et comme  $f$  est  $\mathcal{C}^\infty$ , elle est somme de sa série de Fourier

$$f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n(f, y) e^{2i\pi n x / N}$$

Comme  $f$  est modulaire, la fonction  $\tilde{f}(q_N) = f(N \frac{\log q_N}{2i\pi})$  avec  $q_N = e^{2i\pi z / N}$  et on peut écrire  $f$  sous la forme

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n(f) q_N^n$$

avec  $a_n(f, y) = a_n(f) e^{-2\pi n y / N}$  et la croissance lente des coefficients de Fourier montrer que  $a_n(f) = 0$  si  $n < 0$ .

Soit  $f = \sum_{m=0}^{+\infty} c_m(f) q^m \in M_{2k}$  ; la fonction  $L$  de  $f$  est définie par la formule

$$L(f, s) = \sum_{m=1}^{+\infty} c_m(f) m^{-s} \quad \text{et on pose } \Lambda(f, s) = \frac{\Gamma(s)}{(2\pi)^s} L(f, s)$$

On a alors les faits suivantes :

- $L(f, s)$  converge absolument pour  $\text{Re}(s) > 2k$  et définit une fonction holomorphe ;
- $\Lambda(f, s)$  admet un prolongement méromorphe à  $\mathbb{C}$  tout entier et satisfait l'équation fonctionnelle

$$\Lambda(f, s) = (-1)^k \Lambda(f, 2k - s)$$

Elle est holomorphe en dehors de pôles simples en  $s = 0$  et  $s = 2k$  de résidu respectifs  $-c_0(f)$  et  $(-1)^k c_0(f)$ . Par ailleurs elle tend vers 0 à l'infini dans toute bande de la forme  $a < \text{Re}(s) < b$ .

Par ailleurs, on a un théorème réciproque, i.e. si  $(c_m)_{m \in \mathbb{N}}$  est une suite de nombre complexe telle que la série de Dirichlet  $L(s) = \sum_{m=1}^{+\infty} c_m m^{-s}$  vérifie les faits précédents, alors  $\sum_{m=0}^{+\infty} c_m q^m \in M_{2k}$ .

*Remarque :* La théorie des opérateurs de Hecke permet d'exprimer  $L(f, s)$  comme un produit Eulérien quand  $f$  est un vecteur propre de ces opérateurs.

- **Fonctions  $L$  automorphes de Langlands** : à une forme modulaire comme ci-dessus, on peut associer une représentation dite automorphe pour  $GL_2$ . À toute représentation automorphe de par exemple  $GL_n$ , on peut associer des fonctions  $L$  qui sont les outils essentiels pour comprendre les groupes de Galois (non abéliens).

## 1 Solutions

1 (1) Comme  $f(n)f(1) = f(n)$ , en prenant  $n$  tel que  $f(n) \neq 0$ , on obtient  $f(1) = 1$ . La série  $\sum_k f(p^k)p^{-ks}$  est par hypothèse, absolument convergente et égale à  $(1 - f(p)p^{-s})^{-1}$  si  $f(mn) = f(m)f(n)$  pour tout  $n, m$ . Pour tout entier  $N$  soit

$$u_N(s) = \prod_{p \leq N} \left( \sum_k f(p^k)p^{-ks} \right)$$

c'est un produit fini de séries absolument convergentes que l'on peut développer en utilisant la multiplicativité de  $f$ , soit  $u_N(s) = \sum_n f(n)n^{-s}$  où la somme porte sur les  $n$  dont les facteurs premiers sont inférieurs à  $N$ .

Si la série  $\sum_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{p}$  converge alors la série des  $\log(1 - 1/p)$  converge aussi et donc le produit  $\prod(1 - 1/p)^{-1}$  converge. On en déduit alors que la série  $\sum_n 1/n$  converge, ce qui est faux.

(2) (a) On a  $\zeta(s) = \prod_{p \in \mathcal{P}} (1 - p^{-s})^{-1}$ .

(b) La multiplicativité de  $\mu$  est évidente. Soit  $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r} > 1$ , on a alors

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \mu(1) + \sum_{i=1}^r \mu(p_i) + \sum_{\substack{1 \leq i, j \leq r \\ i \neq j}} \mu(p_i p_j) + \cdots + \mu(p_1 \cdots p_r)$$

soit

$$\sum_{d|n} \mu(d) = 1 - C_r^1 + C_r^2 - \cdots + (-1)^r C_r^r = (1 - 1)^r = 0$$

Le cas  $n = 1$  est trivial.

On a d'après ce qui précède

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \prod_p (1 - p^{-s}) = \prod_p (1 + \mu(p)p^{-s} + \mu(p^2)p^{-2s} + \cdots) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(n)n^{-s}$$

On remarque que l'on retrouve le calcul de  $\sum_{d|n} \mu(d)$  en étudiant l'égalité  $\zeta(s) \frac{1}{\zeta(s)} = 1$ .

(c) On a

$$\frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} nn^{-s} \sum_{n=1}^{\infty} \mu(n)n^{-s} = \sum_{n=1}^{\infty} f(n)n^{-s}$$

avec  $f(n) = \sum_{d|n} d\mu\left(\frac{n}{d}\right) = \varphi(n)$ .

(d) est un cas particulier de (e) pour  $k = 0$ . On a

$$\zeta(s)\zeta(s-k) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} \sum_{n=1}^{\infty} n^k n^{-s} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} \sum_{d|n} d^k$$

(3) On a

$$\begin{aligned} \sum_{d|n} \mu(d)g\left(\frac{n}{d}\right) &= \sum_{d|n} \left( \sum_{d'| \frac{n}{d}} f(d') \right) = \sum_{dd'|n} \mu(d)f(d') \\ &= \sum_{d'|n} f(d') \left( \sum_{d| \frac{n}{d'}} \mu(d) \right) = f(n) \end{aligned}$$

Réciproquement on a

$$\begin{aligned} \sum_{d|n} f(d) &= \sum_{d|n} \left( \sum_{d'| \frac{n}{d}} \mu(d')g\left(\frac{n}{dd'}\right) \right) = \sum_{dd'|n} \mu(d')g\left(\frac{n}{dd'}\right) \\ &= \sum_{k|n} \mu(l)g\left(\frac{n}{k}\right) = \sum_{k|n} g\left(\frac{n}{k}\right) \left( \sum_{l|k} \mu(l) \right) = g(n) \end{aligned}$$



*Interprétation analytique* : soit  $F(s)$  et  $G(s)$  les fonctions génératrices de  $f(n)$  et  $g(n)$ . Si les séries sont absolument convergentes on a :

$$F(s)\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} f(n)n^{-s} \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} \sum_{d|n} f(d) = G(s)$$

et donc

$$F(s) = \frac{G(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} g(n)n^{-s} \sum_{n=1}^{\infty} \mu(n)n^{-s} = \sum_{n=1}^{\infty} h(n)n^{-s}$$

avec  $h(n) = \sum_{d|n} g(d)\mu(\frac{n}{d}) = f(n)$ .

(4) (a) On a  $\log \zeta(s) = \sum_p \log(\frac{1}{1-p^{-s}})$ . En différenciant par rapport à  $s$  on obtient

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_p \frac{\log p}{p^s - 1}$$

que l'on écrit sous la forme  $\sum_p \log p \sum_{n=1}^{\infty} p^{-ns}$ . La double série  $\sum \sum p^{-ns} \log p$  est absolument convergente quand  $s > 1$  de sorte que

$$\sum_{p,n} p^{-ns} \log p = \sum_n \Lambda(n)n^{-s}$$

Or  $-\zeta'(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} \log n$  et donc

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda(n)n^{-s} &= \sum_{n=1}^{\infty} \mu(n)n^{-s} \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} \log n \\ \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} \log n &= \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda(n)n^{-s} \end{aligned}$$

et donc

$$\begin{aligned} \Lambda(n) &= \sum_{d|n} \mu(\frac{n}{d}) \log d \\ \log n &= \sum_{d|n} \Lambda(d) \end{aligned}$$

*Remarque* : En différenciant  $\zeta^{-1}(s)$  on obtient  $\frac{\zeta'(s)}{\zeta^2(s)} = \frac{-1}{\zeta(s)} \frac{-\zeta'(s)}{\zeta(s)}$  ce qui donne

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(n) \log n n^{-s} = - \sum_{n=1}^{\infty} \mu(n)n^{-s} \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda(n)n^{-s}$$

et donc

$$-\mu(n) \log n = \sum_{d|n} \mu(\frac{n}{d}) \Lambda(d)$$

De la même façon en écrivant  $\frac{-\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \zeta(s)(\zeta^{-1}(s))'$  on obtient

$$\Lambda(n) = - \sum_{d|n} \mu(d) \log d$$

(b) Immédiat

(c) On a

$$\begin{aligned}\frac{\zeta(2s)}{\zeta(s)} &= \prod_p \left( \frac{1-p^{-s}}{1-p^{-2s}} \right) = \prod_p (1+p^{-s})^{-1} \\ &= \prod_p (1-p^{-s}+p^{-2s}-\dots) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} l(n)n^{-s}\end{aligned}$$

(d) On a

$$\frac{\zeta(s)}{\zeta(2s)} = \prod_p (1+p^{-s}) = \sum_{n=1}^{\infty} |\mu(n)|n^{-s}$$

**2** (i) La minoration  $\varphi(n) \geq n^{1/2}$  est vraie si  $n$  est une puissance d'un nombre premier impair : en effet pour  $p \geq 3$ , on a  $p-1 > \sqrt{p}$  et

$$p^k - p^{k-1} > p^{k-1/2} \geq p^{k/2}.$$

Pour  $p = 2$ , cette minoration est encore valable dès que  $k \geq 2$ . En décomposant  $n$  en facteurs premiers, on en déduit  $\varphi(n) \geq \sqrt{n/2}$  (le coefficient  $1/2$  n'apparaît que quand  $n \equiv 2 \pmod{4}$ ), d'où le résultat pour  $c = \kappa = 1/2$ .

*Remarque* : on peut en fait montrer que pour tout  $\epsilon > 0$ , il existe un entier  $N > 0$  tel que pour tout  $n \geq N$ , on ait  $\varphi(n) > n^{1-\epsilon}$  ce qui est équivalent à dire que l'on peut choisir pour  $\kappa$  n'importe quel réel positif  $< 1$ .

(ii) Comme  $\varphi(p^a) = (p-1)p^{a-1}$  pour  $a \geq 1$  et que  $\varphi(1) = 1$ , on a

$$\sum_{a \geq 0} \varphi(p^a)^{-s} = 1 + \sum_{k \geq 0} (p-1)^{-s} p^{-ks} = 1 + \frac{1}{(p-1)^s(1-p^{-s})}.$$

(iii) On écrit

$$1 + \frac{1}{(p-1)^s(1-p^{-s})} = \frac{1 + (p-1)^{-s} - p^{-s}}{1-p^{-s}},$$

de sorte que quand on fait le produit sur les nombres premiers  $p$ , on trouve à droite  $\zeta(s)G(s)$ . En utilisant le fait que la fonction  $\varphi$  est multiplicative, on vérifie qu'à gauche on obtient  $\sum_{n \geq 1} \varphi(n)^{-s}$  : pour cela on écrit comme d'habitude le produit sur les  $p \leq X$  et la somme sur  $n$  est restreinte aux entiers dont tous les facteurs premiers sont majorés par  $X$ , puis on fait tendre  $X$  vers l'infini, la convergence étant assurée par la minoration de  $\varphi(n)$  de (i).

**3** (i) Comme  $\sigma_k(n) \leq n^k$ , la série de Dirichlet  $\sum_{n \geq 1} \frac{\sigma_k(n)}{n^s}$  converge (absolument et uniformément sur tout compact) dans le demi-plan  $\text{Re } s > k$ . Dans ce demi-plan, on a

$$\zeta(s)\zeta(s-k) = \sum_{h \geq 1} \sum_{d \geq 1} h^{-s} d^{k-s} = \sum_{n \geq 1} n^{-s} \sum_{d|n} d^k = \sum_{n \geq 1} \frac{\sigma_k(n)}{n^s}.$$

(ii) Si  $m \wedge n = 1$ , l'application  $(h, l) \mapsto hl$  définit une bijection entre les couples  $(h, l)$  où  $h$  est un diviseur de  $m$  et  $l$  un diviseur de  $n$  d'une part, et les diviseurs de  $mn$  d'autre part, de sorte que

$$\sigma_k(mn) = \sum_{d|mn} d^k = \sum_{h|m} \sum_{l|n} (hl)^k = \sum_{h|m} h^k \sum_{l|n} l^k = \sigma_k(n)\sigma_k(m).$$

(iii) On a  $\sigma_k(p^a) = 1 + p^k + \dots + p^{ak} = \frac{p^{k(a+1)} - 1}{p^k - 1}$ .

(iv) Comme  $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$  et  $\zeta(s-k) = \prod_p (1 - p^{k-s})^{-1}$  et que  $(1 - p^{-s})(1 - p^{k-s}) = 1 - p^{-s}(p^k + 1) + p^{k-2s}$ , on a

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sigma_k(n)}{n^s} = \zeta(s)\zeta(s-k) = \prod_p \left(1 - (p^k + 1)p^{-s}p^{k-2s}\right)^{-1}.$$

*Remarque :* on peut aussi redémontrer directement cette formule à partir de la multiplicativité de  $\sigma_k$  en utilisant que

$$\sum_{a \geq 0} \sigma_k(p^a)p^{-as} = \frac{1}{p^k - 1} \left( \frac{p^k}{1 - p^{k-s}} - \frac{1}{1 - p^{-s}} \right) = \frac{1}{(1 - p^{k-s})(1 - p^{-s})} = \frac{1}{1 - (p^k + 1)p^{-s} + p^{k-2s}}$$

et le produit eulérien  $\sum_{n \geq 1} \sigma_k(n)n^{-s} = \prod_p \sum_{a \geq 0} \sigma_k(p^a)p^{-as}$ .

4

5 (1)

(2) On écrit  $\frac{1}{e^t - 1} = \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-nt}$ . Le changement de variable  $u = nt$  donne par ailleurs  $\int_0^{+\infty} e^{-nt} t^{s-1} dt = n^{-s} \Gamma(s)$  d'où le résultat.

(3) Soit  $\varphi$  une fonction  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}_+$  valant 1 sur  $[0, 1]$  et 0 sur  $[2, +\infty[$ . On peut écrire  $f$  sous la forme  $\varphi f + (1 - \varphi)f$  et  $L(f, s)$  sous la forme  $L(\varphi f, s) + L((1 - \varphi)f, s)$ . Or comme  $(1 - \varphi)f$  est nulle dans un voisinage de 0 et à décroissance rapide à l'infini,  $\int_0^{+\infty} f(t)t^{s-1} dt$  une fonction holomorphe sur  $\mathbb{C}$  tout entier. En outre  $\Gamma(s)^{-1}$  s'annule aux entiers négatifs, de sorte que  $L((1 - \varphi)f, s) = 0$  pour  $n \in \mathbb{N}$ . Ainsi quitte à remplacer  $f$  par  $(1 - \varphi)f$ , on peut supposer  $f$  à support compact. Une intégration par parties nous fournit alors la formule  $L(f, s) = -L(f', s + 1)$  si  $\text{Re}(s) > 1$ , ce qui permet de prolonger  $L(f, s)$  en une fonction holomorphe sur  $\mathbb{C}$  tout entier. D'autre part, on a

$$L(f, -n) = (-1)^{n+1} L(f^{(n+1)}, 1) = (-1)^{n+1} \int_0^{+\infty} f^{(n+1)}(t) dt = (-1)^n f^{(n)}(0)$$

d'où le résultat.

(4) (i) D'après la formule  $\Gamma(s) = (s-1)\Gamma(s-1)$ , on en déduit que  $\zeta(s) = \frac{L(f_0, s-1)}{s-1}$  où  $f_0(t) = \frac{t}{e^t - 1}$  et on utilise (3).

(ii) découle de (3) et de l'égalité  $\zeta(s) = \frac{L(f_0, s-1)}{s-1}$ .

(5) On a d'une part

$$\frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2} = \frac{1}{z} - \sum_{n=1}^{+\infty} 2z \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^{2k}}{n^{2k+2}} = \frac{1}{z} - 2 \sum_{k=1}^{+\infty} \zeta(2k) z^{2k-1},$$

et d'autre part

$$\pi \coth \pi z = i\pi \frac{e^{2i\pi z} + 1}{e^{2i\pi z} - 1} = i\pi + \frac{2i\pi}{e^{2i\pi z} - 1} = i\pi + \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{+\infty} B_n \frac{(2i\pi z)^n}{n!}$$

d'où le résultat.