

## Exercice

Soit  $f$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[a, b]$  vérifiant  $f(a)f(b) < 0$ . et  $\lambda = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ . Soit  $x_0 \in [a, b]$  donné. La suite obtenue par la méthode de la corde est donnée par

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{\lambda}, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

On note  $\Phi(x) = x - \frac{f(x)}{\lambda}$ .

**Q. 1** Montrer que si pour tout  $x \in [a, b]$  on a

$$\min(\lambda(x-a), \lambda(x-b)) \leq f(x) \leq \max(\lambda(x-a), \lambda(x-b)) \quad (\text{P-1})$$

alors  $\Phi([a, b]) \subset [a, b]$ .

**Q. 2** Montrer que si pour tout  $x \in [a, b]$  on a

$$\min(0, 2\lambda) < f'(x) < \max(0, 2\lambda) \quad (\text{P-2})$$

alors  $|\Phi'(x)| < 1$ .

**Q. 3** En déduire que sous les deux conditions précédentes la méthode de la corde converge vers l'unique solution  $\alpha \in [a, b]$  de  $f(x) = 0$ .

## Correction Exercice

**Q. 1** Si  $\lambda > 0$ , l'inéquation (P-1) devient

$$\begin{aligned} \lambda(x-b) \leq f(x) \leq \lambda(x-a) &\Leftrightarrow a \leq x - \frac{f(x)}{\lambda} \leq b \\ &\Leftrightarrow a \leq \Phi(x) \leq b. \end{aligned}$$

Si  $\lambda < 0$ , l'inéquation (P-1) devient

$$\begin{aligned}\lambda(x - a) \leq f(x) \leq \lambda(x - b) &\Leftrightarrow a \leq x - \frac{f(x)}{\lambda} \leq b \\ &\Leftrightarrow a \leq \Phi(x) \leq b.\end{aligned}$$

**Q. 2** Si  $\lambda > 0$ , l'inéquation (P-2) devient

$$\begin{aligned}0 < f'(x) < 2\lambda &\Leftrightarrow 0 < \frac{f'(x)}{\lambda} < 2 \\ &\Leftrightarrow -1 < 1 - \frac{f'(x)}{\lambda} < 1 \\ &\Leftrightarrow -1 < \Phi'(x) < 1.\end{aligned}$$

Si  $\lambda < 0$ , l'inéquation (P-2) devient

$$\begin{aligned}2\lambda < f'(x) < 0 &\Leftrightarrow 0 < \frac{f'(x)}{\lambda} < 2 \\ &\Leftrightarrow -1 < 1 - \frac{f'(x)}{\lambda} < 1 \\ &\Leftrightarrow -1 < \Phi'(x) < 1.\end{aligned}$$

**Q. 3** Sous les hypothèses (P-1) et (P-2) on a  $\Phi([a, b]) \subset [a, b]$  et  $\forall x \in [a, b], |\Phi'(x)| < 1$ . Comme  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[a, b]$ , la fonction  $\Phi$  l'est aussi. La suite  $(x_k)$  est définie par  $x_{k+1} = \Phi(x_k)$ . Ainsi les hypothèses du théorème 2.4 sont vérifiées ce qui assure l'unicité du point fixe ainsi que la convergence de la suite  $(x_k)$  vers ce point fixe.

◇

