Proposition. *Soit $\mathbb{A}$ une matrice régulière. On a les propriétés suivantes*

a. $\forall \alpha \in \mathbb{K}^*$, $\mathrm{cond}(\alpha\mathbb{A}) = \mathrm{cond}(\mathbb{A})$.

b. $\mathrm{cond}_p(\mathbb{A}) \geqslant 1$, $\forall p \in [\![1, +\infty]\!]$.

c. $\mathrm{cond}_2(\mathbb{A}) = 1$ *si et seulement si* $\mathbb{A} = \alpha\mathbb{Q}$ *avec* $\alpha \in \mathbb{K}^*$ *et* $\mathbb{Q}$ *matrice unitaire*

Proof. Soit $\mathbb{A}$ une matrice régulière.

a. Soit $\alpha \in \mathbb{K}^*$, on a

$$\begin{aligned}\mathrm{cond}(\alpha\mathbb{A}) &\overset{\text{def}}{=} \|\alpha\mathbb{A}\| \left\|(\alpha\mathbb{A})^{-1}\right\| = |\alpha| \|\mathbb{A}\| \left\|\frac{1}{\alpha}\mathbb{A}^{-1}\right\| \\ &= |\alpha| \|\mathbb{A}\| \frac{1}{|\alpha|} \left\|\mathbb{A}^{-1}\right\| = \|\mathbb{A}\| \left\|\mathbb{A}^{-1}\right\| \\ &= \mathrm{cond}(\mathbb{A})\end{aligned}$$

b. On a $\mathbb{I} = \mathbb{A}\mathbb{A}^{-1}$. Or pour toute norme subordonnée, on a $\|\mathbb{I}\| = 1$ et donc $1 = \left\|\mathbb{A}\mathbb{A}^{-1}\right\| \leqslant \|\mathbb{A}\| \left\|\mathbb{A}^{-1}\right\| = \mathrm{cond}(\mathbb{A})$.

c. **Admis**. Voir par exemple *Analyse numérique matricielle appliquée à l'art de l'ingénieur (2004), Lascaux, P. et Théodor, R., Tome 1, Théorème 2 page 142-143.*

□

