

## Feuille de TD 1 : Rappels de calcul intégral

**Exercice 1** Existe-t-il une fonction  $g$  intégrable sur  $\mathbb{R}$  telle que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $ne^{-n|x|} \leq g(x)$  ?

**Exercice 2** 1. Montrer que, pour tout  $u \in [0, 1[$ ,  
 $u + \log(1 - u) \leq 0$ .

2. Soit  $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ . Calculer

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} \exp \left[ \lambda^3 \log \left( 1 - \frac{y^2}{\lambda^3} \right) \right] \varphi \left( \frac{y}{\lambda} \right) dy.$$

**Exercice 3** Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Montrer que, dans  $\mathbb{R}^d$ ,

1.  $\int_{B(0,1)} \frac{1}{\|x\|^\alpha} dx$  est convergente si et seulement si  $\alpha < d$ .
2.  $\int_{\mathbb{R}^d \setminus B(0,1)} \frac{1}{\|x\|^\alpha} dx$  est convergente si et seulement si  $\alpha > d$ .

**Exercice 4** Soit  $a > 0$ . On pose pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$F(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} e^{-at^2} dt.$$

1. Montrer que  $F$  est bien définie sur  $\mathbb{R}$ .
2. Montrer que  $F$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$  et que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$F'(x) = -\frac{x}{2a} F(x).$$

3. En déduire que pour tout réel  $x$ ,  $F(x) = F(0)e^{-\frac{x^2}{4a}}$  puis que

$$\forall x \in \mathbb{R}, F(x) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{x^2}{4a}}.$$

On rappelle que  $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$ .

**Exercice 5** Soit  $f \in L^1(\mathbb{R})$ . On considère l'application

$$Tf : \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \int_0^1 f(x-y) dy \end{array}.$$

1. Montrer que, si  $f$  est continue à support compact,  $Tf$  est continue.
2. Soit  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de fonctions continues à support compact qui converge vers  $f$  dans  $L^1(\mathbb{R})$ . Montrer que  $(Tf_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers  $Tf$  uniformément sur  $\mathbb{R}$ . En déduire que  $Tf$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .
3. En déduire que le produit de convolution sur  $L^1(\mathbb{R})$  n'admet pas d'élément unité.

**Exercice 6** On note  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^d$ .

1. Soit  $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de fonctions de  $C_0^\infty(\Omega)$ , et  $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$ . Rappeler la définition de “ $(\varphi_n)_n$  converge vers  $\varphi$  dans  $C_0^\infty(\Omega)$ ”.
2. Soit  $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ , non nulle, et  $a \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ . Soit

$$\chi_n(x) = e^{-n|x|^2} \chi(x - na).$$

Montrer que  $(\chi_n)_n$  converge vers la fonction constante nulle uniformément dans  $\mathbb{R}^d$ . Est-ce que  $(\chi_n)_n$  converge dans  $C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ ?

3. Soit  $B(0,1)$  la boule unité ouverte de  $\mathbb{R}^d$  et  $\rho$  une fonction pic sur  $\overline{B(0,1)}$ , telle que construite dans le cours:

- (a)  $\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ ,
- (b)  $\rho(x) > 0$  pour  $|x| < 1$ ,
- (c)  $\text{supp } \rho = \overline{B(0,1)}$ ,
- (d)  $\int_{\mathbb{R}^d} \rho(x) dx = 1$ .

Soit  $\rho_n = n^d \rho(nx)$ . Soit  $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ . En utilisant les résultats du cours, montrer que  $\rho_n * \chi$  converge vers  $\chi$  dans  $C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ .

**Exercice 7** Soit  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^d$ .

1. Soit  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ . Rappeler la définition du support et du support essentiel de  $f$ .
2. Soit  $A \subset \Omega$ . Quel est le support de la fonction indicatrice  $\mathbb{1}_A$  de  $A$ ? Supposons  $A$  mesurable, de mesure nulle. Quel est le support essentiel de  $\mathbb{1}_A$ ? de  $\mathbb{1}_{\Omega \setminus A}$ ?
3. Soit  $\varphi$  une fonction continue sur  $\Omega$ . Montrer que le support et le support essentiel de  $A$  sont identiques.
4. Soient  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  et  $g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  dont les supports sont disjoints. Montrer que  $fg = 0$ . Cela reste-t-il vrai si on suppose uniquement que leurs supports essentiels sont disjoints?

**Exercice 8** Le but de cet exercice est de montrer la proposition suivante (Proposition 3.3.13 du cours):

**Proposition 1** Soit  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^d$ . Soit  $K$  un compact de  $\Omega$  et  $\mathcal{O}$  un ouvert tel que  $K \subset \mathcal{O}$  et  $\overline{\mathcal{O}} \subset \Omega$ . Il existe alors  $\chi \in C_0^\infty(\Omega)$  telle que  $\chi \equiv 1$  sur  $K$ ,  $\chi \equiv 0$  sur  $\mathcal{O}^c$  et  $0 \leq \chi \leq 1$ .

$$B(x_0, R) = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \text{ t.q. } |x - x_0| < R \right\}$$

$$\overline{B}(x_0, R) = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \text{ t.q. } |x - x_0| \leq R \right\}.$$

1. Soit  $y \in K$ . Justifier qu'il existe  $\varepsilon_y > 0$  tel que  $B(y, 2\varepsilon_y) \subset \Omega$ .
2. En utilisant l'existence d'une fonction pic, montrée dans le cours, montrer qu'il existe une fonction  $\chi_y \in \mathcal{D}(\Omega)$  telle que

- $\forall x \in \Omega, \chi_y(x) \geq 0$ .
- $\text{supp } \chi_y = \overline{B}(y, \varepsilon_y) \Subset \Omega$ .
- $\forall x \in \overline{B}(y, \varepsilon_y/2), \chi_y(x) \geq 1$ .

3. Justifier qu'il existe un sous-ensemble fini  $K'$  de  $K$  tel que

$$K \subset \bigcup_{y \in K'} B(y, \varepsilon_y/2).$$

4. Soit

$$g(x) = \sum_{y \in K'} \chi_y(x), \quad f(x) = \rho(g(x)),$$

où  $\rho$  est une fonction marche, construite dans le cours,  $C^\infty$ , croissante, et valant 0 pour sur  $] -\infty, 0]$  et 1 sur  $[1, \infty[$ . Montrer que  $f$  vérifie les conclusions de la proposition.