

ALGÈBRE LINÉAIRE ET ALGORITHMIQUE PROGRAMME DE L'EXAMEN DE RATTRAPAGE

INSTITUT GALILÉE.
L1, 2ÈME SEMESTRE, ANNÉE 2016-2017

Tout le contenu des cours et TD d'algèbre linéaire et algorithmique et des TP d'algorithmique sont au programme du rattrapage du cours d'algèbre linéaire et algorithmique, à l'exclusion du vocabulaire de la dernière partie du TD7 (réduction des endomorphismes, fonctions propres).

L'examen de rattrapage comprendra des questions de cours de mathématiques, des exercices de mathématiques et un exercice d'algorithmique.

La base du cours est le polycopié dont les trois tomes ont été distribués aux étudiants et sont disponibles sur la page web :

<https://www.math.univ-paris13.fr/~duyckaer/enseignement.html>

Le polycopié se suffit à lui-même. Si il est bien sûr autorisé de travailler sur d'autres documents (notamment les livres de niveau licence dont les références sont dans le polycopié), il est fortement déconseillé de remplacer la lecture du polycopié par celle de cours trouvés sur internet grâce à une recherche par mots-clés mal maîtrisée.

Une simple révision des exercices vus en travaux dirigés et une connaissance mécanique de quelques exercices types ne devrait pas être suffisante pour valider l'UE. Un des buts principaux du rattrapage est de tester la connaissance et la compréhension du cours. Les questions de cours porteront plus particulièrement sur les chapitres IV et V. Les définitions, les énoncés et les démonstrations doivent être parfaitement connus. Il est demandé aux étudiants de réviser plus particulièrement les démonstrations, qui ont été particulièrement peu réussies dans le partiel 2.

Quelques exemples de questions de cours possibles :

- Toutes définition et notation du cours.
- Tout énoncé (Théorème, Lemme, Proposition) du cours. Il faut connaître des **exemples** illustrant les définitions et les résultats du cours.
- Soit E un \mathbb{K} -espace vectoriel. Donner la définition d'une famille libre de E , d'une famille génératrice de E . Donner un exemple de famille libre et non génératrice (respectivement génératrice et non libre, ni libre ni génératrice) de \mathbb{R}^3 . Si \mathcal{L} est une famille libre

de E et $\vec{u} \in E$, donner une condition nécessaire et suffisante sur \vec{u} et $\text{vect}(\mathcal{L})$ pour que $\mathcal{L} \cup (\vec{u})$ soit libre (“Lemme utile sur les familles libres” du cours). Démontrer cette condition.

- Soit E un espace vectoriel de dimension finie et \mathcal{G} une famille génératrice finie de E . Montrer qu’il existe une base de E contenue dans \mathcal{G} .
- Énoncer et démontrer le théorème de la base incomplète.
- Soit E et F des \mathbb{K} -espaces vectoriels. On suppose que E est de dimension finie n . On se donne une base $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ de E et une famille $(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$ de F . Montrer qu’il existe une unique application linéaire de E dans F telle que

$$\forall j \in \{1, \dots, n\}, \quad f(\vec{e}_j) = \vec{u}_j.$$

- Soit E, F des \mathbb{K} -espaces vectoriels, $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Montrer que le noyau de f est un sous-espace vectoriel de E . Montrer que l’image de f est un sous-espace de F . Montrer que f est injective si et seulement si son noyau est réduit à $\{\vec{0}_E\}$.
- Soit E, F des \mathbb{K} -espaces vectoriels, $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Donner une relation entre les dimensions de E , du noyau de f et de l’image de f . Démontrer cette relation. Donner un exemple d’une application linéaire f de \mathbb{R}^3 dans \mathbb{R}^4 dont le noyau est de dimension 1 et l’image de dimension 2.
- Soit E et F deux espaces vectoriels. Donner la définition de “ E est isomorphe à F ”. Si E est un espace vectoriel de dimension n , montrer que E est isomorphe à \mathbb{R}^n .