3. On veut construire le relèvement dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} I^n \times \{0\} & \longrightarrow & E \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ I^n \times [0, 1] & \xrightarrow{h} & B \end{array}$$

Par compacité de I^{n+1} , on peut subdiviser le cube en petits cubes (cellulaires, notons $sd(I^n)$ le complexe ainsi obtenu) $c \times [i/m, i + 1/m]$ de telles sortes que $h(c \times [i/m, i + 1/m])$ soit incluses intégralement dans un ouvert U sur la restriction duquel p devient une fibration de Serre. Par la question 1, c'est aussi le cas pour les restrictions de p à $c \times [i/m, i + 1/m]$ et à toute sous-cellule de son squelette. On étend notre homotopie alors petit cube par petit cube (en initialisant par sa valeur sur $I^n \times \{0\}$). Pour simplifier la construction de cette extension, le plus simple est de le faire par récurrence sur le squelette de la subdivision du cube. Si on suppose avoir construit le relèvement sur le j -squelette $sd(I^n)^{(j)}$, puis par récurrence sur i pour tout cube de la forme $c \times [i/m]$ avec $c \in sd(I^n)^{(j+1)}$. Pour passer de i à $i + 1$, on utilise que l'on connaît notre homotopie sur le bord $\partial c \times [i + 1/m, i + 2/m]$ par hypothèse de récurrence sur le squelette et aussi sur $c \times \{i + 1\}$ par celle sur i . On est exactement ramené au diagramme de la question 2 et on peut compléter l'homotopie ! Les cas limites ($i = 0, i = m$ se ramènent aussi à un diagramme équivalent).

Exercice 2. Soit X un espace connexe par arcs non-vide. Démontrer que pour tout $x \in X, n \geq 1$, on a

$$\pi_n(X, x) \cong \pi_{n-1}(\Omega_x X, c_x)$$

où $\Omega_x X$ désigne l'espace des lacets de X d'origine x , pointé par le lacet constant.

Solution 2. On note P_x l'objet en chemin associé à l'inclusion $\{x\} \hookrightarrow X$. C'est par définition le sous-espace des chemins sur X qui commencent en x_0 . D'après le cours, l'évaluation en 1, $P_x = \{x_0\} \times_X X^{[0,1]} \rightarrow X$ est une fibration et sa fibre au dessus de x est constitué des lacets de base x . C'est à dire de $\Omega_x X$. La suite exacte longue d'une fibration donne

$$\dots \rightarrow \pi_n(P_x, c_x) \rightarrow \pi_n(X, x) \rightarrow \pi_{n-1}(\Omega_x X, c_x) \rightarrow \pi_{n-1}(P_x, c_x) \rightarrow \dots$$

Or P_x est contractile (tout lacet se contracte sur son origine via $H(\gamma, t)(u) = \gamma((1-t)u)$). Ainsi la flèche $\partial : \pi_n(X, x) \rightarrow \pi_{n-1}(\Omega_x X, c_x)$ est un isomorphisme (même en degré 0, car $\Omega_x X$ est un groupe à homotopie près).

Exercice 3 (Une cofibration est une inclusion). 1. Démontrer que si $A \subset X$ est un rétracte de X et que X est Hausdorff, alors A est fermé.

2. Démontrer que si $A \rightarrow X$ est une cofibration, alors A est l'inclusion d'un sous-espace dans X , qui est fermé si X est Hausdorff. (utiliser le cylindre de $A \rightarrow X$ et la première question).

Solution 3. 1. Si X est de Hausdorff, alors la diagonale $\Delta(X) = \{(x, x)\} \subset X \times X$ est fermée. Il suit que si $f, g : X \rightarrow X$ sont continues, alors le sous-espace

$$Eq(f, g) := \{x \in X \text{ tel que } f(x) = g(x)\} = (f, g)^{-1}(\Delta(X))$$

est fermé aussi. Si $r : X \rightarrow A$ est la rétraction, alors A s'identifie avec $\{x \in X \text{ tel que } r(x) = x\}$ et est donc fermé.

2. Le dernier point suit du premier et de la première question. L'application $i : A \rightarrow X$ se factorise au travers du cylindre :

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{id \times \{1\}} & Cyl(i) \xrightarrow{\simeq} X \\ & \searrow i & \nearrow \end{array}$$

On veut montrer que i est un homéomorphisme sur son image, et donc construire une application réciproque. On a en fait toute une famille de factorisation comme ci-dessus donnée par les applications $a \mapsto (a, t) \in Cyl(i)$ pour $t \in [0, 1]$. On a ainsi un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & Cyl(i)^{[0,1]} \\ \downarrow i & \nearrow h & \downarrow ev_0 \\ X & \longrightarrow & Cyl(i) \end{array}$$

dont le relèvement est donné par le fait que $i : A \rightarrow X$ est une cofibration. L'homotopie induite h est juste l'inclusion de X dans le cylindre pour $t = 0$ et, pour tout $t > 0$, et $a \in A$, on a donc que

$$h(i(a))(t) = (a, t).$$

En particulier pour $t = 1$ (ou tout autre $t > 0$), on a que la restriction de $h(-)(1)$ à $i(A)$ donne une application continue $h(-)(1) : i(A) \rightarrow A \times \{1\} \cong A$ qui est un inverse à gauche de i . Ceci prouve l'injectivité de i et nous donne aussi immédiatement que $i : A \rightarrow i(A)$ est un homéomorphisme d'inverse $h(-)(1)$.

Il reste à montrer que $i(A) \subset X$ est fermé. Par l'argumentation précédente, on peut identifier A et $i(A)$ afin de d'écrire simplement $A \subset X$. Par une proposition du cours, dire que i est une cofibration équivaut à dire que $X \times \{0\} \cup A \times I$ est un rétract de $X \times I$. Soit $\rho : X \times I \rightarrow X \times \{0\} \cup A \times I$ une rétraction. Comme précédemment,

$$X \times \{0\} \cup A \times I = (\rho, \text{Id})^{-1} \Delta(X \times I)$$

est fermé dans $X \times I$. Ainsi, $A \cong A \times \{1\} = (X \times \{0\} \cup A \times I) \cap (X \times \{1\})$ est bien fermé dans X .

- Exercice 4** (Quotients par une cofibration). 1. Soit $A \subset X$ une cofibration. Démontrer que l'espace quotient X/A est homotope au cône $C(i) := A \times [0, 1] \cup_f X/(a, 1) \sim (a', 1)$ de i .
2. Que vaut l'homologie réduite du quotient X/A quand $A \subset X$ est une cofibration ?
 3. Est-ce que le type d'homotopie du quotient par une cofibration est invariant par homotopie ?
 4. On dit qu'un espace (X, x_0) est bien pointé si l'inclusion $x_0 \subset X$ est une cofibration. Donner des exemples et contre exemples d'espaces bien pointés.
 5. Démontrer que si (X, x_0) est bien pointé, alors l'application quotient $\Sigma^{nr} X \rightarrow \Sigma X$ de la suspension non-réduite vers la suspension réduite est une équivalence d'homotopie.

Solution 4. Notons aussi $C(A) = C(A \xrightarrow{id} A) = A \times [0, 1]/(a, 1) \sim (a', 1)$.

1. On a une inclusion $C(A) \hookrightarrow C(i)$ dont le quotient est homéomorphe à X/A . En particulier on a une application canonique $p : C(i) \rightarrow X/A$ (qui factorise $X \rightarrow X/A$ via l'inclusion de $X \hookrightarrow C(i)$). On souhaite maintenant construire une application réciproque $X/A \rightarrow C(i)$. Evidemment le choix naturel est d'envoyer la classe $[A] \in X/A$ sur la classe $[A \times \{1\}]$ dans le cône $C(i)$. La difficulté est de faire cela continuellement et c'est là où va intervenir l'hypothèse de cofibration. En effet l'application quotient $(a, t) \mapsto [(a, t)] \in C(i)$ donne une application continue $A \times C(i)^{[0,1]}$ qui redonne $A \xrightarrow{i} X \hookrightarrow C(i)$ pour $t = 0$. On a ainsi un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & C(i)^{[0,1]} \\ \downarrow i & \nearrow h & \downarrow ev_0 \\ X & \longrightarrow & C(i) \end{array}$$

dont le relèvement h existe par cofibrance de i . Par commutativité du triangle du haut, on a donc que, pour $a \in A$, $h(a)(1) = [A \times \{1\}]$. Ainsi, $h(-)(1)$ définit bien une application continue $g : X/A \rightarrow C(i)$ par passage au quotient.

On montre maintenant que g est un inverse homotopique de p . Pour cela, on étend h pour tout t en remarquant que la composée

$$X \xrightarrow{h(-)(t)} C(i) \longrightarrow C(i)/C(A) \rightarrow A$$

est constante sur A (même raison de commutativité du diagramme). Ainsi, par passage au quotient, on a défini une homotopie $H : X/A \times I \rightarrow X/A$ qui vérifie que $H(-, 1) = p \circ g$ et $H(-, 0)$ est l'identité de X/A . Il reste à voir que l'autre composition, $g \circ p$, est également homotope à l'identité. Pour cela, on considère l'homotopie $H' : C(i) \times I \rightarrow C(i)$ induite par les applications $h : X \times I \rightarrow C(i)$ et

$$k : (A \times I) \times I \longrightarrow C(i), \quad ((a, t), s) \mapsto [a, s + t(1 - s)].$$

Cette homotopie est bien définie sur le cône car $k(-, 0, -)$ coïncide avec h et $k(-, 1, -)$ est constant. De plus, par construction $H'(-, 0) = \text{Id}_{C(i)}$ et $H'(-, 1) = g \circ p$.

En fait, la preuve montre qu'on a des équivalences d'homotopie de paires $(X/A, \{A\}) \simeq (C(i), C(A)) \simeq (C(i), [A \times \{1\}])$.

2. Par 1, on a que $\tilde{H}_*(X/A) \cong H_*(C(i))$. Or l'homologie réduite du cône est toujours isomorphe canoniquement à l'homologie de la paire $H_*(X, A)$. En effet: de l'inclusion de paires $(X, A) \hookrightarrow (X \cup CA, CA)$ on déduit que le morphisme canonique

$$H_i(X, A) \rightarrow H_i(X \cup CA, CA) \cong \tilde{H}_i(X \cup CA)$$

est un isomorphisme pour tout $i \in \mathbb{N}$. Pour cela on applique le théorème des petites chaînes (dans le cas relatif) au recouvrement de $X \cup CA$ par les (deux) ouverts $CA \setminus A$ et $X \cup \{A \times [0, 1/2]\}$. On obtient que l'inclusion

$$C_*(X \cup \{A \times [0, 1/2]\}) + C_*(CA \setminus A, CA \setminus A) \rightarrow C_*(X \cup CA, CA)$$

est un quasi-isomorphisme. Par nullité de $C_*(CA \setminus A, CA \setminus A)$ on obtient donc

$$H_i(X \cup CA, CA) \cong H_i(X \cup \{A \times [0, 1/2]\}, \{A \times [0, 1/2]\}).$$

On conclut alors en remarquant que l'inclusion canonique de la paire (X, A) dans la paire $(X \cup \{A \times [0, 1/2]\}, \{A \times [0, 1/2]\})$ est une équivalence d'homotopie de paires.

3. Si $f : X \rightarrow Y$ et $g : X \rightarrow Y$ sont homotopes alors $Cyl(f)$ et $Cyl(g)$ sont homotopes et de même les cônes $C(f)$ et $C(g)$ sont homotopes. Par ailleurs si $\psi : Y \rightarrow Z$ est une équivalence d'homotopie, alors $Cyl(\psi \circ f) \simeq Cyl(\psi \circ g)$ et de même $C(\psi \circ f) \simeq C(\psi \circ g)$. Il résulte alors de 1. et de ces observations que *si $A \rightarrow X$ et $A \rightarrow X \xrightarrow{f} Y$ sont des cofibrations avec $f : X \rightarrow Y$ une homotopie, alors X/A et Y/A sont des équivalences.*

Supposons plus généralement donné un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\simeq} & A' \\ i \downarrow & f & \downarrow i' \\ X & \xrightarrow{\simeq} & X' \end{array}$$

avec i, i' des cofibrations (donc des inclusions) et f et g des équivalences d'homotopie. De la commutativité du diagramme, on obtient une application induite $X/A \rightarrow X'/A'$. Nos autres hypothèses impliquent en fait que $X/A \rightarrow X'/A'$ est une équivalence d'homotopie.

Pour démontrer cela, par 1., il suffit de démontrer que l'application induite $G: C(i) \rightarrow C(i')$ est une équivalence d'homotopie; cette application est donnée¹ par $[(a, t)] \mapsto [(f(a), t)]$ et $x \mapsto g(x)$. Construisons un inverse homotopique à G . Pour cela, il faut construire une application de $C(i') \rightarrow C(i)$. Remarquons la propriété utile suivante:

Lemme 1. *Soit $j: W \rightarrow Y$ et $p: Y \rightarrow Z$ des applications continues. Toute homotopie $H: W \times I \rightarrow Z$ entre $p \circ j$ et une application constante induit une application continue $C(j) \rightarrow Z$ rendant commutatif le diagramme*

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{\quad} & C(j) \\ & \searrow p & \downarrow \\ & & Z. \end{array}$$

L'application $C(j) \rightarrow Z$ est définie par $y \mapsto p(y)$ et $[(w, t)] \mapsto H(w, t)$.

Le lemme est immédiat à vérifier. (On a bien sûr supposé que $H(-, 0) = p \circ j$, sinon, il faut remplacer t par $1 - t$!)

Ainsi pour obtenir une application continue $C(i') \rightarrow C(i)$, il nous suffit donc de construire une application $g': X' \rightarrow X$ telle que $q \circ g' \circ i'$ soit homotopiquement constante. Ici on note $q: X \rightarrow C(i)$ et $q': X' \rightarrow C(i')$ les inclusions (et cofibrations) canoniques.

Soit f', g' des inverses homotopiques de f et g respectivement, et soit $\alpha: \text{Id}_A \simeq f'f$ et $\beta: g'g \simeq \text{Id}_X$ des homotopies. De l'homotopie

$$q \circ g' \circ i' \stackrel{qg'i'\alpha}{\simeq} q \circ g' \circ i' \circ f \circ f' = q \circ g' \circ g \circ i \circ f' \stackrel{q\beta i'f'}{\simeq} q \circ i \circ f'$$

on déduit que $q \circ g' \circ i'$ est homotope à une application constante (car $q \circ i$ l'est canoniquement via $(a, t) \mapsto [(a, t)]$). Cela induit une application $H: C(i') \rightarrow C(i)$ donnée par $x' \mapsto g'(x')$ et

$$(a', t) \mapsto \begin{cases} g' \circ i' \circ \alpha(a', 3t) & t \leq 1/3 \\ \beta(i \circ f'(a'), 3t - 1) & 1/3 \leq t \leq 2/3 \\ [f'(a'), 3t - 2] & 2/3 \leq t. \end{cases}$$

On prétend que H est bien un inverse homotopique de G . On va seulement montrer que $H \circ G$ est homotope à l'identité ; l'argument est analogue pour l'autre composition. L'application $H \circ G$ est donnée par $x \mapsto g' \circ g(x)$ et $(a, t) \mapsto H(f(a), t)$.

On veut construire une homotopie $H \circ G \simeq \text{Id}_{C(i)}$ en utilisant les homotopies α et β . Sur X , cette homotopie est simplement donnée par β . Sur $A \times I/A \times \{1\}$, on définit cette homotopie comme indiqué dans la figure (1). De cette manière, l'homotopie coïncide avec β sur la base $A \times \{0\}$ du cône $C(A)$.

4. N'importe quel sommet d'un CW-complexe donne un exemple. Pour un contre-exemple, il suffit de prendre 0 dans $X = \{0\} \cup \{1/n, n > 0\}$. Si c'était une cofibration $\{0\}$ aurait un voisinage dans X qui en soit un rétracte par déformation ce qui n'est pas le cas vu qu'aucun de ces voisinages n'est connexe par arcs.
5. Par 3., il suffit de vérifier que l'inclusion $\{(x_0, t), t \in [0, 1]\} \subset \Sigma^{nr} X = X \times [0, 1] / ((x, 0) \sim (x', 0), (y', 1) \sim (y, 1))$ est une cofibration car l'inclusion du point conique $[x_0, 1]$ dans la suspension l'est également, et que cette inclusion dans $\{(x_0, t), t \in [0, 1]\}$ est une équivalence d'homotopie. Comme $\Sigma^{nr} X$ est le pushout du cylindre $X \times [0, 1]$, il suffit de vérifier que $\{x_0\} \times [0, 1] \cup X \times \{0, 1\} \subset X \times [0, 1]$ est une cofibration. Ceci est équivalent à dire que

$$\{x_0\} \times [0, 1]^2 \cup X \times \{0, 1\} \times [0, 1] \cup X \times [0, 1] \times \{0\} \subset X \times [0, 1] \times [0, 1]$$

¹on vérifie qu'elle envoie bien le point conique sur le point conique et est compatible avec les recollements par i et i'

Figure 1: L'homotopie $H \circ G \simeq \text{Id}_{C(i)}$. La variable t représente la direction du cône.

Figure 2: La source de H à droite, avec les applications représentées, et son image, $C(i)$, à droite. Ici $h: i' \simeq i' \circ f \circ f'$ et $k: g' \circ g \circ i \circ f' \simeq i \circ f'$.

est un rétracte. Comme d'habitude, on identifie par un homéomorphisme de paires $([0, 1]^2, \{0\} \times [0, 1] \cup [0, 1] \times \{0, 1\})$ avec $[0, 1]^2, \times [0, 1] \times \{1\}$ (c'est à dire qu'on échange le complémentaire d'une face dans le bord avec la face). On en déduit que notre inclusion est une cofibration revient à dire que $(X \times \{0\} \cup \{x_0\} \times [0, 1]) \times [0, 1] \subset X \times [0, 1] \times [0, 1]$ est un rétracte. Et ce dernier point

découle du fait que $X \times \{0\} \cup \{x_0\} \times [0, 1] \subset X \times [0, 1]$ est un rétracte puisque $\{x_0\} \subset X$ est une cofibration !

Exercice 5 (Théorème de Whitehead). Soit $f : X \rightarrow Y$ une application continue entre espaces cellulaires. On veut démontrer que f est une équivalence d'homotopie faible, alors f est une équivalence d'homotopie

1. Soit L un CW-complexe et $K \subset L$ un sous-complexe cellulaire. Soit $\emptyset \neq A \subset B$ une paire d'espaces topologiques. On suppose que, pour tout entier $n \geq 0$, si $L^{(n)} - K^{(n)} \neq \emptyset$, alors, quelque soit $a_0 \in A$, $\pi_n(B, A, a_0) = 0^2$. Démontrer que toute application continue $g : (L, K) \rightarrow (B, A)$ est homotope relativement à K à une application à valeur dans A .
2. On suppose que $f : X \rightarrow Y$ est l'inclusion d'un sous-CW complexe. En déduire qu'alors $f : X \rightarrow Y$ est un rétracte par déformation de Y et conclure.
3. Démontrer que l'application de paire naturelle $(X \cup Y, X) \hookrightarrow (Cyl(f), X)$ est homotope à une application à valeur dans X (utiliser la première question). Ici $Cyl(f) = X \times [0, 1] \cup_f Y$ est le cylindre de f .
4. Démontrer que l'homotopie de la question précédente s'étend en une homotopie définie sur tout le cylindre (et pas seulement $X \cup Y$).
5. En déduire qu'il existe une application $F : Cyl(f) \rightarrow Cyl(f)$ à valeurs dans X , qui vaut l'identité sur X , et est homotope à l'identité.
6. Conclure (on pourra utiliser la première question).

Solution 5. Remarque, puisque toute application continue entre CW-complexes est homotope à une application cellulaire, on peut, à homotopie près, remplacer f par une application cellulaire. On peut alors simplifier la fin de la preuve en se ramenant à la question via l'inclusion (devenue cellulaire) de X dans le cylindre de f .

1. Comme d'habitude avec les CW-complexes, on construit g et l'homotopie H par récurrence sur le squelette. Supposons avoir construit une telle homotopie H sur $L^{(<n)}$. Supposons que $L^{(n)} - K^{(n)} \neq \emptyset$ (sinon il n'y a rien d'autres à faire qu'étendre H par les valeurs (constante en $t \in [0, 1]$) de g sur les cellules de $K^{(n)}$; cela ne pose pas de problèmes puisque par hypothèse sur le bord des cellules de $K^{(n)}$, l'homotopie coïncide avec g). Pour construire H sur $L^{(n)}$, il suffit maintenant de construire H sur chaque cellule de dimension $e_\alpha : I^n \rightarrow L^{(n)} - K^{(n)}$. Par hypothèse de récurrence $g \circ e_\alpha(\partial I^n)$ est dans $g(L^{(n-1)}) \subset K$. En choisissant un point base dans K correspondant à l'image d'un point base de ∂I^n , de $\pi_n(B, A, a_0) = 0$, on déduit que $g \circ e_n$ est homotope, relativement à son bord à une application à valeur dans K (cf le lemme du cours sur la nullité d'une classe dans les groupes d'homotopie d'une paire). La réunion de ces homotopies, en donne une sur tout le n -squelette (on a pas de problème de compatibilité puisque on recolle sur le bord dont l'image est fixé). Pour conclure, il suffit de vérifier qu'on peut effectuer ces opérations à chaque étage n successivement. C'est en fait facile: rappelons que pour construire une application $H : L \times [0, 1] \rightarrow B$, il suffit de construire une famille d'application $H_{(n)} : L^{(n)} \times [0, 1] \rightarrow B$ telles que $H_{(n)}|_{L^{(m)}} = H_{(m)}$ puisque la topologie est celle de la réunion. On construit alors $H_{(n)}$ comme ci-dessus mais de telle sorte que l'homotopie à l'étage n ne soit non-constante que sur l'intervalle de temps $[1 - 1/2^n, 1 - 1/2^{n+1}]$. On peut alors effectivement recoller les homotopies ci-dessus.
2. On applique la question précédente à l'identité $Y \rightarrow Y$ en remarquant que la longue suite exacte d'une paire implique que $\pi_n(Y, X, x_0)$ est nulle pour tout n . Cela donne que Id_Y est homotope rel. X à une application à valeurs dans X . On en déduit que f est un rétract par déformation forte ; en particulier, c'est une équivalence d'homotopie.

²pour $n = 0$, on définit cette condition comme le fait que l'application naturelle $\pi_0(A) \rightarrow \pi_0(B)$ est une bijection

3. On considère maintenant le cas général (c'est-à-dire qu'on ne suppose plus que f est une inclusion d'un sous-CW-complexe). On a la factorisation $f : X \hookrightarrow \text{Cyl}(f) \xrightarrow{\cong} Y$ dont la deuxième flèche est une équivalence d'homotopie. Comme f_* est une équivalence d'homotopie faible par hypothèse, on en déduit que $X \hookrightarrow \text{Cyl}(f)$ est une équivalence d'homotopie faible aussi. Par conséquent, par le même argument que la question précédente, on a que $\pi_n(\text{Cyl}(f), X, x_0) = 0$ et ainsi on peut appliquer la question 1 qui donne une homotopie de l'inclusion naturelle $(X \cup Y, X) \hookrightarrow (\text{Cyl}(f), X)$ avec une application à valeur dans X , qui plus est par une homotopie constante égale à l'identité sur X .
4. On remarque que $X \cup Y \hookrightarrow \text{Cyl}(f)$ est une paire cellulaire relative, donc une cofibration. Ainsi, on peut étendre l'homotopie $H : X \cup Y \rightarrow \text{Cyl}(f)^{[0,1]}$ au dessus de l'identité en une homotopie $\tilde{H} : \text{Cyl}(f) \rightarrow \text{Cyl}(f)^{[0,1]}$ telle que $\tilde{H}(-, 1)|_{X \cup Y}$ est à valeur dans X et vaut l'identité sur X .
5. La question précédente nous fournit une application de paires $\tilde{H}(-, 1) : (\text{Cyl}(f), X \cup Y) \rightarrow (\text{Cyl}(f), X)$. Maintenant, il nous suffit de considérer l'application composée de paires

$$(X \times [0, 1] \cup Y, X \times \{0, 1\} \cup Y) \rightarrow (\text{Cyl}(f), X \times \{1\} \cup Y) \xrightarrow{\tilde{H}(-, 1)} (\text{Cyl}(f), X)$$

dont la source est une paire cellulaire (la première flèche étant l'application quotient). Le résultat de la question 1 nous donne bien, après passage au quotient, une homotopie rel. $X \cup Y$ (donc *a fortiori* rel. X) entre l'identité du cylindre et une application $\text{Cyl}(f) \rightarrow X$. En composant avec l'inclusion $X \hookrightarrow \text{Cyl}(f)$, on obtient une l'application $F : \text{Cyl}(f) \rightarrow \text{Cyl}(f)$ désirée.

6. On peut maintenant prouver le théorème. Puisque l'application canonique $\text{Cyl}(f) \xrightarrow{\cong} Y$ est une équivalence d'homotopie, de la factorisation $f : X \hookrightarrow \text{Cyl}(f) \xrightarrow{\cong} Y$, on déduit que $X \hookrightarrow \text{Cyl}(f)$ est une équivalence faible et qu'il suffit désormais de montrer que c'est une équivalence d'homotopie pour conclure. Montrons que c'est en fait un rétracte par déformation, c'est à dire qu'on peut trouver une homotopie entre l'identité de $\text{Cyl}(f)$ et une application envoyant $\text{Cyl}(f)$ sur X (toujours relativement à X , c'est à dire étant l'identité sur X). C'est exactement le contenu de la question 5.

Exercice 6 (Une propriété de relèvement dans le cas des complexes).

Soit $f : X_* \rightarrow Y_*$ un quasi-isomorphisme de complexes de chaînes concentrés en degrés positifs. On suppose que $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ est surjectif en tout degré.

1. Démontrer que les groupes d'homologie du complexe $\text{Ker}(f : X \rightarrow Y)$ sont tous nuls.
2. Soit $\psi : P_* \rightarrow Y_*$ un morphisme de complexes de chaînes tels que les P_n soient des modules projectifs. Le but de la question est de montrer qu'il existe un relèvement h qui rende commutatif le diagramme de complexe de chaînes

$$\begin{array}{ccc} & & X_* \\ & \nearrow h & \downarrow f \\ P_* & \xrightarrow{\psi} & Y_* \end{array}$$

- (a) On suppose avoir construit $h_i : P_i \rightarrow X_i$ pour $i = 0 \dots n$ tel que $f_i \circ h_i = \psi_i$ et les h_i commute avec les différentielles. Démontrer qu'il existe un morphisme linéaire $\tilde{h}_{n+1} : P_{n+1} \rightarrow X_{n+1}$ relevant ψ_{n+1} de sorte que pour tout $p \in P_n$, $d \circ \tilde{h}_{n+1}(p) - h_n(dp)$ est un bord.
- (b) Conclure à l'existence de h .

Solution 6. 1. On a une suite exacte courte de complexes

$$0 \longrightarrow \ker f \longrightarrow X_* \xrightarrow{f_*} Y_* \longrightarrow 0,$$

qui induit la suite exacte longue en homologie

$$\cdots \rightarrow H_i(\ker f) \rightarrow H_i(X_*) \xrightarrow{f_*} H_i(Y_*) \rightarrow H_i(\ker f) \rightarrow \dots$$

Comme f_* est un isomorphisme, on a $H_i(\ker f) = 0$ pour tout i .

2. (a) Comme P_{n+1} est projective et f_{n+1} surjective, il existe un relèvement R -linéaire $\tilde{h}_{n+1} : P_{n+1} \rightarrow X_{n+1}$ de ψ_{n+1} . Comme ψ et f sont des morphismes de complexes de chaînes, il vient

$$f \left(d \circ \tilde{h}_{n+1}(p) - h_n(dp) \right) = d(f \circ \tilde{h}_{n+1})(p) - f \circ h_n(dp) = d\psi_{n+1}(p) - \psi_n(d(p)) = 0.$$

Comme $dh_n = h_{n-1}d$ par hypothèse, $d \circ \tilde{h}_{n+1}(p) - h_n(dp)$ est un cycle dans le sous-complexe $\ker(f)$. Par la question 1., il existe $z(p) \in X_{n+1}$ tel que $f(z) = 0$ et $dz = d \circ \tilde{h}_{n+1}(p) - h_n(dp)$. En vue de la question suivante, on cherche à définir une application R -linéaire $p \mapsto z(p)$. Pour cela, on utilise que $\ker f$ est acyclique et donc $B_n(\ker f) = Z_n(\ker f)$ ainsi que la projectivité de P_{n+1} . Cela permet de définir un relèvement z_{n+1} dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} & & \ker(f)_{n+1} \\ & \overset{z_{n+1}}{\curvearrowright} & \downarrow d \\ P_{n+1} & \xrightarrow{f_n(d\tilde{h}_{n+1} - h_nd)} & Z_n(\ker f) \quad \longleftarrow \quad B_n(\ker f) \end{array}$$

- (b) On construit h_n par induction sur n . Pour $n = 0$, on utilise la projectivité de P_0 pour choisir un relèvement h_0 . La condition sur la différentielle est évidemment vérifiée.

Supposons maintenant avoir défini $h_i : P_i \rightarrow X_i$ pour $i = 0, \dots, n$ satisfaisant aux conditions de la question (a). Par le point (a), il existe des applications linéaires

$$\tilde{h}_{n+1} : P_{n+1} \rightarrow X_{n+1} \quad \text{et} \quad z_{n+1} : P_{n+1} \rightarrow \ker(f)_{n+1}$$

telles que

$$\begin{cases} f_{n+1}\tilde{h}_{n+1} = \psi_{n+1} \\ dz_{n+1} = d\tilde{h}_{n+1} - h_nd. \end{cases}$$

On pose $h_{n+1} = \tilde{h}_{n+1} - z_{n+1}$. Alors $dh_{n+1} = h_nd$ et $fh_{n+1} = f\tilde{h}_{n+1} = \psi_{n+1}$. On a bien construit un morphisme de complexe de chaînes $h : P_* \rightarrow X_*$ relevant ψ .

Exercice 7 (Foncteurs additifs). Soit $f : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ un foncteur entre catégories additives.

1. Montrer que pour tout $f, g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, la somme $f + g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ est égale à la composée

$$X \xrightarrow{\delta} X \times X \xrightarrow{(f,g)} Y \times Y \xrightarrow{\sim} Y \oplus Y = Y \amalg Y \xrightarrow{\sigma} Y$$

où δ et σ sont les applications naturelles induites par $\text{Id}_X : X \rightarrow X$ et $\text{Id}_Y : Y \rightarrow Y$.

2. En déduire que F est additif si et seulement si, l'application canonique $F(X) \oplus F(Y) \rightarrow F(X \oplus Y)$ est un isomorphisme pour tout X, Y objets de $\mathcal{C}$.

Solution 7. 1. Rappelons que la somme directe $A \oplus B$ est caractérisée par l'existence de morphismes $i_A : A \rightarrow A \oplus B \leftarrow B : i_B$ et $A \xrightarrow{p_A} A \oplus B \xrightarrow{p_B} B$ vérifiant $i_A p_A + i_B p_B = \text{Id}_{A \oplus B}$, $p_A i_A = \text{Id}_A$, $p_B i_B = \text{Id}_B$, $p_B i_A = 0$ et $p_A i_B = 0$. En particulier

$$\begin{aligned} \sigma \circ (f, g) \circ \delta &= \sigma \circ (f, g)(i_A p_A + i_B p_B) \circ \delta \\ &= \sigma \circ f \circ i_A + \sigma \circ g \circ i_B \\ &= f + g. \end{aligned}$$

On a utilisé que la composition est un morphisme de groupes et les définitions de σ et δ dans les égalités ci-dessus.

2. On a $F(X \oplus Y) \cong F(X) \oplus F(Y)$, en particulier $F((f, g)) = (F(f), F(g))$. Comme $F(\text{Id}) = \text{Id}$, alors $F(\sigma_X) = \sigma_{F(X)}$ et de même $\delta_{F(X)} = F(\delta_X)$. Il suit alors du **i**) que

$$F(f + g) = F(\sigma \circ (f, g) \circ \delta) = \sigma \circ (F(f), F(g)) \circ \delta = F(f) + F(g).$$

La réciproque est immédiate en utilisant la caractérisation des sommes directes en fonction des applications i_A, p_A, i_B, p_B . Par exemple on a

$$F(p_A) \circ F(i_A) = F(p_A \circ i_A) = F(\text{Id}_A) = \text{Id}_{F(A)}$$

et les autres identités se démontrent de la même façon.

Exercice 8 (Un foncteur dérivé). Soit R un anneau commutatif $x \in R$ non diviseur de zéro

1. Soit $R/(x)$ le module quotient de R par xR . Trouver une résolution projective de $R/(x)$.
2. En déduire $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ et $\text{Ext}^1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z})$.
3. Soient M, L, K des R -modules. Montrer que $N \mapsto F(N) := \text{Hom}_R(M \otimes_R \text{Hom}_R(N, L), K)$ induit un foncteur F de la catégorie $R\text{-Mod}$ vers elle-même.
4. Donner des conditions sur L, M pour que F soit exact à gauche puis sur K, M pour que F soit exact à droite. Peut-on en déduire des conditions sur K, L, M pour que F soit exact ?
5. On suppose désormais que $R = \mathbb{Z}$, $M = \mathbb{Z}$ et $K = \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$.
 - (a) Vérifier que F est exact à droite puis donner une expression de son foncteur dérivé $\mathbb{L}F_*(R/(x))$.
 - (b) En déduire $H^i(\mathbb{L}(F)(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}))$ pour tout $i \in \mathbb{Z}$ pour $L = \mathbb{Z}$ puis $L = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Solution 8. 1. Le complexe de R -modules

$$\dots \longrightarrow 0 \longrightarrow R \xrightarrow{x} R$$

est une résolution projective (car libre) de $R/(x)$.

2. En appliquant la question précédente à $R/(x) = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, on obtient que pour tout groupe abélien A , $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^i(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, A)$ peut être calculé comme le i -ème groupe de cohomologie du complexe de chaînes

$$\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, A) \cong A \xrightarrow{\times n} \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, A) \cong A \longrightarrow 0 \longrightarrow \dots$$

Ainsi, il vient

$$\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^i(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, A) = \begin{cases} \ker(\times n: A \rightarrow A) \cong A[n] & \text{si } i = 0, \\ \text{coker}(\times n: A \rightarrow A) \cong A/nA & \text{si } i = 1, \\ 0 & \text{si } i > 1. \end{cases}$$

Pour $A = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, les groupes non-triviaux sont donc

$$\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^0(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/n \wedge m\mathbb{Z} \quad \text{et} \quad \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/n \wedge m\mathbb{Z}.$$

Pour $A = \mathbb{Z}$, seul le groupe $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est non-nul.

3. Rappelons que la composée de deux foncteurs covariants ou de deux foncteurs contravariants est un foncteur covariant. La composée d'un foncteur covariant et d'un foncteur contravariant (ou le contraire) est un foncteur contravariant. Or pour tout objet N de $\mathcal{C}$, $F(N) = \text{Hom}_A(M \otimes_A \text{Hom}_A(N, L), K)$ est la composée des foncteurs $\text{Hom}_A(-, K) : \mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathcal{C}$ (donc contravariant), $M \otimes_A - : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ (covariant) et $\text{Hom}_A(-, L) : \mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathcal{C}$ (donc contravariant). C'est donc un foncteur covariant.

4. i) Par définition F est exact à gauche s'il transforme toute suite exacte $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X''$ en une suite exacte $0 \rightarrow F(X') \rightarrow F(X) \rightarrow F(X'')$. En appliquant le foncteur $\text{Hom}_A(-, L)$ à la suite exacte $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X''$, on obtient le complexe

$$\text{Hom}_A(X'', L) \rightarrow \text{Hom}_A(X, L) \rightarrow \text{Hom}_A(X', L) \rightarrow 0.$$

On sait que ce complexe est une suite exacte lorsque $\text{Hom}_A(-, L)$ est exact à droite, c'est à dire si L est injectif. En ce cas, comme $M \otimes_A -$ est exact à droite, et $\text{Hom}_A(-, K)$ exact à gauche, on obtient que $0 \rightarrow F(X') \rightarrow F(X) \rightarrow F(X'')$ est exacte. Conclusion : il suffit que L soit injectif pour que F soit exact à droite.

- ii) Un raisonnement analogue assure que F est exact à gauche si M est plat (auquel cas $M \otimes_A -$ est exact à gauche) et K injectif.
 iii) De i), ii), on déduit que F est exact si K, L sont injectifs et M plat.

5. On remarque que $M = \mathbb{Z}$ est libre sur $\mathbb{Z}$, donc plat et $K = \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ est injectif.

- (a) Les hypothèses de 4.ii) sont satisfaites, donc F est exact à droite. En particulier il admet des foncteurs dérivés à gauche (puisque la catégorie $\text{Mod}(\mathbb{Z})$ admet assez d'objets projectifs).
 (b) On utilise la résolution projective de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ donnée en 1.: $\cdots \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z}$. On alors que, pour tout $i \in \mathbb{Z}$, les groupes de cohomologie $L_i(F)(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ sont donnés par la formule :

$$L_i(F)(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) = H^{-i}(\cdots \rightarrow 0 \rightarrow F(\mathbb{Z}) \xrightarrow{F(\times m)} F(\mathbb{Z})).$$

Ceci donne immédiatement $L^{i>1}(F)(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) = 0$. Comme $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} X \cong X$ (l'isomorphisme étant donné par $k \otimes_{\mathbb{Z}} x \mapsto kx$) et $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, X) \cong X$ (l'isomorphisme étant donné par $\varphi \mapsto \varphi(1)$), on obtient $F(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ et $F(\times m) = \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. Comme $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ est divisible (c'est à dire que pour tout $x, n \in \mathbb{Z} - \{0\}$, il existe $y \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ avec $ny = x$), on en déduit que

$$L^0(F)(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \cong \text{coker}(\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) = 0.$$

Il reste à calculer $L^1(F)(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \cong \ker(\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$. Tout élément de $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ est représenté par la classe d'un élément $p/q \in \mathbb{Q}$ avec $p \wedge q = 1$ (en notant $p \wedge q$ le pgcd de p et q). On obtient que $mp/q = 0 \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ si q/m . La réciproque est immédiate. Il en découle que

$$L^1(F)(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

Évidemment, on utilise la même résolution projective de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Avec $L = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, on a $F(\mathbb{Z}) = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$. Un morphisme $\varphi : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ est uniquement déterminé par l'image $\varphi(1)$ qui en outre doit vérifier $0 = \varphi(n) = n\varphi(1)$. On en déduit que $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \cong \ker(\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Par conséquent on doit calculer la cohomologie du complexe

$$\cdots 0 \rightarrow 0 \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

On obtient alors par des calculs similaires à ceux de la question 2.

$$L^0(F)(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/n \wedge m\mathbb{Z}, \quad L^1(F)(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/n \wedge m\mathbb{Z}, \quad L^{i>1}(F)(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) = 0.$$