

FEUILLE DE TRAVAUX DIRIGÉS 3

Exercice 1. On considère la fonction $\begin{cases} f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, x_2) \mapsto x_1^2 + x_2^2. \end{cases}$

Quel est son domaine de définition ? Pourquoi cette fonction est continue ?

Posons $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^{+2} ; x_1 + x_2 = 1\}$. Représenter graphiquement A .

Montrer que A est un ensemble fermé et borné de \mathbb{R}^2 .

Montrer que la fonction f admet un maximum M et un minimum m sur A et qu'ils sont atteints.

Que valent M et m ? Où sont-ils atteints ?

Exercice 2. Une ménagère achète un adoucissant P_1 et une lessive P_2 . Le prix de l'adoucissant P_1 est p_1 et le prix de la lessive P_2 est p_2 . Elle achète des deux produits pour un panier global de 10 euros. Posons x_1 la quantité d'adoucissant achetée et x_2 la quantité de lessive achetée.

Écrire l'équation qui représente la valeur du panier acheté.

On modélise l'utilité du panier par la fonction $\begin{cases} f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, x_2) \mapsto \ln(x_1 + 1) + 2 \ln(x_2 + 1). \end{cases}$

Existe-t-il une utilité optimale ? Si oui pour quelles quantités achetées ? On pose $\alpha(p_1, p_2)$ la quantité de lessive achetée dans ce cas. Que se passe-t-il si $2p_1 \leq p_2 + 10$ et si $2p_1 \geq p_2 + 10$? Commenter ces résultats.

Quel est le signe de $\frac{\partial \alpha}{\partial p_1}$ et de $\frac{\partial \alpha}{\partial p_2}$? Commenter.

Si l'adoucissant coûte 2 euros et la lessive 5 euros, en quelles proportions faut-il acheter les deux produits pour un résultat maximal ? Commenter.

Exercice 3. Soit f la fonction polynomiale définie par $f(x) := x^4 + x^3 - 55x^2 - 45x + 36$. Calculer $f(-2)$, $f(0)$ et $f(1)$. Montrer que f s'annule entre -2 et 0 et entre 0 et 1 .

Exercice 4. Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ une fonction continue croissante.

Montrer que f admet au moins un point fixe (c'est-à-dire une solution à l'équation $f(x) = x$).

Exercice 5. Soit f la fonction définie par $\begin{cases} f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{2}{1 + e^{-4x^3}}. \end{cases}$

Quel est le domaine de définition de f ? Montrer que f est continue et strictement croissante (sans utiliser la dérivée).

En déduire que la valeur $\frac{e}{2}$ est atteinte une seule fois par f .

Préciser si $\frac{e}{2}$ est l'image d'un nombre positif ou négatif.

Exercice 6. Calculer $81^{\frac{1}{4}}$, $256^{\frac{3}{8}}$ et $125^{-\frac{1}{3}}$.
Calculer $\ln(e^{\frac{1}{2}}) + \ln(\frac{1}{2}) + \ln(4\sqrt{2}) - \ln 2$.

Exercice 7. Résoudre les équations suivantes

(1) $2e^{2x} - 9e^x + 7 = 0,$

(2) $5^x = 3^{x^2},$

(3) $x^{\sqrt{x}} = \sqrt{x}^x.$