

## Feuille de TD 1 : Rappels de calcul intégral et fonctions test

**Exercice 1** Existe-t-il une fonction  $g$  intégrable sur  $\mathbb{R}$  telle que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $ne^{-n|x|} \leq g(x)$  ?

**Exercice 2** Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Montrer que, dans  $\mathbb{R}^d$ ,

- $\int_{B(0,1)} \frac{1}{\|x\|^\alpha} dx$  est convergente si et seulement si  $\alpha < d$ .
- $\int_{\mathbb{R}^d \setminus B(0,1)} \frac{1}{\|x\|^\alpha} dx$  est convergente si et seulement si  $\alpha > d$ .

**Exercice 3** Soit  $a > 0$ . On pose pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$F(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} e^{-at^2} dt.$$

- Montrer que  $F$  est bien définie sur  $\mathbb{R}$ .
- Montrer que  $F$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$  et que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$F'(x) = -\frac{x}{2a} F(x).$$

- En déduire que pour tout réel  $x$ ,  $F(x) = F(0)e^{-\frac{x^2}{4a}}$  puis que

$$\forall x \in \mathbb{R}, F(x) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{x^2}{4a}}.$$

On rappelle que  $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$ .

**Exercice 4** Soit  $f \in L^1(\mathbb{R})$ . On considère l'application

$$Tf : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \int_0^1 f(x-y) dy.$$

- Montrer que, si  $f$  est continue à support compact,  $Tf$  est continue.
- Soit  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de fonctions continues à support compact qui converge vers  $f$  dans  $L^1(\mathbb{R})$ . Montrer que  $(Tf_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers  $Tf$  uniformément sur  $\mathbb{R}$ . En déduire que  $Tf$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .

- En déduire que le produit de convolution sur  $L^1(\mathbb{R})$  n'admet pas d'élément unité.

**Exercice 5** On note  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^d$ .

- Soit  $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de fonctions de  $C_0^\infty(\Omega)$ , et  $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$ . Rappeler la définition de “ $(\varphi_n)_n$  converge vers  $\varphi$  dans  $C_0^\infty(\Omega)$ ”.
- Soit  $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ , non nulle, et  $a \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ . Soit

$$\chi_n(x) = e^{-n|x|^2} \chi(x - na).$$

Montrer que  $(\chi_n)_n$  converge vers la fonction constante nulle uniformément dans  $\mathbb{R}^d$ . Est-ce que  $(\chi_n)_n$  converge dans  $C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$  ?

- Soit  $B(0,1)$  la boule unité ouverte de  $\mathbb{R}^d$  et  $\rho$  une fonction pic sur  $B(0,1)$ , telle que construite dans le cours:

- $\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ ,
- $\rho(x) > 0$  pour  $|x| < 1$ ,
- $\text{supp } \rho = \overline{B(0,1)}$ ,
- $\int_{\mathbb{R}^d} \rho(x) dx = 1$ .

Soit  $\rho_n = n^d \rho(nx)$ . Soit  $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ . Montrer que  $\rho_n * \chi$  converge vers  $\chi$  dans  $C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ .

**Exercice 6** Soit  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^d$ .

- Soit  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ . Rappeler la définition du support et du support essentiel de  $f$ .
- Soit  $A \subset \Omega$ . Quel est le support de la fonction indicatrice  $\mathbf{1}_A$  de  $A$ ? Supposons  $A$  mesurable, de mesure nulle. Quel est le support essentiel de  $\mathbf{1}_A$ ? de  $\mathbf{1}_{\Omega \setminus A}$  ?
- Soit  $\varphi$  une fonction continue sur  $\Omega$ . Montrer que le support et le support essentiel de  $A$  sont identiques.
- Soient  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  et  $g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  dont les supports sont disjoints. Montrer que  $fg = 0$ . Cela reste-t-il vrai si on suppose uniquement que leurs supports essentiels sont disjoints?