

TRAVAUX PRATIQUES - E.D.P.

2 juin 2014 - 13h30-17h30

Travail individuel

Les Différences Finies pour l'équation de la chaleur

On souhaite résoudre numériquement l'E.D.P. suivante

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) - \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t, x) = f(t, x), \quad \forall (t, x) \in [t_0; t_0 + T] \times]a; b[, \quad (1)$$

$$u(t_0, x) = u_0(x), \quad \forall x \in [a; b], \quad (2)$$

$$u(t, a) = u_a(t), \quad \forall t \in [t_0; t_0 + T], \quad (3)$$

$$u(t, b) = u_b(t), \quad \forall t \in [t_0; t_0 + T]. \quad (4)$$

avec ν un réel strictement positif, $t_0 \in \mathbb{R}$, $T > 0$, $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $a < b$.

On note t^n , $n \in \llbracket 0, N_t \rrbracket$ et x_i , $i \in \llbracket 0, N_x \rrbracket$ les discrétisations régulières des intervalles $[t_0; t_0 + T]$ et $[a; b]$ avec N_t pas de discrétisation en temps et N_x pas de discrétisation en espace.

On souhaite implémenter deux schémas de résolution de cette E.D.P. :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} - \nu \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{\Delta x^2} = f_i^{n+1}. \quad (5)$$

et

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} - \nu \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} = f_i^n. \quad (6)$$

où $\Delta t = T/N_t$, $\Delta x = (b - a)/N_x$, $f_i^n = f(t^n, x_i)$ et $u_i^n \approx u(t^n, x_i)$.

On rappelle que le premier schéma est le **schéma d'Euler implicite** et le second le **schéma d'Euler explicite**. Le schéma d'Euler implicite est inconditionnellement stable et le schéma d'Euler explicite est stable sous la condition de C.F.L.

$$\nu \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2}.$$

On note, $\forall n \in \llbracket 0, N_t \rrbracket$, \mathbf{U}^n les vecteurs de dimension $N_x + 1$, de composantes $\mathbf{U}_i^n = u_{i-1}^n$, $\forall i \in \llbracket 1, N_x + 1 \rrbracket$.

Q. 1 Pour chaque schéma, écrire sur feuille et **de manière détaillée** la discrétisation de l'E.D.P. (1) à (4) ■

On étudie cette E.D.P. avec les données $t_0 = 0$, $T = 2$, $a = 0$, $b = 2\pi$, $\nu = 2$, $k = 5$

$$f(t, x) = -k \sin(kt) \cos(x) + \nu \cos(kt) \cos(x),$$

$$u_0(x) = \cos(kt_0) \cos(x),$$

$$u_a(t) = \cos(kt) \cos(a),$$

$$u_b(t) = \cos(kt) \cos(b).$$

Dans ce cas, la solution exacte est donnée par $u_{\text{ex}}(t, x) = \cos(kt) \cos(x)$.

Q. 2 1. Pour résoudre l'E.D.P. par un schéma d'Euler implicite, le programme `Q2mainIm.m` (script Matlab) est fourni, ainsi que les fonctions `CalculF.m`, `NormInf.m` et `PlotSol.m` (voir fichier `CodesFournisG3.tar.gz`). Dans les codes fournis, il manque le fichier `Q2implicite.m` correspondant à la fonction :

```
[t, x, u]=Q2implicite(EDP, Nt, Nx)
```

résolvant l'E.D.P. par un schéma d'Euler implicite avec

- *EDP* : structure, définie dans *Q2mainIm.m*, contenant l'ensemble des données de l'E.D.P. à résoudre.
- *Nt* : nombre de pas de discrétisation en temps,
- *Nx* : nombre de pas de discrétisation en espace,
- *t* : discrétisation en temps (dimension $Nt+1$), $t(n) = t^{n-1}$, $\forall n \in \llbracket 1, Nt+1 \rrbracket$,
- *x* : discrétisation en espace (dimension $Nx+1$), $x(i) = x_{i-1}$, $\forall i \in \llbracket 1, Nx+1 \rrbracket$,
- *u* : $u(i,n)$ solution approchée au temps $t(n)$ et point $x(i)$ (dimension $(Nx+1, Nt+1)$).

Ecrire cette fonction.

2. Utiliser le **Profiler** de Matlab pour comparer les temps d'exécution de la fonction *Q2implicite* dans les cas où la matrice est stockée de manière pleine ou creuse. Pour cela, exécuter dans le profiler la commande `[t,x,u]=Q2implicite(EDP,5000,500)`; dans les deux cas et réaliser dans chaque cas un *SnapShot* (capture d'écran) que l'on nommera *ProfilerMatFull* et *ProfilerMatSparse* (format PNG sous Linux). ■

- Q. 3** 1. Pour résoudre l'E.D.P. par un schéma d'Euler explicite, le programme *Q3mainEx.m* (script Matlab) est fourni, ainsi que les fonctions *CalculF.m*, *NormInf.m* et *PlotSol.m*. (voir fichier *CodesFournisG3.tar.gz*). Dans les codes fournis, il manque le fichier *Q3explicite.m* correspondant à la fonction :

```
[t, x, u]=Q3explicite(EDP, Nt, Nx)
```

résolvant l'E.D.P. par un schéma d'Euler explicite. Les paramètres sont identiques à ceux de la fonction *Q2implicite.m*

2. Dans le programme *Q3explicite.m*, changer le paramètre *Nt* de 2100 à 2000. Que se passe-t-il lors de la résolution ? ■

A faire

- ◇ Rendre la(les) feuille(s) contenant la réponse à la question Q1. N'oubliez pas d'écrire votre nom sur chacune des feuilles et de les numéroter.
- ◇ Créer les 2 archives compressées nommées <NOM>-TP2-Q2 et <NOM>-TP2-Q3 contenant respectivement l'ensemble des fichiers nécessaires à l'exécution des programmes demandés en Q2 et Q3. Ici <NOM> correspond évidemment à votre nom.
- ◇ Envoyer un mail à cuvelier@math.univ-paris13.fr ayant pour **sujet** "<NOM> TP2 Q2a3" et en fichiers joints les 2 archives compressées créées précédemment ainsi que les captures d'écran (fichiers *ProfilerMatFull.png* et *ProfilerMatSparse.png*) de Q2.

Comme application possible nous allons résoudre numériquement par le schéma implicite d'Euler le problème de conduction thermique dans une barre de longueur $L = 6$:

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) - \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t, x) = 0, \quad \forall (t, x) \in]0; T[\times]0; L[, \quad (7)$$

$$u(t_0, x) = u_0(x), \quad \forall x \in [0; L], \quad (8)$$

$$u(t, 0) = u_g(t), \quad \forall t \in [0; T], \quad (9)$$

$$u(t, L) = u_d(t), \quad \forall t \in [0; T]. \quad (10)$$

avec $T = 10$, $u_0(x) = 100$, $\forall x \in [0, L]$

$$u_g(t) = \begin{cases} 100 - 90t, & \forall t \in [0, 1] \\ 10, & \forall t > 1 \end{cases}$$

$$u_d(t) = \begin{cases} 100 - 80t, & \forall t \in [0, 1] \\ 20, & \forall t > 1 \end{cases}$$

- Q. 4** 1. Ecrire le programme *barre1.m* permettant de résoudre ce problème par le schéma d'Euler implicite.

2. Exécuter ce programme pour différentes valeurs de ν (par exemple $\nu = 0.1$, $\nu = 1$ et $\nu = 10$). Qu'observe-t-on ? ■

Pour la seconde application, la seule modification par rapport à l'application précédente est que la conductivité thermique est une fonction constante par morceaux en espace :

$$\nu(x) = \begin{cases} 1, & \forall x \in [0, \frac{L}{3}] \\ 0.1 & \forall x \in]\frac{L}{3}, \frac{2L}{3}] \\ 1 & \forall x \in]\frac{2L}{3}, L]. \end{cases}$$

Q. 5 Écrire le programme `barre2.m` permettant de résoudre ce problème par le schéma d'Euler implicite. ■

A faire

- ◇ Créer l'archive compressée nommée `<NOM>-TP2-Q4a5` contenant l'ensemble des fichiers nécessaires à l'exécution des programmes demandés en Q.4 et Q.5 Ici `<NOM>` correspond évidemment à votre nom.
- ◇ Envoyer un mail à `cuvelier@math.univ-paris13.fr` ayant pour **sujet** "`<NOM> TP2 Q4a5`" et en fichier joint l'archive compressée créée précédemment.