

### **Théorème: Convergence locale de la méthode du point fixe**

Soit  $\alpha$  un point fixe d'une fonction  $\Phi$  de classe  $\mathcal{C}^1$  au voisinage de  $\alpha$ .

Si  $|\Phi'(\alpha)| < 1$ , alors il existe  $\delta > 0$  pour lequel  $x_k$  converge vers  $\alpha$  pour tout  $x_0$  tel que  $|x_0 - \alpha| \leq \delta$ . De plus, si  $x_0 \neq \alpha$ , on a

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{x_{k+1} - \alpha}{x_k - \alpha} = \Phi'(\alpha). \quad (\text{P-1})$$

*Proof.* Comme  $\Phi$  est continûment différentiable dans un voisinage de  $\alpha$  avec  $|\Phi'(\alpha)| < 1$ , alors il existe  $\delta > 0$  tel que  $\forall x \in \mathcal{V} = [\alpha - \delta, \alpha + \delta]$ ,  $|\Phi'(x)| < 1$ .

Soient  $x$  et  $y$  appartenant à  $\mathcal{V}$ , d'après le théorème des accroissements finis il existe  $\xi \in ]\alpha - \delta, \alpha + \delta[$  tel que

$$\Phi(x) - \Phi(y) = (x - y)\Phi'(\xi).$$

Ceci entraîne que  $\Phi$  est contractante sur  $\mathcal{V}$ . De plus  $\Phi(\mathcal{V}) \subset \mathcal{V}$  car  $\forall x \in \mathcal{V}$

$$|\Phi(x) - \Phi(\alpha)| = |x - \alpha||\Phi'(\xi)| \leq \delta|\Phi'(\xi)| \leq \delta$$

et donc  $|\Phi(x) - \alpha| \leq \delta$  i.e.  $\Phi(x) \in \mathcal{V}$ . On peut donc appliquer le théorème du point fixe (Théorème 2.3) (avec  $[a, b] = [\alpha - \delta, \alpha + \delta]$ ) ce qui donne la convergence de  $(x_k)$  vers  $\alpha$  pour tout  $x_0 \in \mathcal{V}$ .

Pour démontrer (P-1), on utilise une nouvelle fois le théorème des accroissements finis : il existe  $\xi_k \in ]\min(x_k, \alpha), \max(x_k, \alpha)[$  tel que

$$\Phi(x_k) - \Phi(\alpha) = \Phi'(\xi_k)(x_k - \alpha).$$

Comme  $\Phi(\alpha) = \alpha$  et  $\Phi(x_k) = x_{k+1}$ , on obtient

$$\frac{x_{k+1} - \alpha}{x_k - \alpha} = \Phi'(\xi_k).$$

Quand  $k \rightarrow +\infty$ , on a  $x_k \rightarrow \alpha$  et donc  $\xi_k \rightarrow \alpha$ . Par continuité de la fonction  $\Phi'$  on obtient (P-1). □

