

Analyse Numérique I
Sup'Galilée, Ingénieurs MACS, 1ère année

François Cuvelier

Laboratoire d'Analyse Géométrie et Applications
Institut Galilée
Université Paris XIII.

2021/10/25

Chapitre V

Interpolation

Plan

- 1 Interpolation de Lagrange
 - Stabilité
- 2 Interpolation de Lagrange-Hermite
 - Exercice
 - Résultats

Historique



(a) Joseph-Louis Lagrange 1736-1813, mathématicien italien puis français



(b) Pafnouti Lvovitch Tchebychev 1821-1894, mathématicien russe



(c) Charles Hermite 1822-1901, mathématicien français



(d) Henri-Léon Lebesgue 1875-1941, mathématicien français

Exercice 1.1:

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $n + 1$ couples de \mathbb{R}^2 , $(x_i, y_i)_{i \in [0, n]}$, tels que les x_i sont distincts deux à deux. On note

Q. 1

- Soit $i \in [0, n]$. Montrer qu'il existe un unique polynôme L_i de degré n vérifiant

$$L_i(x_j) = \delta_{ij}, \quad \forall j \in [0, n]. \quad (1)$$

- Montrer que les $(L_i)_{i \in [0, n]}$ forment une base de $\mathbb{R}_n[X]$ (espace vectoriel des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à n).

On définit le polynôme P_n par

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x). \quad (2)$$

Q. 2

Montrer que polynôme P_n est l'unique polynôme de degré au plus n vérifiant $P_n(x_i) = y_i, \forall i \in [1, n]$.

Definition 1.1

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $(x_i, y_i)_{i \in [0, n]}$ avec $(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$ et les x_i distincts deux à deux. Le polynôme d'interpolation de Lagrange associé aux $n + 1$ points $(x_i, y_i)_{i \in [0, n]}$, noté P_n , est donné par

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x), \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (3)$$


avec

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad \forall i \in [0, n], \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (4)$$

Théorème 1.2

Le polynôme d'interpolation de Lagrange, P_n , associé aux $n + 1$ points $(x_i, y_i)_{i \in [0, n]}$, est l'unique polynôme de degré au plus n , vérifiant

$$P_n(x_i) = y_i, \quad \forall i \in [0, n]. \quad (5)$$



Polynôme d'interpolation de Lagrange avec 7 points donnés



Exercice 1.2:




Ecrire la fonction **LAGRANGE** permettant de calculer \mathcal{P}_n (polynôme d'interpolation de Lagrange associé aux $n + 1$ points $(x_i, y_i)_{i \in [0, n]}$) au point $t \in \mathbb{R}$.

Soit une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que les y_i sont donnés par

$$y_i = f(x_i), \quad \forall i \in [0, n]. \quad (6)$$

On cherche à évaluer l'erreur $E_n(t) = f(t) - \mathcal{P}_n(t), \forall t \in [a, b]$.




Polynômes d'interpolation de lagrange avec $n = 6$ (7 points) uniformément répartis. A gauche pour la fonction $f : t \rightarrow \sin(t)$ avec $x_0 = 0, x_6 = 2\pi$ et à droite pour la fonction $f : t \rightarrow 1/(1 + t^2)$ avec $x_0 = -5, x_6 = 5$.

Soit une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que les y_i sont donnés par

$$y_i = f(x_i), \quad \forall i \in [0, n]. \quad (6)$$

On cherche à évaluer l'erreur $E_n(t) = f(t) - \mathcal{P}_n(t), \forall t \in [a, b]$.




Polynômes d'interpolation de lagrange avec $n = 10$ (11 points) uniformément répartis. A gauche pour la fonction $f : t \rightarrow \sin(t)$ avec $x_0 = 0, x_{10} = 2\pi$ et à droite pour la fonction $f : t \rightarrow 1/(1 + t^2)$ avec $x_0 = -5, x_{10} = 5$.

Soit une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que les y_i sont donnés par

$$y_i = f(x_i), \quad \forall i \in [0, n]. \quad (6)$$

On cherche à évaluer l'erreur $E_n(t) = f(t) - \mathcal{P}_n(t), \forall t \in [a, b]$.



Polynômes d'interpolation de lagrange avec $n = 18$ (19 points) uniformément répartis. A gauche pour la fonction $f : t \rightarrow \sin(t)$ avec $x_0 = 0, x_{18} = 2\pi$ et à droite pour la fonction $f : t \rightarrow 1/(1 + t^2)$ avec $x_0 = -5, x_{18} = 5$.



Exercice 1.3:



Soit $f \in C^{n+1}([a, b]; \mathbb{R})$. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $n + 1$ couples de $\mathbb{R}^2, (x_i, y_i)_{i \in [0, n]}$, tels que les x_i sont distincts deux à deux et $y_i = f(x_i)$. On note par \mathcal{P}_n le polynôme d'interpolation de Lagrange associé aux points $(x_i, y_i)_{i \in [0, n]}$ et π_n le polynôme de degré $n + 1$ défini par

$$\pi_n(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i). \quad (7)$$

Q. 1

Montrer que, $\forall x \in [a, b]$, il existe ξ_x appartenant au plus petit intervalle fermé contenant x, x_0, \dots, x_n tel que

$$f(x) - \mathcal{P}_n(x) = \frac{\pi_n(x)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi_x). \quad (8)$$

Indication : Etudier les zéros de la fonction $F(t) = f(t) - \mathcal{P}_n(t) - \frac{f(x) - \mathcal{P}_n(x)}{\pi_n(x)} \pi_n(t)$.

Théorème 1.3

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et x_0, \dots, x_n $n + 1$ points distincts de l'intervalle $[a, b]$. Soient $f \in \mathcal{C}^{n+1}([a; b]; \mathbb{R})$ et \mathcal{P}_n le polynôme d'interpolation de Lagrange de degré n passant par $(x_i, f(x_i)), \forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Alors, $\forall x \in [a, b], \exists \xi_x \in (\min(x_i, x), \max(x_i, x))$,

$$f(x) - \mathcal{P}_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i) \quad (9)$$

Comment "minimiser" $f(x) - \mathcal{P}_n(x)$?

Théorème 1.4

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et x_0, \dots, x_n $n + 1$ points distincts de l'intervalle $[a, b]$. Soient $f \in \mathcal{C}^{n+1}([a; b]; \mathbb{R})$ et \mathcal{P}_n le polynôme d'interpolation de Lagrange de degré n passant par $(x_i, f(x_i)), \forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Alors, $\forall x \in [a, b], \exists \xi_x \in (\min(x_i, x), \max(x_i, x))$,

$$f(x) - \mathcal{P}_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i) \quad (9)$$

Comment "minimiser" $f(x) - \mathcal{P}_n(x)$?

"jouer" sur le choix des points x_i

Trouver $(\bar{x}_i)_{i=0}^n, \bar{x}_i \in [a, b]$, distincts deux à deux, tels que $\forall (x_i)_{i=0}^n, x_i \in [a, b]$, distincts 2 à 2

$$\max_{t \in [a, b]} \prod_{i=0}^n |t - \bar{x}_i| \leq \max_{t \in [a, b]} \prod_{i=0}^n |t - x_i|, \quad (10)$$

On a alors le résultat suivant

Théorème 1.5: admis

Les points réalisant (10) sont les points de Chebyshev donnés par

$$\bar{x}_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos\left(\frac{(2i+1)\pi}{2n+2}\right), \forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket. \quad (11)$$




Figure: Erreurs d'interpolation avec $n = 6$




Figure: Erreurs d'interpolation avec $n = 10$




Figure: Erreurs d'interpolation avec $n = 18$

Plan

1 Interpolation de Lagrange

- Stabilité

2 Interpolation de Lagrange-Hermite

- Exercice
- Résultats

On commet des erreurs sur les données

$$f_i \approx f(x_i), \quad \forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket$$

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x) \quad \text{et} \quad \hat{P}_n(x) = \sum_{i=0}^n f_i L_i(x)$$

$$\begin{aligned} |\hat{P}_n(x) - P_n(x)| &= \left| \sum_{i=0}^n (f_i - f(x_i)) L_i(x) \right| \\ &\leq \sum_{i=0}^n |f_i - f(x_i)| |L_i(x)| \\ &\leq \max_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket} |f_i - f(x_i)| \sum_{i=0}^n |L_i(x)|. \end{aligned}$$

Constante de Lebesgue : $\Lambda_n = \max_{x \in [a, b]} \sum_{i=0}^n |L_i(x)|.$

$$\|\hat{P}_n - P_n\|_\infty \leq \Lambda_n \max_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket} |f_i - f(x_i)|.$$

Proposition:

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et x_0, \dots, x_n des points distincts de $[a, b]$. L'application $\mathcal{L}_n : \mathcal{C}^0([a, b]; \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$ qui à toute fonction $f \in \mathcal{C}^0([a, b]; \mathbb{R})$ donne le polynôme d'interpolation de Lagrange P_n associés aux couples de $(x_i, f(x_i))_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est bien définie et linéaire. De plus on a

$$\|\mathcal{L}_n\| \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{\substack{f \in \mathcal{C}^0([a, b]; \mathbb{R}) \\ f \neq 0}} \frac{\|\mathcal{L}_n(f)\|_\infty}{\|f\|_\infty} = \Lambda_n. \quad (12)$$

Théorème 1.6:

Pour toute fonction $f \in \mathcal{C}^0([a, b]; \mathbb{R})$, on a

$$\|f - \mathcal{L}_n(f)\|_\infty \leq (1 + \Lambda_n) \inf_{Q \in \mathbb{R}_n[X]} \|f - Q\|_\infty \quad (13)$$

- Pour les **points équidistants** $x_i = a + ih$, $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$ et $h = (b - a)/n$,

$$\Lambda_n \geq \frac{2^n}{4n^2} \quad (14)$$

et le comportement asymptotique

$$\Lambda_n \approx \frac{2^{n+1}}{e \cdot n \ln(n)} \quad \text{quand } n \rightarrow +\infty \quad (15)$$

- Pour les **points de Tchebychev**,

$$\Lambda_n \leq C \ln(n), \quad \text{avec } C > 0 \quad (16)$$

et le comportement asymptotique

$$\Lambda_n \approx \frac{2}{\pi} \ln(n) \quad \text{quand } n \rightarrow +\infty \quad (17)$$

Proposition: admis

Pour toute famille de points d'interpolation, il existe une fonction $f \in \mathcal{C}^0([a, b]; \mathbb{R})$ telle que la suite des polynômes d'interpolation associés ne converge pas uniformément.

Proposition: admis

Soit f une fonction lipschitzienne sur $[a, b]$ à valeurs réelles, i.e. il existe une constante $K \geq 0$ telle que $\forall (x, y) \in [a, b]^2$, on ait $|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|$. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et x_0, \dots, x_n les points de Tchebychev $[a, b]$. On note $\mathcal{L}_n(f)$ le polynôme d'interpolation de Lagrange associés aux couples de $(x_i, f(x_i))_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$. Alors la suite $(\mathcal{L}_n(f))_{n \geq 1}$ des polynômes d'interpolation converge uniformément vers f sur $[a, b]$.

Conclusion

L'interpolation de Lagrange en des points équidistants n'est à utiliser qu'avec un nombre de points assez faible : des phénomènes d'instabilités pouvant apparaître.

Plan

- 1 Interpolation de Lagrange
 - Stabilité
- 2 Interpolation de Lagrange-Hermite
 - Exercice
 - Résultats

Interpolation de Lagrange-Hermite Exercice 2021/10/25 20 / 29

Exercice 2.1: Interpolation de Lagrange-Hermite

Soient $(x_i, y_i, z_i)_{i \in [0, n]}$ $n + 1$ triplets de \mathbb{R}^3 , où les x_i sont des points distincts deux à deux de l'intervalle $[a, b]$. Le polynôme d'interpolation de **Lagrange-Hermite**, noté H_n , associé aux $n + 1$ triplets $(x_i, y_i, z_i)_{i \in [0, n]}$, est défini par

$$H_n(x_i) = y_i \quad \text{et} \quad H'_n(x_i) = z_i, \quad \forall i \in [0, n] \quad (18)$$

Q. 1
Quel est a priori le degré de H_n ?

On définit le polynôme P_n par

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i A_i(x) + \sum_{i=0}^n z_i B_i(x) \quad (19)$$

avec, pour $i \in [0, n]$, A_i et B_i polynômes de degré au plus $2n + 1$ indépendants des valeurs y_i et z_i .

Q. 2

- Déterminer des conditions suffisantes sur A_i et B_i pour que P_n vérifie (18).
- En déduire les expressions de A_i et B_i en fonction de L_i et de $L'_i(x_i)$ où

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Q. 3
Démontrer qu'il existe un unique polynôme d'interpolation de Lagrange-Hermite de degré au plus $2n + 1$ défini par (18).

Interpolation de Lagrange-Hermite Exercice 2021/10/25 21 / 29

Plan

- 1 Interpolation de Lagrange
 - Stabilité
- 2 Interpolation de Lagrange-Hermite
 - Exercice
 - Résultats

Interpolation de Lagrange-Hermite Résultats 2021/10/25 22 / 29

♥ Définition 2.1

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $(x_i, y_i, z_i)_{i \in [0, n]}$ $n + 1$ triplets de \mathbb{R}^3 , où les x_i sont des points distincts deux à deux de l'intervalle $[a, b]$. Le **polynôme d'interpolation de Lagrange-Hermite**, noté H_n , associé aux $n + 1$ triplets $(x_i, y_i, z_i)_{i \in [0, n]}$, est défini par

$$H_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i A_i(x) + \sum_{i=0}^n z_i B_i(x) \quad (20)$$

avec

$$A_i(x) = (1 - 2L'_i(x_i)(x - x_i))L_i^2(x) \quad \text{et} \quad B_i(x) = (x - x_i)L_i^2(x) \quad (21)$$

où

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Interpolation de Lagrange-Hermite Résultats 2021/10/25 23 / 29

📖 Théorème 2.2

Le **polynôme d'interpolation de Lagrange-Hermite**, H_n , associé aux $n + 1$ triplets $(x_i, y_i, z_i)_{i \in [0, n]}$, est l'unique polynôme de degré au plus $2n + 1$, vérifiant

$$H_n(x_i) = y_i \quad \text{et} \quad H'_n(x_i) = z_i, \quad \forall i \in [0, n] \quad (22)$$

Interpolation de Lagrange-Hermite Résultats 2021/10/25 24 / 29

Exercice 2.2: Interpolation de Lagrange-Hermite

Soit $f \in C^{2n+2}([a, b]; \mathbb{R})$. On suppose de plus que, $\forall i \in [0, n]$, $x_i \in [a, b]$, $y_i = f(x_i)$ et $z_i = f'(x_i)$. On note

$$\pi_n^2(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)^2$$

et H_n le polynôme d'interpolation de Lagrange-Hermite associé aux triplets $(x_i, f(x_i), f'(x_i))_{i \in [0, n]}$.

Q. 1
Montrer que

$$|f(x) - H_n(x)| \leq \frac{\|f^{(2n+2)}\|_{\infty}}{(2n+2)!} \pi_n^2(x). \quad (23)$$

Indications : Etudier les zéros de la fonction $F(y) = f(y) - H_n(y) - \frac{f(x) - H_n(x)}{\pi_n^2(x)} \pi_n^2(y)$ et appliquer le théorème de Rolle.

Interpolation de Lagrange-Hermite Résultats 2021/10/25 25 / 29

Théorème 2.3

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et x_0, \dots, x_n , $n + 1$ points distincts de l'intervalle $[a, b]$. Soient $f \in \mathcal{C}^{2n+2}([a, b]; \mathbb{R})$ et H_n le polynôme d'interpolation de Lagrange-Hermite associé aux $n + 1$ triplets $(x_i, f(x_i), f'(x_i))_{i \in [0, n]}$. On a alors $\forall x \in [a, b]$, $\exists \xi_x \in (\min(x_i, x), \max(x_i, x))$, tels que

$$f(x) - H_n(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi_x)}{(2n+2)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)^2 \quad (24)$$

Polynômes d'interpolation de Lagrange-Hermite avec $n=6$





Figure: Polynôme d'interpolation de Lagrange-Hermite avec $n = 6$ (7 points) pour la fonction $f : x \rightarrow 1/(1 + 25x^2)$. A gauche avec des points uniformément répartis et à droite avec des points de Tchebychev

Polynômes d'interpolation de Lagrange-Hermite avec $n=6$



Polynômes d'interpolation de Lagrange-Hermite avec $n=10$






Figure: Polynôme d'interpolation de Lagrange-Hermite avec $n = 10$ (11 points) pour la fonction $f : x \rightarrow 1/(1 + 25x^2)$. A gauche avec des points uniformément répartis et à droite avec des points de Tchebychev

Polynômes d'interpolation de Lagrange-Hermite avec $n=10$



Polynômes d'interpolation de Lagrange-Hermite avec $n=18$



Polynômes d'interpolation de Lagrange-Hermite avec $n=18$




Figure: Polynôme d'interpolation de Lagrange-Hermite avec $n = 18$ (19 points) pour la fonction $f : x \rightarrow 1/(1 + 25x^2)$. A gauche avec des points uniformément répartis et à droite avec des points de Tchebychev

Exercice 2.3: Interpolation de Lagrange-Hermite

Ecrire une fonction algorithmique **HERMITE** permettant de calculer H_n (polynôme d'interpolation de Lagrange-Hermite associé aux $n + 1$ triplets $(x_i, y_i, z_i)_{i \in [0, n]}$) en $t \in \mathbb{R}$.