Exercices associés au cours d'Analyse Numérique I

Résolution de systèmes linéaires

Méthodes directes

References

- [1] F. CUVELIER, *Analyse numérique I, rappels analyse et algèbre linéaire, résumé*. fichier pdf, https://www.math.univ-paris13.fr/~cuvelier/docs/Enseignements/MACS1/AnaNumI/24-25/rappels_print-2by1.pdf.
- [2] —, *Analyse numérique I, résolution de systèmes linéaires, méthodes directes, résumé*. fichier pdf, https://www.math.univ-paris13.fr/~cuvelier/docs/Enseignements/MACS1/AnaNumI/24-25/resume_RSLdirecte_print-2by1.pdf.

EXERCICE 1 : Résolution système triangulaire supérieur

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice triangulaire inversible et $\mathbf{b} \in \mathbb{C}^n$.

Q. 1 Expliquer comment calculer $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$, solution de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ et expliciter les formules permettant de calculer l'ensemble des composantes de $\mathbf{x}$.

Q. 2 Ecrire la fonction `ResTriSup` permettant de résoudre le système triangulaire supérieur $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Correction

R. 1 On veut résoudre le système linéaire

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \iff \begin{pmatrix} A_{1,1} & \dots & \dots & A_{1,n} \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & A_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

On remarque que l'on peut calculer successivement $x_n, x_{n-1}, \dots, x_1$, car il est possible de calculer x_i si on connaît $x_{i+1}, \dots, x_n$: c'est la **méthode de remontée**. En effet, on a

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, (A\mathbf{x})_i = b_i,$$

et donc, par définition d'un produit matrice-vecteur,

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{j=1}^n A_{i,j}x_j = b_i.$$

Comme A est une matrice triangulaire supérieure, on a (voir Définition 2.33 dans [1])

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, i > j, A_{i,j} = 0.$$

On obtient alors

$$\begin{aligned} \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, b_i &= \sum_{j=1}^{i-1} \underbrace{A_{i,j}}_{=0} x_j + A_{i,i}x_i + \sum_{j=i+1}^n A_{i,j}x_j \\ &= A_{i,i}x_i + \sum_{j=i+1}^n A_{i,j}x_j. \end{aligned} \tag{R1.1}$$

Algorithme 1 $\mathcal{R}_0$

1: Résoudre $\mathbb{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ en calculant successivement $x_n, x_{n-1}, \dots, x_1$.

Algorithme 1 $\mathcal{R}_1$

1: **Pour** $i \leftarrow n$ à 1 faire(pas de -1)
 2:     calculer x_i connaissant $x_{i+1}, \dots, x_n$
       à l'aide de l'équation (R1.1)
 3: **Fin Pour**

Algorithme 1 $\mathcal{R}_1$

1: **Pour** $i \leftarrow n$ à 1 faire(pas de -1)

2:     Calculer x_i connaissant $x_{i+1}, \dots, x_n$
       à l'aide de l'équation (R1.1)

3: **Fin Pour**

Algorithme 1 $\mathcal{R}_2$

1: **Pour** $i \leftarrow n$ à 1 faire(pas de -1)

2:      $S \leftarrow \sum_{j=i+1}^n A_{i,j}x_j$
 3:      $x_i \leftarrow (b_i - S)/A_{i,i}$

4: **Fin Pour**

Algorithme 1 $\mathcal{R}_2$

1: **Pour** $i \leftarrow n$ à 1 faire(pas de -1)

2:      $S \leftarrow \sum_{j=i+1}^n A_{i,j}x_j$

3:      $x_i \leftarrow (b_i - S)/A_{i,i}$

4: **Fin Pour**

Algorithme 1 $\mathcal{R}_3$

1: **Pour** $i \leftarrow n$ à 1 faire(pas de -1)

2:      $S \leftarrow 0$
 3:     **Pour** $j \leftarrow i + 1$ à n faire
 4:          $S \leftarrow S + A(i, j) * x(j)$
 5:     **Fin Pour**

6:      $x_i \leftarrow (b_i - S)/A_{i,i}$

7: **Fin Pour**

On obtient alors l'algorithme final

Algorithme 1 Fonction **ResTriSup** permettant de résoudre le système linéaire triangulaire supérieur inversible $\mathbb{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Données : $\mathbb{A}$: matrice triangulaire de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ supérieure inversible.

$\mathbf{b}$: vecteur de $\mathbb{R}^n$.

Résultat : $\mathbf{x}$: vecteur de $\mathbb{R}^n$.

1: **Fonction** $\mathbf{x} \leftarrow \text{ResTriSup}(\mathbb{A}, \mathbf{b})$
 2:     **Pour** $i \leftarrow n$ à 1 faire(pas de -1)
 3:          $S \leftarrow 0$
 4:         **Pour** $j \leftarrow i + 1$ à n faire
 5:              $S \leftarrow S + A(i, j) * x(j)$
 6:         **Fin Pour**
 7:          $x(i) \leftarrow (b(i) - S)/A(i, i)$
 8:     **Fin Pour**
 9: **Fin Fonction**

EXERCICE 2 : Matrice de permutation

Soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $i \neq j$, on note $\mathbb{P}_n^{[i,j]} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice identité dont on a permuté les lignes i et j .

Q. 1 Représenter cette matrice et la définir proprement.

Soit $\mathbb{A} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On note $\mathbf{A}_{r,\cdot}$ le r -ème vecteur ligne de $\mathbb{A}$ et $\mathbf{A}_{\cdot,s}$ le s -ème vecteur colonne de $\mathbb{A}$.

Q. 2

a. Déterminer les lignes de la matrice $\mathbb{D} = \mathbb{P}_n^{[i,j]}\mathbb{A}$ en fonction des vecteurs lignes de $\mathbb{A}$.

b. Déterminer les colonnes de la matrice $\mathbb{E} = \mathbb{A}\mathbb{P}_n^{[i,j]}$ en fonction des vecteurs colonnes de $\mathbb{A}$.

Q. 3

a. Calculer le déterminant de $\mathbb{P}_n^{[i,j]}$.

b. Déterminer l'inverse de $\mathbb{P}_n^{[i,j]}$.

Correction

R. 1

On note, dans toute la correction, $\mathbb{P} = \mathbb{P}_n^{[i,j]}$.

On peut définir cette matrice par ligne,

$$\begin{cases} \forall r \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i, j\}, & P_{r,s} = \delta_{r,s}, \quad \forall s \in \llbracket 1, n \rrbracket, \\ & P_{i,s} = \delta_{j,s}, \quad \forall s \in \llbracket 1, n \rrbracket, \\ & P_{j,s} = \delta_{i,s}, \quad \forall s \in \llbracket 1, n \rrbracket. \end{cases}$$

ou par colonne

$$\begin{cases} \forall s \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i, j\}, & P_{r,s} = \delta_{r,s}, \quad \forall r \in \llbracket 1, n \rrbracket, \\ & P_{r,i} = \delta_{r,j}, \quad \forall r \in \llbracket 1, n \rrbracket, \\ & P_{r,j} = \delta_{r,i}, \quad \forall r \in \llbracket 1, n \rrbracket. \end{cases}$$

Ne pas utiliser les indices i et j qui sont déjà fixés dans la définition de la matrice $\mathbb{P} = \mathbb{P}_n^{[i,j]}$.

On peut noter que la matrice $\mathbb{P}$ est symétrique. Pour la représentation, on suppose $i < j$. On effectue une représentation bloc 5×5 avec des blocs diagonaux carrés sachant que tous les blocs non décrits sont nuls:

R. 2

a. On note $\mathbb{D} = \mathbb{P}\mathbb{A}$. Par définition du produit matriciel on a

$$D_{r,s} = \sum_{k=1}^n P_{r,k} A_{k,s}.$$

On obtient, $\forall s \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\begin{cases} D_{r,s} = \sum_{k=1}^n \delta_{r,k} A_{k,s} = A_{r,s}, \quad \forall r \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i, j\}, \\ D_{i,s} = \sum_{k=1}^n \delta_{j,k} A_{k,s} = A_{j,s}, \\ D_{j,s} = \sum_{k=1}^n \delta_{i,k} A_{k,s} = A_{i,s}. \end{cases}$$

ce qui donne

$$\begin{cases} \mathbf{D}_{r,:} = \mathbf{A}_{r,:}, \quad \forall r \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i, j\}, \\ \mathbf{D}_{i,:} = \mathbf{A}_{j,:}, \\ \mathbf{D}_{j,:} = \mathbf{A}_{i,:}. \end{cases}$$

Note: La notation $\mathbf{D}_{i,:}$ correspond au vecteur ligne $(D_{i,1}, \dots, D_{i,n})$ et $\mathbf{D}_{:,j}$ correspond au vecteur colonne $\begin{pmatrix} D_{1,j} \\ \vdots \\ D_{n,j} \end{pmatrix}$

b. On note $\mathbb{E} = \mathbb{A}\mathbb{P}$. Par définition du produit matriciel et par symétrie de $\mathbb{P}$ on a

$$E_{r,s} = \sum_{k=1}^n A_{r,k} P_{k,s} = \sum_{k=1}^n A_{r,k} P_{s,k}.$$

Ne pas utiliser les indices i et j qui sont déjà fixés dans la définition de la matrice $\mathbb{P} = \mathbb{P}_n^{[i,j]}$.

On obtient en raisonnant par colonne, $\forall r \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\begin{cases} E_{r,s} = \sum_{k=1}^n A_{r,k} \delta_{s,k} = A_{r,s}, & \forall s \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i, j\}, \\ E_{r,i} = \sum_{k=1}^n A_{r,k} \delta_{j,k} = A_{r,j}, \\ E_{r,j} = \sum_{k=1}^n A_{r,k} \delta_{i,k} = A_{r,i}. \end{cases}$$

ce qui donne

$$\begin{cases} \mathbf{E}_{:,s} = \mathbf{A}_{:,s}, & \forall s \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i, j\}, \\ \mathbf{E}_{:,i} = \mathbf{A}_{:,j}, \\ \mathbf{E}_{:,j} = \mathbf{A}_{:,i}. \end{cases}$$

R. 3

a. $\det(\mathbb{P}) = -1$, si $i \neq j$ et $\det(\mathbb{P}) = 1$ sinon.

b. Immédiat par calcul direct on a $\mathbb{P}\mathbb{P} = \mathbb{I}$ et donc la matrice $\mathbb{P}$ est inversible et $\mathbb{P}^{-1} = \mathbb{P}$.

◇

EXERCICE 3 : Matrice d'élimination

Soit $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$ avec $v_1 \neq 0$. On note $\mathbb{E}^{[\mathbf{v}]}$ $\in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ la matrice triangulaire inférieure à diagonale unité définie par

$$\mathbb{E}^{[\mathbf{v}]} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ -v_2/v_1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ -v_n/v_1 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3.1)$$

Q. 1

a. Calculer le déterminant de $\mathbb{E}^{[\mathbf{v}]}$.

b. Déterminer l'inverse de $\mathbb{E}^{[\mathbf{v}]}$.

Soit $\mathbb{A} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec $A_{1,1} \neq 0$. On note $\mathbf{A}_{:,j}$ le j -ème vecteur colonne de $\mathbb{A}$ et $\mathbf{A}_{i,:}$ son i -ème vecteur ligne. On pose $\mathbf{A}_1 = \mathbf{A}_{:,1}$.

Q. 2

a. Calculer $\tilde{\mathbb{A}} = \mathbb{E}^{[\mathbf{A}_1]}\mathbb{A}$ en fonction des vecteurs lignes de $\mathbb{A}$.

b. Montrer que la première colonne de $\tilde{\mathbb{A}}$ est le vecteur $(A_{1,1}, 0, \dots, 0)^t$ i.e.

$$\mathbb{E}^{[\mathbf{A}_1]}\mathbb{A}\mathbf{e}_1 = A_{1,1}\mathbf{e}_1 \quad (3.2)$$

où $\mathbf{e}_1$ est le premier vecteur de la base canonique de $\mathbb{C}^n$.

Correction

R. 1

- a. La matrice $\mathbb{E}^{[v]}$ est triangulaire : son déterminant est donc le produit de ses éléments diagonaux (Proposition 2.35 de [1]) On a alors $\det(\mathbb{E}^{[v]}) = 1$.
- b. Pour calculer son inverse qui existe puisque $\det(\mathbb{E}^{[v]}) \neq 0$, on écrit $\mathbb{E}^{[v]}$ sous forme bloc :

$$\mathbb{E}^{[v]} = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline \mathbf{e} & & & \mathbb{I}_{n-1} \end{array} \right)$$

avec $\mathbf{e} = (-v_2/v_1, \dots, -v_n/v_1)^\top \in \mathbb{C}^{n-1}$ On note $\mathbb{X} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ son inverse qui s'écrit avec la même structure bloc

$$\mathbb{X} = \left(\begin{array}{c|c} a & \mathbf{b}^* \\ \hline \mathbf{c} & \mathbb{D} \end{array} \right)$$

avec $a \in \mathbb{C}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{C}^{n-1}$, $\mathbf{c} \in \mathbb{C}^{n-1}$ et $\mathbb{D} \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{C})$.

La matrice $\mathbb{X}$ est donc solution de $\mathbb{E}^{[v]}\mathbb{X} = \mathbb{I}$. Grâce à l'écriture bloc des matrices on en déduit rapidement la matrice $\mathbb{X}$. En effet, en utilisant les produits blocs des matrices, on obtient

$$\begin{aligned} \mathbb{E}^{[v]}\mathbb{X} &= \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & \mathbf{0}_{n-1}^\top & & \\ \hline \mathbf{e} & & & \mathbb{I}_{n-1} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c} a & \mathbf{b}^* \\ \hline \mathbf{c} & \mathbb{D} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 \times a & & & 1 \times \mathbf{b}^* + \mathbf{0}_{n-1}^\top \times \mathbb{D} \\ \hline \mathbf{e} \times a + \mathbb{I}_{n-1} \times \mathbf{c} & & & \mathbf{e} \times \mathbf{b}^* + \mathbb{I}_{n-1} \times \mathbb{D} \end{array} \right) \\ &= \left(\begin{array}{c|c} a & \mathbf{b}^* \\ \hline \mathbf{ae} + \mathbf{c} & \mathbf{eb}^* + \mathbb{D} \end{array} \right) \end{aligned}$$

Comme $\mathbb{X}$ est l'inverse de $\mathbb{E}^{[v]}$, on a $\mathbb{E}^{[v]}\mathbb{X} = \mathbb{I}$ et donc en écriture bloc

$$\left(\begin{array}{c|c} a & \mathbf{b}^* \\ \hline \mathbf{ae} + \mathbf{c} & \mathbf{eb}^* + \mathbb{D} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & & & \mathbf{0}_{n-1}^\top \\ \hline \mathbf{0}_{n-1} & & & \mathbb{I}_{n-1} \end{array} \right).$$

Ceci revient à résoudre les 4 équations

$$a = 1, \quad \mathbf{b}^* = \mathbf{0}_{n-1}^\top, \quad \mathbf{ae} + \mathbf{c} = \mathbf{0}_{n-1} \quad \text{et} \quad \mathbf{eb}^* + \mathbb{D} = \mathbb{I}_{n-1}$$

qui donnent immédiatement $a = 1$, $\mathbf{b} = \mathbf{0}_{n-1}$, $\mathbf{c} = -\mathbf{e}$ et $\mathbb{D} = \mathbb{I}_{n-1}$. On obtient le résultat suivant

$$\left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline -\mathbf{e} & & & \mathbb{I}_{n-1} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline \mathbf{e} & & & \mathbb{I}_{n-1} \end{array} \right) = \mathbb{I}_n.$$

R. 2

- a. Pour simplifier les notations, on note $\mathbb{E} = \mathbb{E}^{[A_1]}$. Par définition du produit de deux matrices on a

$$\tilde{A}_{i,j} = \sum_{k=1}^n E_{i,k} A_{k,j}, \quad \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2.$$

Quand $i = 1$, on a par construction $E_{1,k} = \delta_{1,k}$ et donc

$$\tilde{A}_{1,j} = A_{1,j}, \quad \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket \iff \tilde{\mathbf{A}}_{1,\cdot} = \mathbf{A}_{1,\cdot} \quad (\text{R3.2})$$

Pour $i \geq 2$, on a $E_{i,1} = -\frac{v_i}{v_1}$ et $E_{i,k} = \delta_{i,k}$, $\forall k \in \llbracket 2, n \rrbracket$. On obtient alors pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$

$$\tilde{A}_{i,j} = E_{i,1} A_{1,j} + \sum_{k=2}^n E_{i,k} A_{k,j} = -\frac{v_i}{v_1} A_{1,j} + \sum_{k=2}^n \delta_{i,k} A_{k,j} = -\frac{v_i}{v_1} A_{1,j} + A_{i,j}$$

ce qui donne pour tout $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$

$$\tilde{A}_{i,j} = A_{i,j} - \frac{v_i}{v_1} A_{1,j}, \quad \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket \iff \tilde{\mathbf{A}}_{i,:} = -\frac{v_i}{v_1} \mathbf{A}_{1,:} + \mathbf{A}_{i,:} \quad (\text{R3.3})$$

En conclusion, la matrice $\tilde{\mathbf{A}}$ s'écrit

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{1,:} \\ \text{-----} \\ \mathbf{A}_{2,:} - (v_2/v_1)\mathbf{A}_{1,:} \\ \text{-----} \\ \vdots \\ \text{-----} \\ \mathbf{A}_{n,:} - (v_n/v_1)\mathbf{A}_{1,:} \\ \text{-----} \end{pmatrix}$$

- b. De (R3.2), on tire $\tilde{A}_{1,1} = A_{1,1}$. A partir de (R3.3) on obtient pour tout $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$, $\tilde{A}_{i,1} = A_{i,1} - \frac{v_i}{v_1} A_{1,1}$. Par construction $v_j = A_{j,1}$ pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, ce qui donne $\tilde{A}_{i,1} = 0$. La première colonne de $\tilde{\mathbf{A}}$ est $(1, 0, \dots, 0)^t$.

◇

EXERCICE 4 : Méthode de Gauss, écriture algébrique

Soit $\mathbb{A} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ inversible.

Q. 1

Montrer qu'il existe une matrice $\mathbb{G} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $|\det(\mathbb{G})| = 1$ et $\mathbb{G}\mathbb{A}\mathbf{e}_1 = \alpha\mathbf{e}_1$ avec $\alpha \neq 0$ et $\mathbf{e}_1$ premier vecteur de la base canonique de $\mathbb{C}^n$.

Q. 2

a. Montrer par récurrence sur l'ordre des matrices que pour toute matrice $\mathbb{A}_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ inversible, il existe une matrice $\mathbb{S}_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $|\det \mathbb{S}_n| = 1$ et $\mathbb{S}_n \mathbb{A}_n = \mathbb{U}_n$ avec $\mathbb{U}_n$ matrice triangulaire supérieure inversible.

b. Soit $\mathbf{b} \in \mathbb{C}^n$. En supposant connue la décomposition précédente $\mathbb{S}_n \mathbb{A}_n = \mathbb{U}_n$, expliquer comment résoudre le système $\mathbb{A}_n \mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Q. 3

Que peut-on dire si $\mathbb{A}$ est non inversible?

Correction

R. 1

D'après le Lemme 2.2 de [2], si $A_{1,1} \neq 0$, le résultat est immédiat.

Dans l'énoncé rien ne vient corroborer cette hypothèse. Toutefois, comme la matrice $\mathbb{A}$ est inversible, il existe au moins un $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $A_{p,1} \neq 0$. On peut même choisir le premier indice p tel que $|A_{p,1}| = \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |A_{i,1}| > 0$ (pivot de l'algorithme de Gauss-Jordan). On note $\mathbb{P} = \mathbb{P}_n^{[1,p]}$ la matrice de permutation des lignes 1 et p (voir Lemme 2.1 de [2]).

$$|\det \mathbb{P}| = 1 \quad \text{et} \quad \mathbb{P}^{-1} = \mathbb{P}.$$

Par construction $(\mathbb{P}\mathbb{A})_{1,1} = A_{p,1} \neq 0$, et on peut alors appliquer le Lemme 2.2 de [2] à la matrice $(\mathbb{P}\mathbb{A})$ pour obtenir l'existence d'une matrice $\mathbb{E} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vérifiant $\det \mathbb{E} = 1$ et telle que

$$\mathbb{E}(\mathbb{P}\mathbb{A})\mathbf{e}_1 = A_{p,1}\mathbf{e}_1.$$

En posant $\mathbb{G} = \mathbb{E}\mathbb{P}$ et $\alpha = A_{p,1}$, on obtient bien $\mathbb{G}\mathbb{A}\mathbf{e}_1 = \alpha\mathbf{e}_1$. De plus, on a

$$|\det \mathbb{G}| = |\det(\mathbb{E}\mathbb{P})| = |\det \mathbb{E} \times \det \mathbb{P}| = 1.$$

Remarque. La matrice $\mathbb{G}$ étant inversible, on a

$$\mathbb{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \iff \mathbb{G}\mathbb{A}\mathbf{x} = \mathbb{G}\mathbf{b}$$

ce qui correspond à la première permutation/élimination de l'algorithme de Gauss-Jordan.

a. On veut démontrer, par récurrence sur $n \geq 2$, la propriété suivante

$(\mathcal{P}_n)$

$\forall A_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ inversible, $\exists S_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $|\det S_n| = 1$, tel que la matrice $U_n \stackrel{\text{def}}{=} S_n A_n$ soit une triangulaire supérieure inversible.

Initialisation : Pour $n = 2$. Soit $A_2 \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ inversible. En utilisant la question précédente il existe $G_2 \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ telle que $|\det G_2| = 1$ et $G_2 A_2 e_1 = \alpha e_1$ avec $\alpha \neq 0$ et e_1 premier vecteur de la base canonique de $\mathbb{C}^2$. On note $U_2 = G_2 A_2$. Cette matrice s'écrit donc sous la forme

$$U_2 = \begin{pmatrix} \alpha & \bullet \\ 0 & \bullet \end{pmatrix}$$

et elle est triangulaire supérieure. Les matrices G_2 et A_2 étant inversible, leur produit U_2 l'est aussi. La proposition $(\mathcal{P}_2)$ est donc vérifiée avec $S_2 = G_2$.

Hérédité : Soit $n \geq 3$. On suppose que $(\mathcal{P}_{n-1})$ est vraie. Montrons que $(\mathcal{P}_n)$ est vérifiée.

Soit $A_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ inversible. En utilisant la question précédente il existe $G_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $|\det G_n| = 1$ et $G_n A_n e_1 = \alpha_n e_1$ avec $\alpha_n \neq 0$ et e_1 premier vecteur de la base canonique de $\mathbb{C}^n$. On note $V_n = G_n A_n$. Cette matrice s'écrit donc sous la forme

$$V_n = \begin{pmatrix} \alpha_n & \bullet & \dots & \bullet \\ 0 & \bullet & \dots & \bullet \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \bullet & \dots & \bullet \end{pmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} \alpha_n & \mathbf{c}_{n-1}^* \\ 0 & \mathbb{B}_{n-1} \\ \vdots & \\ 0 & \end{pmatrix}$$

où $\mathbf{c}_{n-1} \in \mathbb{C}^{n-1}$ et $\mathbb{B}_{n-1} \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{C})$. Comme G_n et A_n sont inversibles, V_n l'est aussi. On en déduit donc que $\mathbb{B}_{n-1}$ est inversible car $0 \neq \det V_n = \alpha_n \times \det \mathbb{B}_{n-1}$ et $\alpha_n \neq 0$.

On peut donc utiliser la propriété $(\mathcal{P}_{n-1})$ (hyp. de récurrence) sur la matrice $\mathbb{B}_{n-1}$: il existe donc $S_{n-1} \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{C})$, avec $|\det S_{n-1}| = 1$, tel que la matrice $U_{n-1} = S_{n-1} \mathbb{B}_{n-1}$ soit une triangulaire supérieure inversible.

Soit $Q_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ la matrice définie par

$$Q_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & S_{n-1} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

On a alors

$$\begin{aligned} Q_n G_n A_n &= Q_n V_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & S_{n-1} & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_n & \mathbf{c}_{n-1}^* \\ 0 & \mathbb{B}_{n-1} \\ \vdots & \\ 0 & \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha_n & \mathbf{c}_{n-1}^* \\ 0 & \mathbb{B}_{n-1} \\ \vdots & \\ 0 & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_n & \mathbf{c}_{n-1}^* \\ 0 & U_{n-1} \\ \vdots & \\ 0 & \end{pmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} U_n \end{aligned}$$

La matrice U_n est triangulaire supérieure inversible car U_{n-1} l'est aussi et $\alpha_n \neq 0$.

On pose $S_n = Q_n G_n$. On a donc

$$S_n A_n = U_n.$$

De plus, comme on a $\det S_n = \det Q_n \times \det G_n$, et $\det Q_n = \det S_{n-1}$, on obtient, en utilisant $|\det G_n| = 1$ et l'hypothèse de récurrence $|\det S_{n-1}| = 1$, que

$$|\det S_n| = 1.$$

Ceci prouve la véracité de la proposition $(\mathcal{P}_n)$.

b. Comme S_n est inversible, on a en multipliant à gauche le système par S_n

$$A_n \mathbf{x} = \mathbf{b} \iff S_n A_n \mathbf{x} = S_n \mathbf{b} \iff U_n \mathbf{x} = S_n \mathbf{b}$$

Pour déterminer le vecteur $\mathbf{x}$, on peut alors résoudre le dernier système par l'algorithme de remontée.

R. 3 Si $\mathbb{A}$ est non inversible, alors dans la première question nous ne sommes pas assurés d'avoir $\alpha \neq 0$. Cependant l'existence de la matrice $\mathbb{G}$ reste avérée.
 Pour la deuxième question, le seul changement vient du fait que la matrice $\mathbb{U}_n$ n'est plus inversible. ◇

EXERCICE 5 : Vers la factorisation LU

Soit $\mathbb{A} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice dont les sous-matrices principales d'ordre i , notées Δ_i , $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.
 Montrer par récurrence sur l'ordre n de la matrice $\mathbb{A}$ qu'il existe une matrice $\mathbb{E} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, triangulaire inférieure à diagonale unité telle que la matrice $\mathbb{U}$ définie par

$$\mathbb{U} = \mathbb{E}\mathbb{A}$$

soit triangulaire supérieure avec $U_{i,i} = \det \Delta_i / (U_{1,1} \times \cdots \times U_{i-1,i-1})$, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Correction Soit $n \geq 2$, on va démontrer par récurrence sur n la proposition suivante

($\mathcal{P}_n$) Soit $\mathbb{A} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Si, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, les sous-matrices principales d'ordre i de $\mathbb{A}$, notées Δ_i , sont inversibles, alors il existe une matrice $\mathbb{E} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, triangulaire inférieure à diagonale unité telle que la matrice $\mathbb{U} = \mathbb{E}\mathbb{A}$ soit triangulaire supérieure avec $U_{i,i} = \det \Delta_i / (U_{1,1} \times \cdots \times U_{i-1,i-1})$, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Initialisation: $n = 2$ Soit $\mathbb{A} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Si $\Delta_1 = A_{1,1} \neq 0$ et $\Delta_2 = \mathbb{A}$ inversible. On va construire une matrice $\mathbb{E} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, triangulaire inférieure à diagonale unité telle que $\mathbb{U} = \mathbb{E}\mathbb{A}$ soit triangulaire supérieure.

$$\mathbb{E}\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ E_{2,1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ A_{2,1} & A_{2,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_{1,1} & U_{1,2} \\ 0 & U_{2,2} \end{pmatrix} = \mathbb{U}$$

On a donc $U_{2,1} = 0 = E_{2,1}A_{1,1} + A_{2,1}$. Comme par hypothèse, $A_{1,1} \neq 0$, on a $E_{2,1} = -A_{2,1}/A_{1,1}$, ce qui donne

$$\mathbb{E}\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{A_{2,1}}{A_{1,1}} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ A_{2,1} & A_{2,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ 0 & A_{2,2} - \frac{A_{2,1}}{A_{1,1}}A_{1,2} \end{pmatrix} = \mathbb{U}.$$

On a alors

$$\begin{aligned} U_{1,1} &= A_{1,1} = \det(\Delta_1), \\ U_{2,2} &= A_{2,2} - \frac{A_{2,1}}{A_{1,1}}A_{1,2} = \frac{A_{2,2}A_{1,1} - A_{2,1}A_{1,2}}{A_{1,1}} = \frac{\det \mathbb{A}}{U_{1,1}} = \frac{\det \Delta_2}{U_{1,1}}. \end{aligned}$$

Hérédité: Soit $n \geq 3$, on suppose que $(\mathcal{P}_{n-1})$ est vérifiée. Soit $\mathbb{A} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dont toutes les sous-matrices principales d'ordre i de $\mathbb{A}$, notées Δ_i , $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ sont inversibles. On décompose la matrice $\mathbb{A}$ sous la forme bloc

$$\mathbb{A} = \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{A}_{n-1} & \mathbf{g} \\ \hline \mathbf{f}^* & A_{n,n} \end{array} \right)$$

avec $\mathbb{A}_{n-1} \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{C})$, $\mathbf{f} \in \mathbb{C}^{n-1}$ et $\mathbf{g} \in \mathbb{C}^{n-1}$. Comme les $n - 1$ premières sous-matrices principales de $\mathbb{A}$ sont les $n - 1$ sous-matrices principales de $\mathbb{A}_{n-1}$, ces dernières sont, par hypothèse, inversibles. Par hypothèse de récurrence sur $\mathbb{A}_{n-1}$, il existe une matrice $\mathbb{E}_{n-1} \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{C})$, triangulaire inférieure à diagonale unité telle que la matrice $\mathbb{U}_{n-1} = \mathbb{E}_{n-1}\mathbb{A}_{n-1}$ soit triangulaire supérieure.

On va construire (si possible) une matrice $\mathbb{E} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, triangulaire inférieure à diagonale unité telle que $\mathbb{U} = \mathbb{E}\mathbb{A}$ soit triangulaire supérieure. La matrice $\mathbb{E}$ s'écrit sous forme bloc

$$\mathbb{E} = \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{X}_{n-1} & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{h}^* & 1 \end{array} \right)$$

avec $\mathbb{X}_{n-1} \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{C})$ triangulaire inférieure à diagonale unité et $\mathbf{h} \in \mathbb{C}^{n-1}$.

On a alors

$$\mathbb{E}\mathbb{A} = \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{X}_{n-1} & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{h}^* & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{A}_{n-1} & \mathbf{g} \\ \hline \mathbf{f}^* & A_{n,n} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{X}_{n-1}\mathbb{A}_{n-1} & \mathbb{X}_{n-1}\mathbf{g} \\ \hline \mathbf{h}^*\mathbb{A}_{n-1} + \mathbf{f}^* & \mathbf{h}^*\mathbf{g} + A_{n,n} \end{array} \right)$$

Pour que la matrice $\mathbb{E}\mathbb{A}$ soit triangulaire supérieure, il faut que $\mathbb{X}_{n-1}\mathbb{A}_{n-1}$ soit triangulaire supérieure et $\mathbf{h}^*\mathbb{A}_{n-1} + \mathbf{f}^* = 0$. En choisissant $\mathbb{X}_{n-1} = \mathbb{E}_{n-1}$, on a $\mathbb{U}_{n-1} = \mathbb{X}_{n-1}\mathbb{A}_{n-1}$ triangulaire supérieure. La matrice $\mathbb{A}_{n-1}$ étant inversible, on a $\mathbf{h}^* = -\mathbf{f}^*\mathbb{A}_{n-1}^{-1}$

On obtient donc

$$\mathbb{E}\mathbb{A} = \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{E}_{n-1} & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{h}^* & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{A}_{n-1} & \mathbf{g} \\ \hline \mathbf{f}^* & A_{n,n} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{U}_{n-1} & \mathbb{E}_{n-1}\mathbf{g} \\ \hline 0 & A_{n,n} - \mathbf{h}^*\mathbf{g} \end{array} \right) = \mathbb{U}.$$

On a donc construit une matrice triangulaire inférieure à diagonale unité, $\mathbb{E}$, telle que $\mathbb{U} = \mathbb{E}\mathbb{A}$ soit triangulaire supérieure. Par construction, on a

$$U_{i,j} = (\mathbb{U}_{n-1})_{i,j}, \quad \forall (i,j) \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket^2$$

et donc, par hypothèse de récurrence sur $\mathbb{U}_{n-1}$, on obtient

$$U_{i,i} = \det \Delta_i / (U_{1,1} \times \cdots \times U_{i-1,i-1}), \quad \forall i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket.$$

De plus on a,

$$\begin{aligned} \det(\mathbb{E}\mathbb{A}) &= \det(\mathbb{E}) \det(\mathbb{A}) \\ &= \det(\mathbb{A}) && \text{car } \mathbb{E} \text{ tri. inf. à diag. unité} \\ &= \det(\Delta_n). && \text{car } \Delta_n = \mathbb{A}. \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \det(\mathbb{U}) &= \prod_{k=1}^n U_{k,k} && \text{car } \mathbb{U} \text{ tri. sup.} \\ &= U_{n,n} \prod_{k=1}^{n-1} U_{k,k} \end{aligned}$$

Comme $\mathbb{U} = \mathbb{E}\mathbb{A}$, on en déduit que la matrice $\mathbb{U}$ est inversible (car $\mathbb{E}$ et $\mathbb{A}$ le sont), que ses coefficients sont non nuls et, en prenant le déterminant:

$$\det(\Delta_n) = U_{n,n} \prod_{k=1}^{n-1} U_{k,k}$$

et donc

$$U_{n,n} = \frac{\det(\Delta_n)}{\prod_{k=1}^{n-1} U_{k,k}}.$$

La proposition ($\mathcal{P}_n$) est donc vraie.

Conclusion: On a démontré par récurrence que la proposition ($\mathcal{P}_n$) est vraie pour tout $n \geq 2$.

◇

EXERCICE 6 : factorisation LDL*

Soit $\mathbb{A} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Q. 1

Montrer que s'il existe $\mathbb{L} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, matrice triangulaire inférieure à diagonale unité, et, $\mathbb{D} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, matrice diagonale à coefficients diagonaux strictement positifs, telle que $\mathbb{A} = \mathbb{L}\mathbb{D}\mathbb{L}^*$ alors $\mathbb{A}$ est hermitienne définie positive.

Q. 2

Montrer que si $\mathbb{A}$ est hermitienne définie positive alors il existe $\mathbb{L} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, matrice triangulaire inférieure à diagonale unité, et, $\mathbb{D} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, matrice diagonale à coefficients diagonaux strictement positifs, telle que $\mathbb{A} = \mathbb{L}\mathbb{D}\mathbb{L}^*$.

Correction

R. 1 Soit $\mathbb{A} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ admettant une factorisation $\mathbb{L}\mathbb{D}\mathbb{L}^*$ avec $\mathbb{L} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, matrice triangulaire inférieure à diagonale unité, et, $\mathbb{D} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, matrice diagonale à coefficients diagonaux strictement positifs.

La matrice $\mathbb{A}$ est alors hermitienne car

$$\mathbb{A}^* = (\mathbb{L}\mathbb{D}\mathbb{L}^*)^* = (\mathbb{L}^*)^* \mathbb{D}^* \mathbb{L}^* = \mathbb{L}\mathbb{D}\mathbb{L}^*.$$

De plus $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ on a

$$\langle \mathbb{A}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \langle \mathbb{L}\mathbb{D}\mathbb{L}^*\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \langle \mathbb{D}\mathbb{L}^*\mathbf{x}, \mathbb{L}^*\mathbf{x} \rangle$$

On pose $\mathbf{y} = \mathbb{L}^*\mathbf{x} \neq 0$ car $\mathbf{x} \neq 0$ et $\mathbb{L}^*$ inversible. On obtient alors

$$\langle \mathbb{A}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \langle \mathbb{D}\mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n D_{i,i} |y_i|^2 > 0$$

car $\mathbb{D}$ diagonale, $D_{i,i} > 0, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $\mathbf{y} \neq 0$.

La matrice hermitienne $\mathbb{A}$ est donc bien définie positive.

R. 2

Soit $\mathbb{A} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice hermitienne définie positive.

D'après le Corollaire 2.6 de [2], la matrice $\mathbb{A}$ admet une unique factorisation $\mathbb{L}\mathbb{U}$.

D'après le Théorème 2.8, la matrice hermitienne $\mathbb{A}$ peut alors s'écrire sous la forme $\mathbb{A} = \mathbb{L}\mathbb{D}\mathbb{L}^*$ où $\mathbb{D}$ est diagonale à coefficients réels et $\mathbb{L}$ triangulaire inférieure à diagonale unité.

Il reste à démontrer que $D_{i,i} > 0, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Comme $\mathbb{A}$ est définie positive, on a $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}, \langle \mathbb{A}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle > 0$. Or on a

$$\langle \mathbb{A}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \langle \mathbb{L}\mathbb{D}\mathbb{L}^*\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \langle \mathbb{D}\mathbb{L}^*\mathbf{x}, \mathbb{L}^*\mathbf{x} \rangle$$

On note $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$, la base canonique de $\mathbb{C}^n$ et on rappelle que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \langle \mathbb{D}\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_i \rangle = D_{i,i}$. Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. En choisissant $\mathbf{x} = (\mathbb{L}^*)^{-1}\mathbf{e}_i \neq 0$, on obtient alors

$$\langle \mathbb{D}\mathbb{L}^*\mathbf{x}, \mathbb{L}^*\mathbf{x} \rangle = \langle \mathbb{D}\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_i \rangle = D_{i,i} > 0.$$

◇

EXERCICE 7 : factorisation de Cholesky

Soit $\mathbb{A} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Q. 1

Montrer que si $\mathbb{A}$ admet une factorisation régulière de Cholesky alors $\mathbb{A}$ est hermitienne définie positive.

Q. 2

Montrer que si $\mathbb{A}$ est hermitienne définie positive alors elle admet une factorisation régulière de Cholesky.

Q. 3

On suppose que $\mathbb{A}$ est hermitienne définie positive.

a. Montrer que $\mathbb{A}$ admet une factorisation positive de Cholesky.

b. Montrer que cette factorisation est unique.

Correction

R. 1

Soit $\mathbb{A} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ admettant une factorisation régulière de Cholesky $\mathbb{A} = \mathbb{B}\mathbb{B}^*$ avec $\mathbb{B}$ est une matrice triangulaire inférieure inversible.

La matrice $\mathbb{A}$ est hermitienne car

$$\mathbb{A}^* = (\mathbb{B}\mathbb{B}^*)^* = (\mathbb{B}^*)^* \mathbb{B}^* = \mathbb{B}\mathbb{B}^* = \mathbb{A}.$$

Soit $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$, on a

$$\langle \mathbb{A}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \langle \mathbb{B}\mathbb{B}^*\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \langle \mathbb{B}^*\mathbf{x}, \mathbb{B}^*\mathbf{x} \rangle = \|\mathbb{B}^*\mathbf{x}\|^2 > 0$$

car $\mathbb{B}^*\mathbf{x} \neq 0$ ($\mathbb{B}^*$ inversible et $\mathbf{x} \neq 0$). Donc la matrice $\mathbb{A}$ est bien hermitienne définie positive.

R. 2

Soit $\mathbb{A} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice hermitienne définie positive.

D'après le Corollaire 2.9, il existe alors une matrice $\mathbb{L} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ triangulaire inférieure à diagonale unité et une

matrice $\mathbb{D} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonale à coefficient strictement positifs telles que

$$A = \mathbb{L}\mathbb{D}\mathbb{L}^*.$$

On note $\mathbb{H} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice diagonale inversible vérifiant $\mathbb{H}^2 = \mathbb{D}$ (i.e. $H_{i,i} = \pm\sqrt{D_{i,i}} \neq 0, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$). On a alors

$$A = \mathbb{L}\mathbb{H}\mathbb{H}\mathbb{L}^* = (\mathbb{L}\mathbb{H})(\mathbb{L}\mathbb{H})^*$$

En posant $\mathbb{B} = \mathbb{L}\mathbb{H}$, la matrice $\mathbb{B}$ est bien triangulaire inférieure inversible car produit d'une matrice triangulaire inférieure inversible par une matrice diagonale inversible et on a $A = \mathbb{B}\mathbb{B}^*$.

R. 3

a. En choisissant, dans la question précédente,

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, H_{i,i} = \sqrt{D_{i,i}} > 0,$$

la matrice $\mathbb{B} = \mathbb{L}\mathbb{H}$ triangulaire inférieure a alors pour éléments diagonaux

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, B_{i,i} = H_{i,i} > 0.$$

b. Montrons qu'une factorisation positive de Cholesky est unique.

Soient $\mathbb{B}_1$ et $\mathbb{B}_2$ deux factorisations positives de la matrice A , on a donc

$$A = \mathbb{B}_1\mathbb{B}_1^* = \mathbb{B}_2\mathbb{B}_2^*.$$

En multipliant à gauche par $\mathbb{B}_2^{-1}$ et à droite par $(\mathbb{B}_1^*)^{-1}$ cette équation on obtient

$$\mathbb{B}_2^{-1}\mathbb{B}_1 = \mathbb{B}_2^*(\mathbb{B}_1^*)^{-1} = \mathbb{B}_2^*(\mathbb{B}_1^{-1})^* = (\mathbb{B}_1^{-1}\mathbb{B}_2)^*$$

En notant $\mathbb{G} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{B}_2^{-1}\mathbb{B}_1$, on tire de l'équation précédente

$$\mathbb{G} = (\mathbb{G}^{-1})^*. \tag{R7.4}$$

Or, on a

- Proposition 2.35: l'inverse d'une matrice triangulaire inférieure à coefficients diagonaux réels strictement positifs est aussi une matrice triangulaire inférieure à coefficients diagonaux réels strictement positifs.
- Proposition 2.34: le produit de matrices triangulaires inférieures à coefficients diagonaux réels strictement positifs reste triangulaire inférieure à coefficients diagonaux réels strictement positifs.

On en déduit que les matrices $\mathbb{G} = \mathbb{B}_2^{-1}\mathbb{B}_1$ et $\mathbb{G}^{-1} = \mathbb{B}_1^{-1}\mathbb{B}_2$ sont triangulaires inférieures à coefficients diagonaux réels strictement positifs.

De plus l'équation (R7.4) identifie la matrice triangulaire inférieure $\mathbb{G}$ à la matrice triangulaire supérieure $(\mathbb{G}^{-1})^*$: ce sont donc des matrices diagonales à coefficients diagonaux réels strictement positifs et on en déduit

$$(\mathbb{G}^{-1})^* = \mathbb{G}^{-1}$$

et

$$\forall i \in_f \text{cset}1n, (\mathbb{G}^{-1})_{i,i} = \frac{1}{\mathbb{G}_{i,i}} > 0.$$

De l'équation (R7.4), on obtient alors $\mathbb{G} = \mathbb{G}^{-1}$ et donc

$$\forall i \in_f \text{cset}1n, \mathbb{G}_{i,i} = \frac{1}{\mathbb{G}_{i,i}} > 0.$$

On en déduit alors que $\mathbb{G} = \mathbb{I}$ et donc

$$\mathbb{B}_2^{-1}\mathbb{B}_1 = \mathbb{I}$$

c'est à dire $\mathbb{B}_2^{-1}$ est l'inverse de $\mathbb{B}_1$ qui est unique, donc $\mathbb{B}_1 = \mathbb{B}_2$.

◇

EXERCICE 8 : Propriété de la matrice élémentaire de Householder

Soit $\mathbf{u} \in \mathbb{C}^n$ tel que $\|\mathbf{u}\|_2 = 1$. On note $\mathbb{H} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ la matrice définie par

$$\mathbb{H} = \mathbb{I} - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^*.$$

Q. 1

a. Montrer que $\mathbb{H}$ est hermitienne.

b. Montrer que $\mathbb{H}$ est unitaire.

Soit $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$. On note $\mathbf{x}_{\parallel} = \text{proj}_{\mathbf{u}}(\mathbf{x}) \stackrel{\text{def}}{=} \langle \mathbf{u}, \mathbf{x} \rangle \mathbf{u}$ et $\mathbf{x}_{\perp} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_{\parallel}$.

Q. 2

Montrer que

$$\mathbb{H}(\mathbf{x}_{\perp} + \mathbf{x}_{\parallel}) = \mathbf{x}_{\perp} - \mathbf{x}_{\parallel}.$$

et

$$\mathbb{H}\mathbf{x} = \mathbf{x}, \quad \text{si } \langle \mathbf{x}, \mathbf{u} \rangle = 0.$$

Correction

R. 1

a. Cette matrice est hermitienne car

$$\mathbb{H}^* = (\mathbb{I} - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^*)^* = \mathbb{I} - 2(\mathbf{u}\mathbf{u}^*)^* = \mathbb{I} - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^* = \mathbb{H}.$$

b. La matrice $\mathbb{H}$ est unitaire si $\mathbb{H}^*\mathbb{H} = \mathbb{I}$. On a

$$\begin{aligned} \mathbb{H}^*\mathbb{H} &= \mathbb{H}\mathbb{H} = (\mathbb{I} - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^*)(\mathbb{I} - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^*) \\ &= \mathbb{I} - 4\mathbf{u}\mathbf{u}^* + 4\mathbf{u}\mathbf{u}^*\mathbf{u}\mathbf{u}^*. \end{aligned}$$

Or, par hypothèse, on a $\mathbf{u}^*\mathbf{u} = \|\mathbf{u}\|_2 = 1$ et donc

$$\mathbb{H}^*\mathbb{H} = \mathbb{I} - 4\mathbf{u}\mathbf{u}^* + 4\mathbf{u}(\mathbf{u}^*\mathbf{u})\mathbf{u}^* = \mathbb{I}.$$

R. 2

On note que par construction $\langle \mathbf{u}, \mathbf{x}_{\perp} \rangle = 0$. En effet, on a

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u}, \mathbf{x}_{\perp} \rangle &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{x} - \mathbf{x}_{\parallel} \rangle \\ &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{x} \rangle - \langle \mathbf{u}, \mathbf{x}_{\parallel} \rangle \\ &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{x} \rangle - \langle \mathbf{u}, \langle \mathbf{u}, \mathbf{x} \rangle \mathbf{u} \rangle \\ &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{x} \rangle - \langle \mathbf{u}, \mathbf{x} \rangle \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \\ &= 0 \quad \text{car } \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = \|\mathbf{u}\|_2^2 = 1. \end{aligned}$$

On a alors

$$\begin{aligned} \mathbb{H}(\mathbf{u})(\mathbf{x}_{\perp} + \mathbf{x}_{\parallel}) &= (\mathbb{I} - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^*)(\mathbf{x}_{\perp} + \mathbf{x}_{\parallel}) = \mathbf{x}_{\perp} + \mathbf{x}_{\parallel} - 2\mathbf{u} \underbrace{\mathbf{u}^*\mathbf{x}_{\perp}}_{=0} - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^*\mathbf{x}_{\parallel} \\ &= \mathbf{x}_{\perp} + \mathbf{x}_{\parallel} - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^*(\langle \mathbf{u}, \mathbf{x} \rangle \mathbf{u}) = \mathbf{x}_{\perp} + \mathbf{x}_{\parallel} - 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{x} \rangle \mathbf{u} \underbrace{\mathbf{u}^*\mathbf{u}}_{=1} \\ &= \mathbf{x}_{\perp} + \mathbf{x}_{\parallel} - 2\mathbf{x}_{\parallel} \\ &= \mathbf{x}_{\perp} - \mathbf{x}_{\parallel}. \end{aligned}$$

Si $\langle \mathbf{x}, \mathbf{u} \rangle = 0$ alors $\mathbf{x}_{\parallel} = 0$ et $\mathbf{x} = \mathbf{x}_{\perp}$.

◇

EXERCICE 9

Soient $\mathbf{a}$ et $\mathbf{b}$ deux vecteurs non colinéaires de $\mathbb{C}^n$ avec $\|\mathbf{b}\|_2 = 1$. On va chercher $\alpha \in \mathbb{C}$ et $\mathbf{u} \in \mathbb{C}^n$, $\|\mathbf{u}\|_2 = 1$, vérifiant

$$\mathbb{H}(\mathbf{u})\mathbf{a} = \alpha\mathbf{b}. \quad (9.1)$$

Q. 1 Montrer que si α et $\mathbf{u}$ vérifient (9.1) alors

a. on a

$$|\alpha| = \|\mathbf{a}\|_2 \quad (9.2)$$

b. on a

$$\mathbf{a} - 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{a} \rangle \mathbf{u} = \alpha \mathbf{b} \quad (9.3)$$

c. on en déduit que

$$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{a} \rangle|^2 = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle - \alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{2} \quad (9.4)$$

Nous allons maintenant établir une condition pour que (9.4) ait un sens.

Q. 2 On suppose que $\arg \alpha = -\arg(\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle) [\pi]$

a. Montrer que $\alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \in \mathbb{R}$.

b. Montrer que $\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle - \alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \in \mathbb{R}^{*+}$.

Q. 3 Soient α et $\mathbf{u}$ vérifiant (9.1). En déduire que si $\arg \alpha = -\arg(\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle) [\pi]$ alors $\mathbf{u}$ est donné par

$$\mathbf{u} = \frac{1}{2\langle \mathbf{u}, \mathbf{a} \rangle} (\mathbf{a} - \alpha \mathbf{b}). \quad (9.5)$$

et $\|\mathbf{u}\|_2 = 1$.

Correction

R. 1 Par la suite, on pose $\mathbb{H} = \mathbb{H}(\mathbf{u})$ pour alléger les notations.

a. On a

$$\begin{aligned} \|\mathbf{a}\|_2^2 &= \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle = \langle \mathbb{H}^* \mathbb{H} \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle \quad \text{car } \mathbb{H} \text{ unitaire} \\ &= \langle \mathbb{H} \mathbf{a}, \mathbb{H} \mathbf{a} \rangle \quad \text{par définition du produit scalaire} \\ &= \|\mathbb{H} \mathbf{a}\|_2^2 = \|\alpha \mathbf{b}\|_2^2 = |\alpha|^2 \|\mathbf{b}\|_2^2 = |\alpha|^2. \end{aligned}$$

b. Pour établir (9.3), on écrit

$$\begin{aligned} \mathbb{H}(\mathbf{u})\mathbf{a} = \alpha \mathbf{b} &\iff (\mathbb{I} - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^*)\mathbf{a} = \alpha \mathbf{b} \\ &\iff \mathbf{a} - 2\mathbf{u}\langle \mathbf{u}^*, \mathbf{a} \rangle = \alpha \mathbf{b} \\ &\iff \mathbf{a} - 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{a} \rangle \mathbf{u} = \alpha \mathbf{b} \end{aligned}$$

c. En effectuant le produit scalaire (à gauche) avec $\mathbf{a}$ de (9.3), on obtient

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle - 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{a} \rangle \langle \mathbf{a}, \mathbf{u} \rangle = \alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$$

ce qui prouve (9.4).

R. 2 a. On a par définition de l'argument $\alpha = |\alpha|e^{i \arg \alpha}$ et $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = |\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle|e^{i \arg(\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle)}$ ce qui donne

$$\alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = |\alpha| |\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle| e^{i(\arg \alpha + \arg(\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle))} \quad (R9.5)$$

et donc $\alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ est réel si $\arg \alpha + \arg(\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle) = 0 [\pi]$.

b. On vient de démontrer que $\alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \in \mathbb{R}$ et donc $\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle - \alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \in \mathbb{R}$. Il reste donc à montrer que $\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle - \alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle > 0$.

- Si $\arg \alpha = -\arg(\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle) + \pi [2\pi]$, alors de (R9.5) on obtient $\alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \leq 0$ et donc $\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle - \alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \geq \|\mathbf{a}\|_2 > 0$ car $\mathbf{a} \neq 0$.

- Si $\arg \alpha = -\arg(\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle) [2\pi]$, alors de (R9.5) on obtient $\alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \geq 0$.
Comme les vecteurs $\mathbf{a}$ et $\mathbf{b}$ ne sont pas colinéaires, on a inégalité stricte dans Cauchy-Schwarz :

$$|\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle| < \|\mathbf{a}\|_2 \|\mathbf{b}\|_2 = \|\mathbf{a}\|_2.$$

On obtient donc

$$0 \leq \alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \leq |\alpha| |\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle| < |\alpha| \|\mathbf{a}\|_2 = \|\mathbf{a}\|_2^2$$

Attention, dans ce cas $\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle - \alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ peut-être très petit.

R. 3 On peut noter que $\langle \mathbf{u}, \mathbf{a} \rangle \neq 0$ car sinon, d'après (9.3), $\mathbf{a} = \alpha \mathbf{b}$ or par hypothèse $\mathbf{a}$ et $\mathbf{b}$ sont non colinéaires. On obtient alors immédiatement (9.5) à partir de (9.3)
Vérifions que $\|\mathbf{u}\|_2 = 1$. On a

$$\|\mathbf{u}\|_2^2 = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = \frac{1}{4|\langle \mathbf{u}, \mathbf{a} \rangle|^2} \langle \mathbf{a} - \alpha \mathbf{b}, \mathbf{a} - \alpha \mathbf{b} \rangle$$

En utilisant (9.4), on obtient

$$\begin{aligned} 4|\langle \mathbf{u}, \mathbf{a} \rangle|^2 &= 2(\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle - \alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle) \\ &= 2\|\mathbf{a}\|_2^2 - 2\alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \end{aligned}$$

De plus, on a

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{a} - \alpha \mathbf{b}, \mathbf{a} - \alpha \mathbf{b} \rangle &= \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle - \bar{\alpha} \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle - \alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + |\alpha|^2 \langle \mathbf{b}, \mathbf{b} \rangle = \|\mathbf{a}\|_2^2 - \bar{\alpha} \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle - \alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + |\alpha|^2 \\ &= 2\|\mathbf{a}\|_2^2 - \bar{\alpha} \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle - \alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \\ &= 2\|\mathbf{a}\|_2^2 - 2\alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \quad \text{car } \alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \overline{(\alpha \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle)} = \bar{\alpha} \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

On en déduit donc que $\|\mathbf{u}\|_2 = 1$.

◇

EXERCICE 10

Soient $\mathbf{a}$ et $\mathbf{b}$ deux vecteurs non nuls et non colinéaires de $\mathbb{C}^n$ avec $\|\mathbf{b}\|_2 = 1$.

Q. 1 Ecrire la fonction algorithmique **Householder** permettant de retourner une matrice de Householder $\mathbb{H}$ et $\alpha \in \mathbb{C}$ tels que $\mathbb{H}(\mathbf{u})\mathbf{a} = \alpha \mathbf{b}$. Le choix du α est fait par le paramètre δ (0 ou 1) de telle sorte que $\arg \alpha = -\arg(\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle) + \delta\pi$ avec $|\alpha| = \|\mathbf{a}\|_2$.
Des fonctions comme **dot**($\mathbf{a}, \mathbf{b}$) (produit scalaire de deux vecteurs), **norm**($\mathbf{a}$) (norme 2 d'un vecteur), **arg**(z) (argument d'un nombre complexe), **matprod**($\mathbb{A}, \mathbb{B}$) (produit de deux matrices), **ctranspose**($\mathbb{A}$) (adjoint d'une matrice), ... pourront être utilisées

Q. 2 Proposer un programme permettant de tester cette fonction. On pourra utiliser la fonction **vecrand**(n) retournant un vecteur aléatoire de $\mathbb{C}^n$, les parties réelles et imaginaires de chacune de ses composantes étant dans $]0, 1[$ (loi uniforme).

Q. 3 Proposer un programme permettant de vérifier que $\delta = 1$ est le "meilleur" choix.

Correction

R. 1 Soient $\mathbf{a}$ et $\mathbf{b}$ deux vecteurs non nuls et non colinéaires de $\mathbb{C}^n$.

Les données du problème sont $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ et δ . On veut calculer α et la matrice $\mathbb{H}(\mathbf{u})$.

Algorithme 2 Calcul du α et de la matrice de Householder $\mathbb{H}(\mathbf{u})$ telle que $\mathbb{H}(\mathbf{u})\mathbf{a} = \alpha\mathbf{b}$.

Données : $\mathbf{a}, \mathbf{b}$: deux vecteurs de $\mathbb{C}^n$ non nuls et non colinéaires.

δ : 0 ou 1, permet de déterminer α .

Résultat : $\mathbb{H}$: matrice de Householder dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$,

α : nombre complexe, de module $\|\mathbf{a}\|_2$ et d'argument $-\arg(\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle) + \delta\pi$.

```

1: Fonction [ $\mathbb{H}, \alpha$ ]  $\leftarrow$  Householder(  $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \delta$  )
2:    $ab \leftarrow \text{dot}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ 
3:    $\alpha \leftarrow \text{norm}(\mathbf{a}) * \exp(i * (\delta * \pi - \arg(ab)))$ 
4:    $\mathbf{u} \leftarrow \mathbf{a} - \alpha * \mathbf{b}$ 
5:    $\mathbf{u} \leftarrow \mathbf{u} / \text{norm}(\mathbf{u})$ 
6:    $\mathbb{H} \leftarrow \text{eye}(n) - 2 * \text{matprod}(\mathbf{u}, \text{ctranspose}(\mathbf{u}))$ 
7: Fin Fonction

```

$$\triangleright \text{dot}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \sum_{i=1}^n \overline{a_i} b_i$$

R. 2

```

1:  $n \leftarrow 100$ 
2:  $\mathbf{a} \leftarrow \text{vecrand}(n)$ 
3:  $\mathbf{b} \leftarrow \text{vecrand}(n)$ 
4:  $\mathbf{b} \leftarrow \mathbf{b} / \text{norm}(\mathbf{b}, 2)$ 
5: [ $\mathbb{H}, \alpha$ ]  $\leftarrow$  Householder( $\mathbf{a}, \mathbf{b}, 0$ )
6:  $\text{error} \leftarrow \text{norm}(\mathbb{H} * \mathbf{a} - \alpha * \mathbf{b}, 2)$ 

```

R. 3

```

1:  $n \leftarrow 100$ 
2:  $\mathbf{a} \leftarrow \text{vecrand}(n)$ 
3:  $\mathbf{b} \leftarrow \mathbf{a} + 1e - 6 * \text{vecrand}(n)$ 
4:  $\mathbf{b} \leftarrow \mathbf{b} / \text{norm}(\mathbf{b}, 2)$ 
5: [ $\mathbb{H}_1, \alpha_1$ ]  $\leftarrow$  Householder( $\mathbf{a}, \mathbf{b}, 1$ )
6: [ $\mathbb{H}_0, \alpha_0$ ]  $\leftarrow$  Householder( $\mathbf{a}, \mathbf{b}, 0$ )
7:  $\text{error}_0 \leftarrow \text{norm}(\mathbb{H}_0 * \mathbf{a} - \alpha_0 * \mathbf{b}, 2) / (1 + \text{abs}(\alpha_0))$ 
8:  $\text{error}_1 \leftarrow \text{norm}(\mathbb{H}_1 * \mathbf{a} - \alpha_1 * \mathbf{b}, 2) / (1 + \text{abs}(\alpha_1))$ 

```

Figure 1: Choix de α dans **Householder** : erreur relative en norme L_2

◇

EXERCICE 11

Soit $n \geq 2$.

($\mathcal{P}_n$)

Soit $A_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice. Il existe une matrice unitaire $U_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et une matrice triangulaire supérieure $R_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que

$$U_n A_n = R_n. \quad (11.1)$$

Q. 1

Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2, (\mathcal{P}_n)$ est vraie.

Q. 2

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une matrice unitaire $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et une matrice triangulaire supérieure $R \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que

$$A = QR.$$

($\mathcal{Q}_n$)

Soit $A_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice. Il existe une matrice orthogonale $U_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et une matrice triangulaire supérieure $R_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que

$$U_n A_n = R_n. \quad (11.2)$$

Q. 3

La proposition ($\mathcal{Q}_n$) est-elle vérifiée pour tout $n \geq 2$? Justifier.

Q. 4

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

a. Montrer qu'il existe une matrice orthogonale $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et une matrice triangulaire supérieure $R \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que

$$A = QR.$$

b. Montrer qu'il existe une matrice orthogonale $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et une matrice triangulaire supérieure $R \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficient diagonaux positifs ou nuls telles que

$$A = QR.$$

c. On suppose A inversible. Montrer qu'il existe une unique matrice orthogonale $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et une unique matrice triangulaire supérieure $R \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficient diagonaux strictement positifs telles que

$$A = QR.$$

Correction

R. 1

• **Initialisation** : on va montrer que ($\mathcal{P}_2$) est vraie

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. On note $\mathbf{a} = A_{:,1}$ (première colonne de A) et $\mathbf{b} = (1, 0)^t$.

– Si $\mathbf{a} \neq 0$ et si $\mathbf{a}$ non colinéaire à $\mathbf{b}$, on est sous les conditions du théorème ???. On définit alors $\alpha \in \mathbb{C}$ $|\alpha| = \|\mathbf{a}\|_2$ et $\arg \alpha = -\arg \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \delta\pi$ (choix $\delta = 1$ préférable) Dans ce cas on a

$$\mathbb{H} \left(\frac{\mathbf{a} - \alpha \mathbf{b}}{\|\mathbf{a} - \alpha \mathbf{b}\|_2} \right) \mathbf{a} = \alpha \mathbf{b}.$$

On pose $U = \mathbb{H} \left(\frac{\mathbf{a} - \alpha \mathbf{b}}{\|\mathbf{a} - \alpha \mathbf{b}\|_2} \right)$ qui est une matrice unitaire.

– Si $\mathbf{a} = 0$ ou si $\mathbf{a}$ est colinéaire à $\mathbf{b}$, alors $\mathbf{a}_2 = A_{2,1} = 0$ et on pose $U = \mathbb{I}$, qui est unitaire, et $\alpha = \pm \mathbf{a}_1 (= \pm A_{1,1})$.

Dans les 2 cas, on obtient

$$UA = U \left(A_{:,1} \mid A_{:,2} \right) = \left(UA_{:,1} \mid UA_{:,2} \right) = \left(\alpha \mathbf{b} \mid UA_{:,2} \right) = \left(\begin{array}{c|c} \alpha & \\ \hline 0 & UA_{:,2} \end{array} \right) = R$$

où R est triangulaire supérieure.

- **Hérédité** : soit $n \geq 2$, on suppose que $(\mathcal{P}_{n-1})$ est vérifiée, on va alors montrer que $(\mathcal{P}_n)$ est vraie. Soit $\mathbb{A} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On note $\mathbf{a} = \mathbb{A}_{:,1} \in \mathbb{C}^n$ (première colonne de $\mathbb{A}$) et $\mathbf{b} = \mathbf{e}_1$, premier vecteur de la base canonique ($\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{b}_i = \delta_{1,i}$).

– Si $\mathbf{a} \neq 0$ et si $\mathbf{a}$ non colinéaire à $\mathbf{b}$, on est sous les conditions du théorème ???. On définit alors $\alpha \in \mathbb{C}$ $|\alpha| = \|\mathbf{a}\|_2$ et $\arg \alpha = -\arg \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \delta\pi$ (choix $\delta = 1$ préférable) Dans ce cas on a

$$\mathbb{H} \left(\frac{\mathbf{a} - \alpha \mathbf{b}}{\|\mathbf{a} - \alpha \mathbf{b}\|_2} \right) \mathbf{a} = \alpha \mathbf{b}.$$

On pose $\mathbb{H} = \mathbb{H} \left(\frac{\mathbf{a} - \alpha \mathbf{b}}{\|\mathbf{a} - \alpha \mathbf{b}\|_2} \right)$ qui est une matrice unitaire.

– Si $\mathbf{a} = 0$ ou si $\mathbf{a}$ est colinéaire à $\mathbf{b}$, alors $\forall i \in \llbracket 2, n \rrbracket, \mathbf{a}_i = \mathbb{A}_{i,1} = 0$. On pose $\mathbb{H} = \mathbb{I}$, qui est unitaire, et $\alpha = \pm \mathbf{a}_1 (= \pm \mathbb{A}_{1,1})$.

Dans les 2 cas, on obtient

$$\begin{aligned} \mathbb{H}\mathbb{A} &= \mathbb{H} \left(\mathbb{A}_{:,1} \mid \mathbb{A}_{:,2} \mid \dots \mid \mathbb{A}_{:,n} \right) = \left(\mathbb{H}\mathbb{A}_{:,1} \mid \mathbb{H}\mathbb{A}_{:,2} \mid \dots \mid \mathbb{H}\mathbb{A}_{:,n} \right) \\ &= \left(\alpha \mathbf{e}_1 \mid \mathbb{H}\mathbb{A}_{:,2} \mid \dots \mid \mathbb{H}\mathbb{A}_{:,n} \right) \end{aligned}$$

On en déduit que $\mathbb{H}\mathbb{A}$ s'écrit aussi sous la forme

$$\mathbb{H}\mathbb{A} = \left(\begin{array}{c|ccc} \alpha & \bullet & \dots & \bullet \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{array} \middle| \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \mathbb{A}_{n-1} \right)$$

où $\mathbb{A}_{n-1} \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{C})$. On peut donc appliquer à $\mathbb{A}_{n-1}$ l'hypothèse de récurrence: $\exists \mathbb{U}_{n-1} \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{C})$ unitaire, produit d'au plus $(n-2)$ matrices de Householder, et, $\exists \mathbb{R}_{n-1} \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{C})$ triangulaire supérieure telles que

$$\mathbb{U}_{n-1} \mathbb{A}_{n-1} = \mathbb{R}_{n-1}.$$

On définit alors

$$\mathbb{U} = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{array} \middle| \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \mathbb{U}_{n-1} \right).$$

On a

$$\mathbb{U}\mathbb{U}^* = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{array} \middle| \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \mathbb{U}_{n-1} \right) \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{array} \middle| \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \mathbb{U}_{n-1}^* \right) = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{array} \middle| \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \mathbb{U}_{n-1} \mathbb{U}_{n-1}^* \right)$$

Comme $\mathbb{U}_{n-1}$ est unitaire, on en déduit que $\mathbb{U}$ est aussi unitaire. On a alors

$$\begin{aligned} \mathbb{U}(\mathbb{H}\mathbb{A}) &= \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{array} \middle| \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \mathbb{U}_{n-1} \right) \left(\begin{array}{c|ccc} \alpha & \bullet & \dots & \bullet \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{array} \middle| \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \mathbb{A}_{n-1} \right) = \left(\begin{array}{c|ccc} \alpha & \bullet & \dots & \bullet \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{array} \middle| \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \mathbb{U}_{n-1} \mathbb{A}_{n-1} \right) \\ &= \left(\begin{array}{c|ccc} \alpha & \bullet & \dots & \bullet \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{array} \middle| \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array} \mathbb{R}_{n-1} \right) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{R}_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}). \end{aligned}$$

Comme $\mathbb{R}_{n-1}$ est triangulaire supérieure, on en déduit que $\mathbb{R}_n$ est aussi triangulaire supérieure. On pose $\mathbb{U}_n = \mathbb{U}\mathbb{H}$. Cette matrice est unitaire, car produit de deux matrices unitaires, et on a

$$\mathbb{U}_n \mathbb{A} = \mathbb{R}_n.$$

La proposition $(\mathcal{P}_n)$ est donc vérifiée.

- **Conclusion** : on vient de démontrer par récurrence que, $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2, (\mathcal{P}_n)$ est vraie.

◇

EXERCICE 12

Soit $A \in \mathcal{M}_{m+n}(\mathbb{C})$ la matrice bloc

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} m & n \end{matrix} \\ \begin{matrix} m \\ n \end{matrix} & \left(\begin{array}{c|c} U & F \\ \hline E & V \end{array} \right) \end{matrix}.$$

On note $\mathbf{v} = \mathbb{V}_{:,1} \in \mathbb{C}^n$ le premier vecteur colonne de V et on suppose que $\mathbf{v}$ est non nul et non colinéaire à $\mathbf{e}_1^n$ (premier vecteur de la base canonique de $\mathbb{C}^n$).

Q. 1 Expliciter, en fonction de $\mathbf{v}$, le vecteur $\mathbf{u} \in \mathbb{C}^n$ tel que

$$\mathbb{H}(\mathbf{u})\mathbf{v} = \alpha \mathbf{e}_1^n, \quad \text{avec } \mathbb{H}(\mathbf{u}) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{I} - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^*.$$

Q. 2 Soient $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^m$ et $\mathbf{y} \in \mathbb{C}^n$. On pose $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{m+n}$. Déterminer $\mathbb{H}(\mathbf{w})$ en fonction de $\mathbb{H}(\mathbf{x})$ et de $\mathbb{H}(\mathbf{y})$.

Q. 3 On pose $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_m \\ \mathbf{u} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{m+n}$.

a. Déterminer $\mathbb{H}(\mathbf{w})A$ en fonction de $\mathbb{H}(\mathbf{u})$.

b. Que peut-on dire de particulier sur le bloc (2,2) de $\mathbb{H}(\mathbf{w})A$?

EXERCICE 13

Q. 1 Ecrire une fonction **FactQR** permettant de calculer la factorisation QR d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On pourra utiliser la fonction **Householder** Exercice 10.

Q. 2 Ecrire un programme permettant de tester cette fonction.

Correction

R. 1 L'objectif est de déterminer les matrices Q , matrice unitaire, et R matrice triangulaire supérieure telle que $A = QR$.

Données : A : matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Résultat : Q : matrice unitaire de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

R : matrice triangulaire supérieure de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On rappelle la technique utilisée dans la correction de l'exercice ?? pour déterminer l'ensemble des matrices de Householder permettant de transformer la matrice A en une matrice triangulaire supérieure. On pose

$$A^{[0]} = A, \quad A^{[k+1]} = \mathbb{H}^{[k+1]}A^{[k]}, \quad \forall k \in \llbracket 0, n-2 \rrbracket$$

où $\mathbb{H}^{[k+1]}$ est soit une matrice de Householder soit la matrice identité. Plus précisément, on note $\underline{\mathbf{s}} \in \mathbb{K}^{n-k}$ le vecteur composé des $n-k$ dernières composantes de la $k+1$ -ème colonne de $A^{[k]}$ et $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_k \\ \underline{\mathbf{s}} \end{pmatrix}$.

- Si $\underline{\mathbf{s}}_1 = 0$ ou $\underline{\mathbf{s}}$ colinéaire à $\mathbf{e}_1^{n-k}$ premier vecteur de la base canonique de $\mathbb{K}^{n-k}$ alors

$$\mathbb{H}^{[k+1]} = \mathbb{I}.$$

En notant $\mathbf{e}_{k+1}^n$ le $k+1$ -ème vecteur de la base canonique de $\mathbb{K}^n$, cette matrice peut-être calculée avec la fonction **Householder** par

$$[\mathbb{H}^{[k+1]}, \alpha] \leftarrow \text{Householder}(\mathbf{a}, \mathbf{e}_{k+1}^n, 1)$$

- sinon $\mathbb{H}^{[k+1]} \neq \mathbb{I}$.

On a vu que dans ce cas $A^{[n-1]}$ est triangulaire supérieure. On pose $\mathbb{H} = \mathbb{H}^{[n-1]} \times \dots \times \mathbb{H}^{[1]}$ qui est une matrice unitaire. On a alors $R = A^{[n-1]} = \mathbb{H}A$ et $Q = \mathbb{H}^*$.

Algorithme 3 $\mathcal{R}_0$ 1: Calculer Q et R **Algorithme 3** $\mathcal{R}_1$

1: $H \leftarrow H^{[n-1]} \times \dots \times H^{[1]}$
 2: $R \leftarrow H * A$
 3: $Q \leftarrow H^*$

Algorithme 3 $\mathcal{R}_1$

1: $H \leftarrow H^{[n-1]} \times \dots \times H^{[1]}$
 2: $R \leftarrow H * A$
 3: $Q \leftarrow H^*$

Algorithme 3 $\mathcal{R}_2$

1: $H \leftarrow I$
 2: $A^{[0]} \leftarrow A$
 3: **Pour** $k \leftarrow 0$ à $n - 2$ **faire**
 4:   Calculer $H^{[k+1]}$ à partir de $A^{[k]}$
 5:    $A^{[k+1]} \leftarrow H^{[k+1]} * A^{[k]}$
 6:    $H \leftarrow H^{[k+1]} * H$
 7: **Fin Pour**
 8: $R \leftarrow H * A$ $\triangleright$ ou $R \leftarrow A^{[n-1]}$
 9: $Q \leftarrow H^*$

Il est inutile de stocker les matrices $A^{[k]}$ et $H^{[k+1]}$:**Algorithme 3** $\mathcal{R}_2$

1: $H \leftarrow I, A^{[0]} \leftarrow A$
 2: **Pour** $k \leftarrow 0$ à $n - 2$ **faire**
 3:   Calculer $H^{[k+1]}$ à partir de $A^{[k]}$
 4:    $A^{[k+1]} \leftarrow H^{[k+1]} * A^{[k]}$
 5:    $H \leftarrow H^{[k+1]} * H$
 6: **Fin Pour**
 7: $R \leftarrow A^{[n-1]}$
 8: $Q \leftarrow H^*$

Algorithme 3 $\mathcal{R}_3$

1: $H \leftarrow I, R \leftarrow A$
 2: **Pour** $k \leftarrow 0$ à $n - 2$ **faire**
 3:   Calculer $S (= H^{[k+1]})$ à partir de $R (= A^{[k]})$
 4:    $R \leftarrow S * R$ $\triangleright$ compute $A^{[k+1]}$
 5:    $H \leftarrow S * H$
 6: **Fin Pour**
 7: $Q \leftarrow H^*$

Algorithme 3 $\mathcal{R}_3$

1: $H \leftarrow I, R \leftarrow A$
 2: **Pour** $k \leftarrow 0$ à $n - 2$ **faire**
 3:   Calculer $S (= H^{[k+1]})$ à partir de R
 4:    $R \leftarrow S * R$
 5:    $H \leftarrow S * H$
 6: **Fin Pour**
 7: $Q \leftarrow H^*$

Algorithme 3 $\mathcal{R}_4$

1: $H \leftarrow I, R \leftarrow A$
 2: **Pour** $k \leftarrow 0$ à $n - 2$ **faire**
 3:    $a \leftarrow [0_k; R(k+1 : n, k+1)]$
 4:    $e_{k+1}^n \in \mathbb{C}^n, e_{k+1}^n(i) = \delta_{k+1,i}, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.
 5:    $[R, \alpha] \leftarrow \text{Householder}(a, e_{k+1}^n, 1)$
 6:    $R \leftarrow S * R$
 7:    $H \leftarrow S * H$
 8: **Fin Pour**
 9: $Q \leftarrow H^*$

Algorithme 3 Fonction **FactQR**

Données : $\mathbb{A}$: matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Résultat : $\mathbb{Q}$: matrice unitaire de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

$\mathbb{R}$: matrice triangulaire supérieure de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

```
1: Fonction [ $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ]  $\leftarrow$  FactQR(  $\mathbb{A}$  )
2:    $\mathbb{H} \leftarrow \mathbb{I}$ 
3:    $\mathbb{R} \leftarrow \mathbb{A}$ 
4:   Pour  $k \leftarrow 0$  à  $n - 2$  faire
5:      $\mathbf{a} \leftarrow \mathbf{0}_n$ 
6:     Pour  $i \leftarrow k + 1$  à  $n$  faire
7:        $\mathbf{a}(i) \leftarrow \mathbb{R}(i, k + 1)$ 
8:     Fin Pour
9:      $\mathbf{e} \leftarrow \mathbf{0}_n, \mathbf{e}(k + 1) \leftarrow 1$ 
10:    [ $\mathbb{S}, \alpha$ ]  $\leftarrow$  Householder( $\mathbf{a}, \mathbf{e}, 1$ )
11:     $\mathbb{R} \leftarrow \mathbb{S} * \mathbb{R}$ 
12:     $\mathbb{H} \leftarrow \mathbb{S} * \mathbb{H}$ 
13:  Fin Pour
14:   $\mathbb{Q} \leftarrow \mathbb{H}^*$ 
15: Fin Fonction
```

R.2
| A faire!

◇