

Analyse Numérique I*

Sup'Galilée, Ingénieurs MACS, 1ère année / L3 MIM

François Cuvelier

Laboratoire d'Analyse Géométrie et Applications
Institut Galilée
Université Paris XIII.

2026/10/19

Chapitre 1: Erreurs : arrondis, bug and Co.

Chapitre 2: Langage algorithmique

Chapitre 3: Rappels algèbre linéaire

Chapitre 4: Résolution de systèmes non-linéaires

Chapitre 5: Résolution de systèmes linéaires

Chapitre 6: Polynômes d'interpolation

Chapitre 7: Intégration numérique



Racines/zéros d'un polynôme

- **degré 2** : Babyloniens en 1600 avant J.-C.
- **degré 3** : *Scipio del Ferro* (1465-1526, mathématicien italien) et *Niccolo Fontana* (1499-1557, mathématicien italien)
- **degré 4** : *Ludovico Ferrari* (1522-1565, mathématicien italien)
- **degré 5** : *Paolo Ruffini* (1765-1822, mathématicien italien) en 1799, *Niels Henrick Abel* (1802-1829, mathématicien norvégien) en 1824, montrent qu'il n'existe **pas de solution analytique**.



(a) *Niccolo Fontana* 1499-1557,
mathématicien italien



(b) *Paolo Ruffini* 1765-1822,
mathématicien italien



(c) *Niels Henrick Abel* 1802-1829,
mathématicien norvégien

1 Recherche des zéros d'une fonction

- Méthode de dichotomie ou de bisection
- Quelques définitions et résultats
- Points fixes d'une fonction (dimension 1)
 - Points fixes attractifs et répulsifs
 - Ordres
 - Algorithme générique du point fixe
 - Points fixes pour la recherche de racines

- Méthode de la corde
- Méthode de Newton
- Méthode de la sécante

2 Résolution de systèmes non linéaires

- Point fixe
- Méthode de Newton
- Exemples

1 Recherche des zéros d'une fonction

- Méthode de dichotomie ou de bisection
- Quelques définitions et résultats
- Points fixes d'une fonction (dimension 1)
 - Points fixes attractifs et répulsifs
 - Ordres
 - Algorithme générique du point fixe
 - Points fixes pour la recherche de racines


- Méthode de la corde
- Méthode de Newton
- Méthode de la sécante

2 Résolution de systèmes non linéaires

- Point fixe
- Méthode de Newton
- Exemples

Note

principe de la méthode de dichotomie : Soit I un intervalle contenant un **unique zéro** de la fonction f , on le divise par son milieu en deux intervalles et on détermine lequel des deux contient le zéro. On itère ce processus sur le nouvel intervalle.



Note

principe de la méthode de dichotomie : Soit I un intervalle contenant un **unique zéro** de la fonction f , on le divise par son milieu en deux intervalles et on détermine lequel des deux contient le zéro. On itère ce processus sur le nouvel intervalle.

- $a_0 = a, b_0 = b$ et $x_0 = \frac{a+b}{2}$,

- $\forall k \in \mathbb{N}$

$$\begin{cases} a_{k+1} = b_{k+1} = x_k & \text{si } f(x_k) = 0, \\ a_{k+1} = x_k, b_{k+1} = b_k & \text{si } f(b_k)f(x_k) < 0, \\ a_{k+1} = a_k, b_{k+1} = x_k & \text{sinon (i.e. } f(a_k)f(x_k) < 0.) \end{cases}$$

et

$$x_{k+1} = (a_{k+1} + b_{k+1})/2.$$

Exercice 1

On suppose que la fonction f est continue sur $[a, b]$, vérifie $f(a)f(b) < 0$ et qu'il existe un unique $\alpha \in]a, b[$ tel que $f(\alpha) = 0$. On définit les trois suites $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$, $(b_k)_{k \in \mathbb{N}}$ et $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ par

- $a_0 = a$, $b_0 = b$ et $x_0 = \frac{a+b}{2}$,
- $\forall k \in \mathbb{N}$,

$$\begin{cases} a_{k+1} = b_{k+1} = x_k & \text{si } f(x_k) = 0, \\ a_{k+1} = x_k, \quad b_{k+1} = b_k & \text{si } f(b_k)f(x_k) < 0, \\ a_{k+1} = a_k, \quad b_{k+1} = x_k & \text{si } f(a_k)f(x_k) < 0. \end{cases}$$

et

$$x_{k+1} = (a_{k+1} + b_{k+1})/2.$$

Q. 1

- ① Montrer par récurrence faible sur $k \in \mathbb{N}$ que

$$(\mathcal{P}_k) \quad : \quad a \leq a_k \leq a_{k+1} \leq \alpha \leq b_{k+1} \leq b_k \leq b.$$

- ② En déduire que les suites (a_k) , (b_k) et (x_k) convergent vers α .

Q. 2

- ① Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $|x_k - \alpha| \leq \frac{b-a}{2^{k+1}}$.

- ② Soit $\epsilon > 0$. En déduire que si $k \geq \frac{\log(\frac{b-a}{\epsilon})}{\log(2)} - 1$ alors $|x_k - \alpha| \leq \epsilon$.

Q. 3

[Algo] Ecrire une fonction algorithmique, nommée **Dichotomie**, retournant une approximation de α avec une précision de ϵ ainsi que le nombre d'itérations nécessaire.

Q. 3 faites ensuite ...



Proposition

Soit $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue vérifiant $f(a)f(b) < 0$ et admettant $\alpha \in]a, b[$ comme **unique** solution de $f(x) = 0$. Alors la suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ définie par la méthode de dichotomie converge vers α et

$$|x_k - \alpha| \leq \frac{b - a}{2^{k+1}}, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

On a alors $\forall \epsilon > 0, \forall k \geq \frac{\log(\frac{b-a}{\epsilon})}{\log(2)} - 1$

$$|x_k - \alpha| \leq \epsilon.$$

- Que cherche-t'on?
- Quelles sont les données du problèmes?

- Que cherche-t'on?

Résultat

:

α_ϵ : un réel tel que $|\alpha_\epsilon - \alpha| \leq \epsilon$.

- Quelles sont les données du problèmes?

- Que cherche-t'on?

Résultat

:

α_ϵ : un réel tel que $|\alpha_\epsilon - \alpha| \leq \epsilon$.

- Quelles sont les données du problèmes?

Données : a, b : deux réels $a < b$,

f : $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ vérifiant les hypothèses
de la proposition ,

ϵ : un réel strictement positif.

Algorithme 1 $\mathcal{R}_0$

1: $k_{\min} \leftarrow \mathbf{E}\left(\frac{\log(\frac{b-a}{\epsilon})}{\log(2)}\right) \quad \triangleright \text{E, partie entière}$

2: Calcul de la suite $(x_k)_{k=0}^{k_{\min}}$ par dichotomie

3: $\alpha_{\epsilon} \leftarrow x_{k_{\min}}$

Algorithme 1 $\mathcal{R}_1$

1: $k_{\min} \leftarrow \mathbf{E}\left(\frac{\log(\frac{b-a}{\epsilon})}{\log(2)}\right) \quad \triangleright \text{E, partie entière}$

2: Initialisation de x_0

3: **Pour** $k \leftarrow 0$ à $k_{\min} - 1$ **faire**

4: Calcul de la suite (x_{k+1}) par dichotomie

5: **Fin Pour**

6: $\alpha_{\epsilon} \leftarrow x_{k_{\min}}$

Algorithme 1 $\mathcal{R}_1$

- 1: $k_{\min} \leftarrow \mathbf{E}\left(\frac{\log(\frac{b-a}{\epsilon})}{\log(2)}\right)$ $\triangleright$ $\mathbf{E}$, partie entière
- 2: Initialisation de x_0
- 3: **Pour** $k \leftarrow 0$ à $k_{\min} - 1$ **faire**
- 4: Calcul de la suite (x_{k+1}) par dichotomie
- 5: **Fin Pour**
- 6: $\alpha_\epsilon \leftarrow x_{k_{\min}}$

Algorithme 1 $\mathcal{R}_2$

- 1: $k_{\min} \leftarrow \mathbf{E}\left(\frac{\log(\frac{b-a}{\epsilon})}{\log(2)}\right)$
- 2: $a_0 \leftarrow a, b_0 \leftarrow b$
- 3: $x_0 \leftarrow \frac{a_0 + b_0}{2}$
- 4: **Pour** $k \leftarrow 0$ à $k_{\min} - 1$ **faire**
- 5: **Si** $f(x_k) == 0$ **alors**
- 6: $a_{k+1} \leftarrow x_k, b_{k+1} \leftarrow x_k$
- 7: **Sinon Si** $f(x_k)f(b_k) < 0$ **alors**
- 8: $a_{k+1} \leftarrow x_k, b_{k+1} \leftarrow b_k$
- 9: **Sinon**
- 10: $a_{k+1} \leftarrow a_k, b_{k+1} \leftarrow x_k$
- 11: **Fin Si**
- 12: $x_{k+1} \leftarrow \frac{a_{k+1} + b_{k+1}}{2}$
- 13: **Fin Pour**
- 14: $\alpha_\epsilon \leftarrow x_{k_{\min}}$

Algorithme Méthode de dichotomie : version 1

Données : a, b : deux réels $a < b$,
 f : $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ vérifiant
les hypothèses de la proposition 8,
 eps : un réel strictement positif.

Résultat : x : un réel tel que $|x - \alpha| \leq \text{eps}$.

```
1: Fonction  $x \leftarrow \text{Dichotomie1}(f, a, b, \text{eps})$ 
2:  $k_{\min} \leftarrow \lceil \log((b - a)/\text{eps}) / \log(2) \rceil$ 
3:  $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{X} \in \mathbb{R}^{k_{\min}+1}$   $\triangleright \mathbf{A}(k+1)$  contiendra  $a_k, \dots$ 
4:  $\mathbf{A}(1) \leftarrow a, \mathbf{B}(1) \leftarrow b, \mathbf{X}(1) \leftarrow (a + b)/2$ 
5: Pour  $k \leftarrow 1$  à  $k_{\min}$  faire
6:   Si  $f(\mathbf{X}(k)) == 0$  alors
7:      $\mathbf{A}(k+1) \leftarrow \mathbf{X}(k), \mathbf{B}(k+1) \leftarrow \mathbf{X}(k)$ 
8:   Sinon Si  $f(\mathbf{B}(k)) * f(\mathbf{X}(k)) < 0$  alors
9:      $\mathbf{A}(k+1) \leftarrow \mathbf{X}(k), \mathbf{B}(k+1) \leftarrow \mathbf{B}(k)$ 
10:  Sinon
11:     $\mathbf{A}(k+1) \leftarrow \mathbf{A}(k), \mathbf{B}(k+1) \leftarrow \mathbf{X}(k)$ 
12:  Fin Si
13:   $\mathbf{X}(k+1) \leftarrow (\mathbf{A}(k+1) + \mathbf{B}(k+1))/2$ 
14: Fin Pour
15:  $x \leftarrow \mathbf{X}(k_{\min} + 1)$ 
16: Fin Fonction
```

Algorithme : versions 2, 3 et + si affinités

- $A = a, B = b$ et $x_0 = \frac{A+B}{2}$,
- $\forall k \in \llbracket 0, k_{\min} - 1 \rrbracket$,

$$\begin{cases} A = B = x_k & \text{si } f(x_k) = 0, \\ A = x_k, B \text{ inchangé} & \text{si } f(B)f(x_k) < 0, \\ B = x_k, A \text{ inchangé} & \text{sinon (i.e. } f(A)f(x_k) < 0.) \end{cases}$$

et

$$x_{k+1} = \frac{A + B}{2}$$

Algorithme Méthode de dichotomie : version 2

Données : a, b : deux réels $a < b$,
 f : $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ vérifiant
les hypothèses de la proposition 8,
 eps : un réel strictement positif.

Résultat : x : un réel tel que $|x - \alpha| \leq \text{eps}$.

```
1: Fonction  $x \leftarrow \text{Dichotomie2}(f, a, b, \text{eps})$ 
2:    $k_{\min} \leftarrow \lceil \log((b - a)/\text{eps}) / \log(2) \rceil$ 
3:    $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{k_{\min}+1}$   $\triangleright \mathbf{X}(k + 1)$  contiendra  $x_k, \dots$ 
4:    $A \leftarrow a, B \leftarrow b, \mathbf{X}(1) \leftarrow (A + B)/2$ 
5:   Pour  $k \leftarrow 1$  à  $k_{\min}$  faire
6:     Si  $f(\mathbf{X}(k)) == 0$  alors
7:        $A \leftarrow \mathbf{X}(k), B \leftarrow \mathbf{X}(k)$ 
8:     Sinon Si  $f(B) * f(\mathbf{X}(k)) < 0$  alors
9:        $A \leftarrow \mathbf{X}(k)$   $\triangleright B$  inchangé
10:    Sinon
11:       $B \leftarrow \mathbf{X}(k)$   $\triangleright A$  inchangé
12:    Fin Si
13:     $\mathbf{X}(k + 1) \leftarrow (A + B)/2$ 
14:  Fin Pour
15:   $x \leftarrow \mathbf{X}(k_{\min} + 1)$ 
16: Fin Fonction
```

Algorithme Méthode de dichotomie : version 3

Données : a, b : deux réels $a < b$,
 f : $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ vérifiant
les hypothèses de la proposition 8,
 eps : un réel strictement positif.

Résultat : x : un réel tel que $|x - \alpha| \leq \text{eps}$.

```
1: Fonction  $x \leftarrow \text{Dichotomie3}(f, a, b, \text{eps})$ 
2:    $\text{kmin} \leftarrow \lceil \log((b - a)/\text{eps}) / \log(2) \rceil$ 
3:    $A, B \in \mathbb{R}$ 
4:    $A \leftarrow a, B \leftarrow b, x \leftarrow (a + b)/2$ 
5:   Pour  $k \leftarrow 1$  à  $\text{kmin}$  faire
6:     Si  $f(x) == 0$  alors
7:        $A \leftarrow x, B \leftarrow x$ 
8:     Sinon Si  $f(B) * f(x) < 0$  alors
9:        $A \leftarrow x$                                 ▷  $B$  inchangé
10:    Sinon
11:       $B \leftarrow x$                                 ▷  $A$  inchangé
12:    Fin Si
13:     $x \leftarrow (A + B)/2$ 
14:  Fin Pour
15: Fin Fonction
```

Algorithme Méthode de dichotomie : version 4

Données : a, b : deux réels $a < b$,
 f : $f \in \mathcal{C}^0([a, b]; \mathbb{R})$ et $f(a)f(b) < 0$
 eps : un réel strictement positif.

Résultat : x : un réel tel que $|x - \alpha| \leq \text{eps}$.

```
1: Fonction  $x \leftarrow \text{Dichotomie4}(f, a, b, \text{eps})$ 
2:    $A, B \in \mathbb{R}$ 
3:    $A \leftarrow a, B \leftarrow b, x \leftarrow (a + b)/2$ 
4:   Tantque  $\text{abs}(x - A) > \text{eps}$  faire
5:     Si  $f(x) == 0$  alors
6:        $A \leftarrow x, B \leftarrow x$ 
7:     Sinon Si  $f(B) * f(x) < 0$  alors
8:        $A \leftarrow x$                                 ▷  $B$  inchangé
9:     Sinon
10:       $B \leftarrow x$                                 ▷  $A$  inchangé
11:    Fin Si
12:     $x \leftarrow (A + B)/2$ 
13:  Fin Tantque
14: Fin Fonction
```

Que pensez vous de cet algorithme?

Algorithme Méthode de dichotomie : version 5

Données : a, b : deux réels $a < b$,
 f : $f \in \mathcal{C}^0([a, b]; \mathbb{R})$ et $f(a)f(b) < 0$.

Résultat : x : un réel tel que $f(x) = 0$.

```
1: Fonction  $x \leftarrow \text{Dichotomie5}(f, a, b)$ 
2:    $A, B \in \mathbb{R}$ 
3:    $A \leftarrow a, B \leftarrow b, x \leftarrow (a + b)/2, xp \leftarrow a$ 
4:   Tantque  $x \sim= xp$  faire
5:     Si  $f(B) * f(x) < 0$  alors
6:        $A \leftarrow x$                                  $\triangleright B$  inchangé
7:     Sinon
8:        $B \leftarrow x$                                  $\triangleright A$  inchangé
9:     Fin Si
10:     $xp \leftarrow x$ 
11:     $x \leftarrow (A + B)/2$ 
12:  Fin Tantque
13: Fin Fonction
```

1 Recherche des zéros d'une fonction

- Méthode de dichotomie ou de bisection
- Quelques définitions et résultats
- Points fixes d'une fonction (dimension 1)
 - Points fixes attractifs et répulsifs
 - Ordres
 - Algorithme générique du point fixe
 - Points fixes pour la recherche de racines

- Méthode de la corde
- Méthode de Newton
- Méthode de la sécante

2 Résolution de systèmes non linéaires

- Point fixe
- Méthode de Newton
- Exemples



Proposition : Formule de Taylor-Lagrange d'ordre n

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $f \in \mathcal{C}^n([a, b])$ dont la dérivée n -ième est dérivable sur $]a, b[$. Alors

- pour tout x, y dans $[a, b]$, $x \neq y$, il existe $\xi \in]\min(x, y), \max(x, y)[$ tel que

$$f(x) = f(y) + \sum_{k=1}^n \frac{(x-y)^k}{k!} f^{(k)}(y) + \frac{(x-y)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi) \quad (1)$$

- $\forall t \in [a, b]$, $\forall h \in \mathbb{R}^*$ vérifiant $(t+h) \in [a, b]$, il existe $\xi \in]\min(t, t+h), \max(t, t+h)[$ tel quel

$$f(t+h) = f(t) + \sum_{k=1}^n \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(t) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi) \quad (2)$$

ou encore

$$f(t+h) = f(t) + \sum_{k=1}^n \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(t) + \mathcal{O}(h^{n+1}) \quad (3)$$

♥ Definition

Soient (E, d) et (F, d) deux espaces métriques, et $f : E \longrightarrow F$ une fonction.

- On dit que f est **Lipschitzienne** de rapport $K \in \mathbb{R}_+$ ou **K -lipschitzienne** sur $A \subset E$ si

$$\forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in A^2, d(f(\mathbf{x}), f(\mathbf{y})) \leq K d(\mathbf{x}, \mathbf{y}).$$

- On dit que f est **contractante** sur $A \subset E$ si elle est **lipschitzienne** de rapport $K \in [0, 1[$ sur $A \subset E$.

- Toute application lipschitzienne est uniformément continue.
- Toute application uniformément continue est continue.

Les réciproques sont fausses.

Exercice 2

Q. 1 Montrer que les fonctions lipschitziennes sont uniformément continues.

Soient I un intervalle et $f \in \mathcal{C}^1(I; \mathbb{R})$

Q. 2 On suppose que f' est bornée, i.e.

$$\exists L \in \mathbb{R}_+, \text{ tel que } \forall x \in I, \quad |f'(x)| \leq L.$$

Montrer que f est lipschitzienne de rapport L .

Q. 3 Soit $L \in \mathbb{R}_+$. On suppose f lipschitzienne de rapport L .
Montrer que f' est bornée.

♥ Definition

Soient (E, d) un **espace métrique** et $(u^{[k]})_{k \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E **convergeant vers** $\alpha \in E$ avec, $\forall k \in \mathbb{N}, u^{[k]} \neq \alpha$.

Soit $p \in [1, +\infty[$. On dit que cette suite **converge vers α avec un ordre p au moins** si

$$\exists C > 0, \exists k_0 \in \mathbb{N}, \text{ tels que } \forall k \geq k_0, d(u^{[k+1]}, \alpha) \leq C d(u^{[k]}, \alpha)^p. \quad (4)$$

où $C < 1$ si $p = 1$.

On dit que cette suite **converge vers α avec un ordre p (exactement)** si elle converge à l'ordre p au moins et si

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{d(u^{[k+1]}, \alpha)}{d(u^{[k]}, \alpha)^{p+\varepsilon}} = +\infty. \quad (5)$$

Exemples de distances:

- $d(x, y) = |x - y|$ dans $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Q}$
- $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ dans $\mathbb{R}^n$, où $\|\cdot\|$ est l'une quelconque des normes habituelles.

Soient (E, d) un **espace métrique** et $(u^{[k]})_{k \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E **convergeant** vers $\alpha \in E$ avec, $\forall k \in \mathbb{N}$, $u^{[k]} \neq \alpha$.

La suite **converge vers α à l'ordre 1** (exactement) si

$$\exists \mu \in]0, 1[, \text{ tel que } \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{d(u^{[k+1]}, \alpha)}{d(u^{[k]}, \alpha)} = \mu. \quad (6)$$

Dans ce cas la convergence est dite **linéaire**.

- Si (6) est vérifiée pour $\mu = 0$, alors la convergence est dite **super-linéaire**.
- Si (6) n'est vérifiée pour aucun $\mu \in]0, 1[$, alors la convergence est dite **sous-linéaire**.

La suite **converge vers α à l'ordre $p \in]1, +\infty[$** (exactement) si

$$\exists \mu > 0, \text{ tel que } \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{d(u^{[k+1]}, \alpha)}{d(u^{[k]}, \alpha)^p} = \mu. \quad (7)$$

et dans ce cas la convergence est **super-linéaire**.

La convergence d'ordre 2 (resp. 3) est dite **quadratique** (resp. **cubique**).

Plus l'ordre est élevé, plus la convergence est rapide

Exercice 3

Soient $I = [0, \pi/2]$ et $\begin{cases} \Phi & : & I & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sin(x) \end{cases}$. Soit $x_0 \in I \setminus \{0\}$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on pose

$$x_{k+1} = \Phi(x_k).$$

Q. 1

- ① Montrer que la suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est bien définie.
- ② Montrer que la suite converge vers $\alpha \in I$ que l'on déterminera.

Q. 2


- ① Montrer que

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{|x_{k+1} - \alpha|}{|x_k - \alpha|} = 1.$$


- ② La convergence est-elle linéaire? Justifier.

$\Phi(x) = \sin(x) \implies$ point fixe: $\alpha = 0$ ($\Phi(\alpha) = \alpha$).

$$x_{k+1} = \Phi(x_k)$$



k	x_k	$ x_k - \alpha $
0	1.0000e+00	1.0000e+00
10	4.6296e-01	4.6296e-01
10^2	1.6885e-01	1.6885e-01
10^3	5.4593e-02	5.4593e-02
10^4	1.7314e-02	1.7314e-02
10^5	5.4770e-03	5.4770e-03



Convergence **sous-linéaire** $\rightarrow$ très llllllent !!!

1 Recherche des zéros d'une fonction

- Méthode de dichotomie ou de bisection
- Quelques définitions et résultats
- Points fixes d'une fonction (dimension 1)
 - Points fixes attractifs et répulsifs
 - Ordres
 - Algorithme générique du point fixe
 - Points fixes pour la recherche de racines

- Méthode de la corde
- Méthode de Newton
- Méthode de la sécante

2 Résolution de systèmes non linéaires

- Point fixe
- Méthode de Newton
- Exemples

Points fixes

Soit $\Phi : [a, b] \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction donnée. Rechercher un **point fixe** de Φ revient à

Trouver $\alpha \in [a, b]$ tel que

$$\alpha = \Phi(\alpha).$$

L'algorithme de la **méthode du point fixe** consiste en la construction, si elle existe, de la suite

$$x_{k+1} = \Phi(x_k), \quad \forall k \in \mathbb{N} \tag{8}$$

avec $x_0 \in [a, b]$ donné.

Supposons que la suite soit bien définie et qu'elle converge vers un point fixe α de Φ .

- Que peut-on dire si $x_0 = \alpha$?
- Que peut-on dire si $x_0 \neq \alpha$?

Exercice 4

Soient $[a, b]$ un intervalle non vide de $\mathbb{R}$ et ϕ une fonction continue de $[a, b]$ dans lui même ($\phi([a, b]) \subset [a, b]$). Soit $x_0 \in [a, b]$. On considère la suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ donnée par

$$x_{k+1} = \phi(x_k) \quad \forall k \in \mathbb{N}. \quad (1)$$

Q. 1 Montrer que la suite (1) est bien définie (x_k existe pour tout $k \in \mathbb{N}$).

Q. 2 Montrer que si la suite (1) converge, alors elle converge vers un point fixe de ϕ .

Q. 3 Existence du point fixe : montrer qu'il existe $\alpha \in [a, b]$ tel que $\phi(\alpha) = \alpha$.

On suppose de plus que ϕ est contractante, c'est à dire que

$$\exists L \in [0, 1[, \text{ tel que, } \forall (x, y) \in [a, b]^2, |\phi(x) - \phi(y)| \leq L|x - y|.$$

Q. 4 ① Montrer que ϕ admet un unique point fixe $\alpha \in [a, b]$.

② Montrer que la suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers α , pour toute donnée initiale x_0 dans $[a, b]$.

Q. 5 [Algo] Écrire l'algorithme du point fixe (fonction **PointFixe**) permettant de résoudre l'équation $\phi(x) = x$.

Théorème : *Théorème du point fixe dans $\mathbb{R}$ (application continue)*

Soient $[a, b]$ un intervalle non vide de $\mathbb{R}$ et Φ une application continue de $[a, b]$ dans lui-même. Alors, il existe **au moins** un point $\alpha \in [a, b]$ vérifiant $\Phi(\alpha) = \alpha$. Le point α est appelé **point fixe de la fonction Φ** . De plus, si Φ est contractante (lipschitzienne de rapport $L \in [0, 1[$), c'est à dire

$$\exists L < 1 \text{ t.q. } |\Phi(x) - \Phi(y)| \leq L|x - y| \quad \forall (x, y) \in [a, b]^2, \quad (9)$$

alors Φ admet un **unique** point fixe $\alpha \in [a, b]$.

Pour tout $x_0 \in [a, b]$, la suite

$$x_{k+1} = \Phi(x_k), \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad (10)$$

est bien définie et elle converge vers α avec un ordre 1 au moins.

On a les deux estimations suivantes :

$$|x_k - \alpha| \leq L^k |x_0 - \alpha|, \quad \forall k \geq 0, \quad (11)$$

$$|x_k - \alpha| \leq \frac{L}{1-L} |x_k - x_{k-1}|, \quad \forall k \geq 0, \quad (12)$$

Exercice 5

Soient $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle fermé, non vide, (par ex., avec $a < b$, $[a, b]$, $[a, +\infty[$, $] - \infty, a]$ ou $\mathbb{R}$) et $\Phi : I \longrightarrow I$ une application contractante. Soit $x_0 \in I$ tel que $\Phi(x_0) \neq x_0$. On considère la suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ donnée par

$$x_{k+1} = \Phi(x_k) \quad \forall k \in \mathbb{N}. \quad (1)$$

Q. 1

Montrer que la suite (1) est bien définie (x_k existe pour tout $k \in \mathbb{N}$).

On va démontrer que la suite (1) est une suite de Cauchy.

Q. 2

① Montrer que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad |x_{k+1} - x_k| \leq L^k |x_1 - x_0|. \quad (2)$$

② Montrer que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \forall l \geq 0, \quad |x_{k+l} - x_{k+l-1}| \leq L^l |x_k - x_{k-1}|. \quad (3)$$

③ En déduire que,

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \forall p \geq 2, \quad |x_{k+p} - x_k| \leq \frac{1 - L^p}{1 - L} L^k |x_1 - x_0|. \quad (4)$$

Q. 3

① Dédurre de la question précédente que la suite (1) est une suite de Cauchy.

② Montrer que la suite (1) converge vers un point fixe de Φ à l'ordre 1 au moins.

③ Montrer l'unicité du point fixe.

Théorème : *Théorème du point fixe dans $\mathbb{R}$ (application contractante)*

Soient $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle fermé, non vide, et Φ une application contractante de I dans lui-même. Alors, il existe un unique point $\alpha \in I$ vérifiant $\Phi(\alpha) = \alpha$. Le point α est appelé **point fixe de la fonction Φ** . Pour tout $x_0 \in I$, la suite

$$x_{k+1} = \Phi(x_k), \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad (13)$$

est bien définie et elle converge vers α avec un ordre 1 au moins.

Théorème : *Théorème du point fixe dans $\mathbb{R}$ (application $\mathcal{C}^1$)*



Soient $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle fermé, non vide, et $\Phi \in \mathcal{C}^1(I)$ vérifiant $\Phi(I) \subset I$ et

$$\exists L < 1 \text{ tel que } \forall x \in I, |\Phi'(x)| \leq L, \quad (14)$$

Soit $x_0 \in I$ et $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $x_{k+1} = \Phi(x_k)$. On a alors

- ① la fonction Φ admet un unique point fixe $\alpha \in I$,
- ② $\forall k \in \mathbb{N}, x_k \in I$,
- ③ la suite (x_k) converge vers α avec un ordre 1 au moins.
- ④ Si $x_0 \neq \alpha$, alors

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{x_{k+1} - \alpha}{x_k - \alpha} = \Phi'(\alpha). \quad (15)$$

et, si $\Phi'(\alpha) \neq 0$, la convergence est d'ordre 1 (exactement).

Théorème : *Convergence locale du point fixe*



Soit α un point fixe d'une fonction Φ de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de α .

Si $|\Phi'(\alpha)| < 1$, alors il existe $\delta > 0$ pour lequel x_k converge vers α pour tout x_0 tel que $|x_0 - \alpha| \leq \delta$.

De plus, si $x_0 \neq \alpha$, on a

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{x_{k+1} - \alpha}{x_k - \alpha} = \Phi'(\alpha). \quad (16)$$

si $\Phi'(\alpha) \neq 0$, la convergence est d'ordre 1 (exactement).

Soit $\Phi : [a, b] \longrightarrow [a, b]$ une application de classe $\mathcal{C}^1$ admettant un point fixe $\alpha \in [a, b]$.

- Si $|\Phi'(\alpha)| < 1$ alors α est un point fixe attractif,
- Si $|\Phi'(\alpha)| > 1$ alors α est un point fixe répulsif.

On s'intéresse ici au point fixe $\alpha = 1$ de la fonction $\Phi : x \mapsto x^2$.






Figure: fonction x^2 et sa fonction réciproque $\sqrt{x}$ sur $[0, +\infty[$

$\Phi'(\alpha) = 2$: **point fixe répulsif**




(a) $x_0 = 1.05$




(b) $x_0 = 0.950$

Figure: $\alpha = 1$, point fixe répulsif de $x \mapsto x^2$

$(\Phi^{-1})'(1) = 1/2 < 1$, : **point fixe attractif**




(a) $x_0 = 1.40$




(b) $x_0 = 0.200$

Figure: $\alpha = 1$, point fixe attractif de $\Phi^{-1} : x \mapsto \sqrt{x}$

fonction $\Phi : x \mapsto x^2 - x + 1$: **point fixe $\alpha = 1$, $\Phi'(\alpha) = 1$.**




(a) $x_0 = 1.2$, α point répulsif




(b) $x_0 = 0.5$, α point attractif


Figure: $\alpha = 1$, point fixe attractif ou répulsif de $x \mapsto x^2 - x + 1$



(a) $x_0 = 1.50$



(b) $x_0 = 1.50$



(c) $x_0 = 1.10$

Figure: $\alpha = 1$, point fixe de fonctions affines particulières




Proposition

Soit $p \in \mathbb{N}^*$, et $\Phi \in \mathcal{C}^{p+1}(\mathcal{V})$ pour un certain voisinage $\mathcal{V}$ de α point fixe de Φ . Si $\Phi^{(i)}(\alpha) = 0$, pour $1 \leq i \leq p$, alors la méthode de point fixe associée à la fonction Φ est d'ordre $(p+1)$ au moins et

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{x_{k+1} - \alpha}{(x_k - \alpha)^{p+1}} = \frac{\Phi^{(p+1)}(\alpha)}{(p+1)!}. \quad (17)$$

Elle est d'ordre $(p+1)$ (exactement) si $\Phi^{(p+1)}(\alpha) \neq 0$.


$$\Phi(x) = (x-1)^2 + \frac{1}{2} \Rightarrow \text{points fixes: } x = -\frac{1}{2}\sqrt{3} + \frac{3}{2}, x = \frac{1}{2}\sqrt{3} + \frac{3}{2}$$



k	x_k	$\tilde{x}_k$	$ x_k - \alpha $	$ \tilde{x}_k - \alpha $
0	$\frac{1}{2}$	5.0000e-01	1.3397e-01	1.3397e-01
1	$\frac{3}{4}$	7.5000e-01	1.1603e-01	1.1603e-01
2	$\frac{9}{16}$	5.6250e-01	7.1475e-02	7.1475e-02
3	$\frac{177}{256}$	6.9141e-01	5.7432e-02	5.7432e-02
4	$\vdots$	5.9523e-01	3.8744e-02	3.8744e-02
5	$\vdots$	6.6384e-01	2.9864e-02	2.9864e-02
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
10	$\vdots$	6.2789e-01	6.0842e-03	6.0842e-03
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
20	$\vdots$	6.3370e-01	2.7011e-04	2.7011e-04

$$\alpha = -\frac{1}{2}\sqrt{3} + \frac{3}{2}, \Phi(\alpha) = \alpha, \Phi'(\alpha) = -\sqrt{3} + 1 \neq 0 \text{ et } |\Phi'(\alpha)| < 1 \Rightarrow \text{convergence d'ordre 1}$$


$$\Phi(x) = (x - 1)^2 + 1 \implies \text{points fixes: } x = 1, x = 2$$



k	x_k	$\tilde{x}_k$	$ x_k - \alpha $	$ \tilde{x}_k - \alpha $
0	$\frac{1}{2}$	5.0000e-01	5.0000e-01	5.0000e-01
1	$\frac{5}{4}$	1.2500e+00	2.5000e-01	2.5000e-01
2	$\frac{17}{16}$	1.0625e+00	6.2500e-02	6.2500e-02
3	$\frac{257}{256}$	1.0039e+00	3.9062e-03	3.9062e-03
4	$\vdots$	1.0000e+00	1.5259e-05	1.5259e-05
5	$\vdots$	1.0000e+00	2.3283e-10	2.3283e-10
6	$\vdots$	1.0000e+00	5.4210e-20	0.0000e+00
7	$\vdots$	1.0000e+00	2.9387e-39	0.0000e+00

$\alpha = 1$, $\Phi(\alpha) = \alpha$, $\Phi'(\alpha) = 0$ et $\Phi''(\alpha) = 2 \neq 0 \implies$ convergence d'ordre 2

$$\Phi(x) = (x-1)^3 + 1 \Rightarrow \text{points fixes: } x = 1, x = 2, x = 0$$



k	x_k	$\tilde{x}_k$	$ x_k - \alpha $	$ \tilde{x}_k - \alpha $
0	$\frac{1}{2}$	5.0000e-01	5.0000e-01	5.0000e-01
1	$\frac{7}{8}$	8.7500e-01	1.2500e-01	1.2500e-01
2	$\frac{511}{512}$	9.9805e-01	1.9531e-03	1.9531e-03
3	$\frac{134217727}{134217728}$	1.0000e+00	7.4506e-09	7.4506e-09
4	$\vdots$	1.0000e+00	4.1359e-25	0.0000e+00
5	$\vdots$	1.0000e+00	7.0747e-74	0.0000e+00
6	$\vdots$	1.0000e+00	3.5411e-220	0.0000e+00

$\alpha = 1, \Phi(\alpha) = \alpha, \Phi'(\alpha) = 0, \Phi''(\alpha) = 0$ et $\Phi'''(\alpha) = 6 \neq 0 \Rightarrow$ convergence d'ordre 3

Algorithme générique du point fixe

$$x^{(k+1)} = \Phi(x^{(k)}), \quad \forall k \in \mathbb{N}, \text{ avec } x^{(0)} \in [a, b] \text{ donné.}$$

Algorithme Méthode de point fixe : version **Tantque** *formel*

```
1:  $k \leftarrow 0$ 
2: Tantque non convergence faire
3:    $x_{k+1} \leftarrow \Phi(x_k)$ 
4:    $k \leftarrow k + 1$ 
5: Fin Tantque
6:  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow x_k$  ▷ le dernier calculé.
```

Algorithme Méthode de point fixe : version **Répéter** *formel*

```
1:  $k \leftarrow 0$ 
2: Répéter
3:    $k \leftarrow k + 1$ 
4:    $x_k \leftarrow \Phi(x_{k-1})$ 
5: jusqu'à convergence
6:  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow x_k$  ▷ le dernier calculé.
```

Critères d'arrêt?

- On n'est pas sûr de converger $\implies$ kmax: nb maximum d'itérations,
- Si on converge, on s'arrête dès que $|\Phi(x_k) - x_k| = |x_{k+1} - x_k| \leq \text{tol}$.

Algorithme Méthode de point fixe : version **Tantque** *formel*
avec critères d'arrêt

```
1:  $k \leftarrow 0$ 
2:  $\text{err} \leftarrow |\Phi(x_0) - x_0|$   $\triangleright$  ou  $\frac{|\Phi(x_0) - x_0|}{|x_0| + 1}$ 
3: Tantque  $\text{err} > \epsilon$  et  $k \leq k_{\max}$  faire
4:    $k \leftarrow k + 1$ 
5:    $x_k \leftarrow \Phi(x_{k-1})$ 
6:    $\text{err} \leftarrow |\Phi(x_k) - x_k|$   $\triangleright$  ou  $\frac{|\Phi(x_k) - x_k|}{|x_k| + 1}$ 
7: Fin Tantque
8: Si  $\text{err} \leq \text{tol}$  alors  $\triangleright$  Convergence
9:    $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow x_k$   $\triangleright |\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}| \leq \text{tol}$ 
10: Fin Si
```

Algorithme Méthode de point fixe : version **Répéter** *formel*
avec critères d'arrêt

```
1:  $k \leftarrow 0$ 
2: Répéter
3:    $\text{err} \leftarrow |\Phi(x_k) - x_k|$   $\triangleright$  ou  $\frac{|\Phi(x_k) - x_k|}{|x_k| + 1}$ 
4:    $x_{k+1} \leftarrow \Phi(x_k)$ 
5:    $k \leftarrow k + 1$ 
6: jusqu'à  $\text{err} \leq \text{tol}$  ou  $k > k_{\max}$ 
7: Si  $\text{err} \leq \text{tol}$  alors  $\triangleright$  Convergence
8:    $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow x_k$   $\triangleright |\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}| \leq \text{tol}$ 
9: Fin Si
```

Algorithme Méthode de point fixe : version **Tantque** avec critères d'arrêt

Données :

Φ : $\Phi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$,
 x_0 : donnée initiale, $x_0 \in \mathbb{R}$,
 tol : la tolérance, $\text{tol} \in \mathbb{R}^+$,
 kmax : nombre maximum d'itérations, $\text{kmax} \in \mathbb{N}^*$

Résultat :

α_{tol} : un réel tel que $|\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}| \leq \text{tol}$
(ou $\frac{|\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}|}{|\alpha_{\text{tol}}| + 1} \leq \text{tol}$)

```
1: Fonction  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \text{PtFixe}(\Phi, x_0, \text{tol}, \text{kmax})$ 
2:    $k \leftarrow 0$ ,  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \emptyset$ 
3:    $x \leftarrow x_0$ ,  $\text{fx} \leftarrow \Phi(x_0)$ ,
4:    $\text{err} \leftarrow |\text{fx} - x|$   $\triangleright$  ou  $\frac{|\text{fx} - x|}{|x| + 1}$ 
5:   Tantque  $\text{err} > \text{tol}$  et  $k \leq \text{kmax}$  faire
6:      $k \leftarrow k + 1$ 
7:      $x \leftarrow \text{fx}$ 
8:      $\text{fx} \leftarrow \Phi(x)$ 
9:      $\text{err} \leftarrow |\text{fx} - x|$   $\triangleright$  ou  $\frac{|\text{fx} - x|}{|x| + 1}$ 
10:  Fin Tantque
11:  Si  $\text{err} \leq \text{tol}$  alors  $\triangleright$  Convergence
12:     $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow x$ 
13:  Fin Si
14: Fin Fonction
```

Algorithme Méthode de point fixe : version **Répéter** avec critères d'arrêt

Données :

Φ : $\Phi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$,
 x_0 : donnée initiale, $x_0 \in \mathbb{R}$,
 tol : la tolérance, $\text{tol} \in \mathbb{R}^+$,
 kmax : nombre maximum d'itérations, $\text{kmax} \in \mathbb{N}^*$

Résultat :

α_{tol} : un réel tel que $|\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}| \leq \text{tol}$
(ou $\frac{|\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}|}{|\alpha_{\text{tol}}| + 1} \leq \text{tol}$)

```
1: Fonction  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \text{PtFixe}(\Phi, x_0, \text{tol}, \text{kmax})$ 
2:    $k \leftarrow 0$ ,  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \emptyset$ 
3:    $x \leftarrow x_0$ 
4:   Répéter
5:      $x_p \leftarrow x$ 
6:      $x \leftarrow \Phi(x_p)$ 
7:      $\text{err} \leftarrow |x - x_p|$   $\triangleright$  ou  $\frac{|x - x_p|}{|x_p| + 1}$ 
8:      $k \leftarrow k + 1$ 
9:   jusqu'à  $\text{err} \leq \text{tol}$  ou  $k > \text{kmax}$ 
10:  Si  $\text{err} \leq \text{tol}$  alors  $\triangleright$  Convergence
11:     $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow x$ 
12:  Fin Si
13: Fin Fonction
```

Points fixes pour la recherche de racines

$$f(x) = 0 \iff \Phi(x) \stackrel{\text{def}}{=} x + f(x) = x.$$

si $\mathcal{F} \in \mathcal{C}^0$ tel que $\mathcal{F}(0) = 0$ alors

$$f(x) = 0 \iff \Phi(x) \stackrel{\text{def}}{=} x + \mathcal{F}(f(x)) = x.$$

Objectif : Construire une suite x_{k+1} tel que $|x_{k+1} - \alpha| \leq |x_k - \alpha|$.

formule de taylor :

$$f(\alpha) = 0 = f(x_k) + hf'(\xi) \text{ avec } h = \alpha - x_k.$$

Soit $q_k \approx f'(\xi)$ et $\tilde{h}$ solution de

$$f(x_k) + \tilde{h}q_k = 0$$

Si $q_k \neq 0$, on obtient la suite itérative $x_{k+1} = x_k + \tilde{h}$ i.e.

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{q_k}, \quad \forall k \in \mathbb{N} \tag{18}$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{q_k}, \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

x_{k+1} : intersection droite de pente q_k passant par $((x_k), f(x_k))$ avec (Ox)

- **Méthode de la corde :**

$$q_k = q = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

- **Méthode de la sécante :**

$$q_k = \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$$

où x_{-1} et x_0 sont données,

- **Méthode de Newton :** en supposant f' connu, on prend

$$q_k = f'(x_k).$$

Exercice 6

Soit f une fonction de classe C^1 sur $[a, b]$ vérifiant $f(a) \neq f(b)$. et $\lambda = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. On note $\Phi(x) = x - \frac{f(x)}{\lambda}$.

Q. 1

Montrer que si pour tout $x \in [a, b]$ on a

$$\min(\lambda(x-a), \lambda(x-b)) \leq f(x) \leq \max(\lambda(x-a), \lambda(x-b)) \quad (1)$$

alors $\Phi([a, b]) \subset [a, b]$.

Q. 2

Montrer que si pour tout $x \in [a, b]$ on a

$$\min(0, 2\lambda) < f'(x) < \max(0, 2\lambda) \quad (2)$$

alors $|\Phi'(x)| < 1$.

On se place sous les conditions (1) et (2).

Soit $x_0 \in [a, b]$ donné et on note

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{\lambda}, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Q. 3

Montrer que la suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est bien définie et qu'elle converge vers l'unique solution $\alpha \in [a, b]$ de $f(x) = 0$ à l'ordre 1 au moins.

Q. 4

En justifiant, sous quelle(s) condition(s) sur f a-t-on

- ① la convergence à l'ordre 1 exactement?
- ② la convergence à l'ordre 2 au moins?
- ③ la convergence à l'ordre 2 exactement?

$$x_{k+1} = x_k - \frac{b-a}{f(b)-f(a)}f(x_k), \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

On pose $\Phi(x) = x - \frac{b-a}{f(b)-f(a)}f(x)$, alors $x_{k+1} = \Phi(x_k)$.



Proposition : *convergence, méthode de la corde*

Soit $f \in \mathcal{C}^1([a, b])$ tel que $f(b) \neq f(a)$ et $\lambda = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. On suppose de plus que $\forall x \in [a, b]$

$$\min(\lambda(x-a), \lambda(x-b)) \leq f(x) \leq \max(\lambda(x-a), \lambda(x-b)) \quad (19)$$

$$\min(0, 2\lambda) < f'(x) < \max(0, 2\lambda) \quad (20)$$

On note $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ la suite donnée par $x_0 \in [a, b]$ et pour tout $k \geq 0$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{\lambda}. \quad (21)$$

alors la suite (x_k) est bien définie et converge vers l'unique racine $\alpha \in [a, b]$ de f à l'ordre 1 au moins.

- Si $f'(\alpha) \neq \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ la convergence est d'ordre 1 (exactement).
- Si $f'(\alpha) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ et si f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur un certain voisinage $\mathcal{V}$ de α alors la convergence est au moins d'ordre 2.

Méthode de point fixe : version **Tantque** avec critères d'arrêt

Données :

- Φ : $\Phi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$,
 x_0 : donnée initiale, $x_0 \in \mathbb{R}$,
tol : la tolérance, $\text{tol} \in \mathbb{R}^+$,
 $k_{\max}$: nombre maximum d'itérations, $k_{\max} \in \mathbb{N}^*$

Résultat :

- α_{tol} : un réel tel que $|\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}| \leq \text{tol}$
(ou $\frac{|\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}|}{|\alpha_{\text{tol}}| + 1} \leq \text{tol}$)

```
1: Fonction  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \text{PtFixe}(\Phi, x_0, \text{tol}, k_{\max})$ 
2:    $k \leftarrow 0$ ,  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \emptyset$ 
3:    $x \leftarrow x_0$ ,
4:    $\text{err} \leftarrow \text{tol} + 1$ 
5:   Tantque  $\text{err} > \text{tol}$  et  $k \leq k_{\max}$  faire
6:      $k \leftarrow k + 1$ 
7:      $x_p \leftarrow x$ 
8:      $x \leftarrow \Phi(x_p)$ 
9:      $\text{err} \leftarrow |x - x_p|$ 
10:  Fin Tantque
11:  Si  $\text{err} \leq \text{tol}$  alors
12:     $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow x$ 
13:  Fin Si
14: Fin Fonction
```

Méthode de la corde :

$$\Phi(x) = x - \frac{b - a}{f(b) - f(a)} f(x)$$

$\triangleright$ ou $\frac{|x_p - x|}{|x| + 1}$

$\triangleright$ Convergence

Méthode de point fixe : version **Tantque** avec critères d'arrêt

Données :

Φ : $\Phi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$,
 x_0 : donnée initiale, $x_0 \in \mathbb{R}$,
 tol : la tolérance, $\text{tol} \in \mathbb{R}^+$,
 kmax : nombre maximum d'itérations, $\text{kmax} \in \mathbb{N}^*$

Résultat :

α_{tol} : un réel tel que $|\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}| \leq \text{tol}$
(ou $\frac{|\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}|}{|\alpha_{\text{tol}}| + 1} \leq \text{tol}$)

```
1: Fonction  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \text{PtFixe}(\Phi, x_0, \text{tol}, \text{kmax})$ 
2:    $k \leftarrow 0$ ,  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \emptyset$ 
3:    $x \leftarrow x_0$ ,
4:    $\text{err} \leftarrow \text{tol} + 1$ 
5:   Tantque  $\text{err} > \text{tol}$  et  $k \leq \text{kmax}$  faire
6:      $k \leftarrow k + 1$ 
7:      $x_p \leftarrow x$ 
8:      $x \leftarrow \Phi(x_p)$ 
9:      $\text{err} \leftarrow |x - x_p|$ 
10:  Fin Tantque
11:  Si  $\text{err} \leq \text{tol}$  alors
12:     $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow x$ 
13:  Fin Si
14: Fin Fonction
```

$\triangleright$ ou $\frac{|x_p - x|}{|x| + 1}$

$\triangleright$ Convergence

Algorithme Méthode de la corde

Données :

f : $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$,
 a, b : deux réels tels que $f(a) \neq f(b)$,
 x_0 : donnée initiale, $x_0 \in \mathbb{R}$,
 tol : la tolérance, $\text{tol} \in \mathbb{R}^+$,
 kmax : nombre maximum d'itérations, $\text{kmax} \in \mathbb{N}^*$

Résultat :

α_{tol} : un réel tel que $|f(\alpha_{\text{tol}})| \leq \text{tol}$

```
1: Fonction  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \text{Corde}(f, a, b, x_0, \text{tol}, \text{kmax})$ 
2:    $k \leftarrow 0$ ,  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \emptyset$ 
3:    $q \leftarrow \frac{b-a}{f(b)-f(a)}$ 
4:    $x \leftarrow x_0$ ,
5:    $\text{err} \leftarrow \text{tol} + 1$ 
6:   Tantque  $\text{err} > \text{tol}$  et  $k \leq \text{kmax}$  faire
7:      $k \leftarrow k + 1$ 
8:      $x_p \leftarrow x$ 
9:      $x \leftarrow x_p - q * f(x_p)$ 
10:     $\text{err} \leftarrow |x - x_p|$ 
11:  Fin Tantque
12:  Si  $\text{err} \leq \text{tol}$  alors
13:     $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow x$ 
14:  Fin Si
15: Fin Fonction
```

$\triangleright$ Convergence

Plus simple, plus court ... ???

Méthode de point fixe : version **Tantque** avec critères d'arrêt

Données :

Φ : $\Phi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$,
 x_0 : donnée initiale, $x_0 \in \mathbb{R}$,
 tol : la tolérance, $\text{tol} \in \mathbb{R}^+$,
 kmax : nombre maximum d'itérations, $\text{kmax} \in \mathbb{N}^*$

Résultat :

α_{tol} : un réel tel que $|\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}| \leq \text{tol}$
(ou $\frac{|\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}|}{|\alpha_{\text{tol}}| + 1} \leq \text{tol}$)

1: **Fonction** $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \text{PtFixe}(\Phi, x_0, \text{tol}, \text{kmax})$

2: $k \leftarrow 0, \alpha_{\text{tol}} \leftarrow \emptyset$

3: $x \leftarrow x_0$,

4: $\text{err} \leftarrow \text{tol} + 1$

5: **Tantque** $\text{err} > \text{tol}$ et $k \leq \text{kmax}$ **faire**

6: $k \leftarrow k + 1$

7: $x_p \leftarrow x$

8: $x \leftarrow \Phi(x_p)$

9: $\text{err} \leftarrow |x - x_p|$

$\triangleright$ ou $\frac{|x_p - x|}{|x| + 1}$

10: **Fin Tantque**

$\triangleright$ Convergence

11: **Si** $\text{err} \leq \text{tol}$ **alors**

12: $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow x$

13: **Fin Si**

14: **Fin Fonction**

Algorithme Méthode de la corde utilisant la fonction **PtFixe**

Données :

f : $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$,

a, b : deux réels tels que $f(a) \neq f(b)$,

x_0 : donnée initiale, $x_0 \in \mathbb{R}$,

tol : la tolérance, $\text{tol} \in \mathbb{R}^+$,

kmax : nombre maximum d'itérations, $\text{kmax} \in \mathbb{N}^*$

Résultat :

α_{tol} : un réel tel que $|f(\alpha_{\text{tol}})| \leq \text{tol}$

1: **Fonction** $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \text{Corde}(f, a, b, x_0, \text{tol}, \text{kmax})$

2: $q \leftarrow \frac{b-a}{f(b)-f(a)}$

3: $\Phi \leftarrow (x \mapsto x - q * f(x))$

$\triangleright$ définition de fonction

4: $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \text{PtFixe}(\Phi, x_0, \text{tol}, \text{kmax})$


5: **Fin Fonction**

$\alpha = 1$, racine de $f : x \mapsto x^2 - 1$


- exemple 1 : $a = 0.000$, $b = 2.000$, $x_0 = 1.800$,
- exemple 2 : $a = 0.5000$, $b = 1.900$, $x_0 = 1.800$.

	exemple 1			exemple 2		
k	x_k	$ x_k - \alpha $	$ \tilde{x}_k - \alpha $	x_k	$ x_k - \alpha $	$ \tilde{x}_k - \alpha $
0	$\frac{9}{5}$	8.0000e-01	8.0000e-01	$\frac{9}{5}$	8.0000e-01	8.0000e-01
1	$\frac{17}{25}$	3.2000e-01	3.2000e-01	$\frac{13}{15}$	1.3333e-01	1.3333e-01
2	$\frac{593}{625}$	5.1200e-02	5.1200e-02	$\frac{131}{135}$	2.9630e-02	2.9630e-02
3	$\frac{390113}{390625}$	1.3107e-03	1.3107e-03	$\frac{10877}{10935}$	5.3041e-03	5.3041e-03
4	$\vdots$	8.5899e-07	8.5899e-07	$\vdots$	8.9573e-04	8.9573e-04
5	$\vdots$	3.6893e-13	3.6893e-13	$\vdots$	1.4962e-04	1.4962e-04
6	$\vdots$	6.8056e-26	0.0000e+00	$\vdots$	2.4947e-05	2.4947e-05
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
10	$\vdots$	6.463e-408		$\vdots$	1.9250e-08	1.9250e-08

L'exemple 1 converge beaucoup plus rapidement




(a) représentation usuelle




(b) Représentation point fixe

Figure: Exemple 1, méthode de la corde, $\alpha = 1$, racine de $f : x \mapsto x^2 - 1$ avec $a = 0.00$, $b = 2.00$, $x_0 = 1.80$,




(a) représentation usuelle





(b) Représentation point fixe

Figure: Exemple 2, méthode de la corde, $\alpha = 1$, racine de $f : x \mapsto x^2 - 1$ avec $a = 0.50$, $b = 1.90$, $x_0 = 1.80$,



(a) Erreurs en fonctions des itérations



(b) Représentation en échelle logarithmique de e_{k+1} en fonction de e_k . Les pentes sont calculées numériquement

Figure: Exemples 1 et 2, méthode de la corde, $\alpha = 1$, racine de $f : x \mapsto x^2 - 1$

Exemple 1 : $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 2$ et $f'(\alpha) = 2 \Rightarrow$ convergence ordre 2.

Exemple 2 : $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 2.400 \neq f'(\alpha) = 2 \Rightarrow$ convergence ordre 1.



Proposition : *convergence de la méthode de Newton*



Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur un certain voisinage d'une racine simple α de f . Soit x_0 donné dans ce voisinage, la suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ définie par la méthode de Newton

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad \forall k \in \mathbb{N}. \quad (22)$$

est localement convergente d'ordre 2.

Exercice 7

En -1700 av. J.-C., les babyloniens ne connaissaient que les nombres rationnels (fractions) et ils utilisaient le système sexagésimal (base 60). Pour approcher la valeur $\sqrt{2}$, ils utilisaient comme approximation (voir tablette YBC 7289)

$$\alpha = 1 + \frac{24}{60} + \frac{51}{60^2} + \frac{10}{60^3} = \frac{30547}{21600}$$

L'erreur commise est $|\alpha - \sqrt{2}| \approx 5.994e - 7$.



Q. 1

Comment feriez-vous pour trouver **à la main** une méthode permettant de trouver des nombres rationnels approchant $\sqrt{2}$.

Q. 2

Généraliser la méthode pour trouver une approximation rationnelle de $\sqrt{a}$ où a est un réel positif.

Q. 3

Généraliser la méthode pour trouver une approximation rationnelle de $\sqrt[n]{a}$ où a est un réel positif et $n \in \mathbb{N}^*$.

Méthode de point fixe : version **Tantque** avec critères d'arrêt

Données :

- Φ : $\Phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,
 x_0 : donnée initiale, $x_0 \in \mathbb{R}$,
 tol : la tolérance, $\text{tol} \in \mathbb{R}^+$,
 kmax : nombre maximum d'itérations, $\text{kmax} \in \mathbb{N}^*$

Résultat :

- α_{tol} : un réel tel que $|\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}| \leq \text{tol}$
(ou $\frac{|\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}|}{|\alpha_{\text{tol}}| + 1} \leq \text{tol}$)

```
1: Fonction  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \text{PtFixe}(\Phi, x_0, \text{tol}, \text{kmax})$ 
2:    $k \leftarrow 0$ ,  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \emptyset$ 
3:    $x \leftarrow x_0$ ,
4:    $\text{err} \leftarrow \text{tol} + 1$ 
5:   Tantque  $\text{err} > \text{tol}$  et  $k \leq \text{kmax}$  faire
6:      $k \leftarrow k + 1$ 
7:      $x_p \leftarrow x$ 
8:      $x \leftarrow \Phi(x_p)$ 
9:      $\text{err} \leftarrow |x - x_p|$ 
10:  Fin Tantque
11:  Si  $\text{err} \leq \text{tol}$  alors
12:     $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow x$ 
13:  Fin Si
14: Fin Fonction
```

Méthode de Newton :

$$\Phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

$$\triangleright \text{ ou } \frac{|x_p - x|}{|x| + 1}$$

$\triangleright$ Convergence

Méthode de point fixe : version **Tantque** avec critères d'arrêt

Données :

- Φ : $\Phi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$,
 x_0 : donnée initiale, $x_0 \in \mathbb{R}$,
 tol : la tolérance, $\text{tol} \in \mathbb{R}^+$,
 kmax : nombre maximum d'itérations, $\text{kmax} \in \mathbb{N}^*$

Résultat :

- α_{tol} : un réel tel que $|\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}| \leq \text{tol}$
(ou $\frac{|\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}|}{|\alpha_{\text{tol}}| + 1} \leq \text{tol}$)

```
1: Fonction  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \text{PtFixe}(\Phi, x_0, \text{tol}, \text{kmax})$ 
2:    $k \leftarrow 0$ ,  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \emptyset$ 
3:    $x \leftarrow x_0$ ,
4:    $\text{err} \leftarrow \text{tol} + 1$ 
5:   Tantque  $\text{err} > \text{tol}$  et  $k \leq \text{kmax}$  faire
6:      $k \leftarrow k + 1$ 
7:      $x_p \leftarrow x$ 
8:      $x \leftarrow \Phi(x_p)$ 
9:      $\text{err} \leftarrow |x - x_p|$  ▷ ou  $\frac{|x_p - x|}{|x| + 1}$ 
10:  Fin Tantque
11:  Si  $\text{err} \leq \text{tol}$  alors ▷ Convergence
12:     $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow x$ 
13:  Fin Si
14: Fin Fonction
```

Algorithme Méthode de Newton

Données :

- f : $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$,
 df : la dérivée de f ,
 x_0 : donnée initiale, $x_0 \in \mathbb{R}$,
 tol : la tolérance, $\text{tol} \in \mathbb{R}^+$,
 kmax : nombre maximum d'itérations, $\text{kmax} \in \mathbb{N}^*$

Résultat :

- α_{tol} : un réel tel que $|\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}| \leq \text{tol}$

```
1: Fonction  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \text{Newton}(f, \text{df}, x_0, \text{tol}, \text{kmax})$ 
2:    $k \leftarrow 0$ ,  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \emptyset$ 
3:    $x \leftarrow x_0$ ,
4:    $\text{err} \leftarrow \text{tol} + 1$ 
5:   Tantque  $\text{err} > \text{tol}$  et  $k \leq \text{kmax}$  faire
6:      $k \leftarrow k + 1$ 
7:      $x_p \leftarrow x$ 
8:      $x \leftarrow x_p - f(x_p)/\text{df}(x_p)$  ▷  $\text{df}(x_p) \neq 0$ 
9:      $\text{err} \leftarrow |x - x_p|$ 
10:  Fin Tantque
11:  Si  $\text{err} \leq \text{tol}$  alors ▷ Convergence
12:     $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow x$ 
13:  Fin Si
14: Fin Fonction
```

Plus simple, plus court ... ???

Méthode de point fixe : version **Tantque** avec critères d'arrêt

Données :

Φ : $\Phi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$,
 x_0 : donnée initiale, $x_0 \in \mathbb{R}$,
 tol : la tolérance, $\text{tol} \in \mathbb{R}^+$,
 kmax : nombre maximum d'itérations, $\text{kmax} \in \mathbb{N}^*$

Résultat :

α_{tol} : un réel tel que $|\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}| \leq \text{tol}$
(ou $\frac{|\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}|}{|\alpha_{\text{tol}}| + 1} \leq \text{tol}$)

```
1: Fonction  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \text{PtFixe}(\Phi, x_0, \text{tol}, \text{kmax})$ 
2:    $k \leftarrow 0, \alpha_{\text{tol}} \leftarrow \emptyset$ 
3:    $x \leftarrow x_0$ ,
4:    $\text{err} \leftarrow \text{tol} + 1$ 
5:   Tantque  $\text{err} > \text{tol}$  et  $k \leq \text{kmax}$  faire
6:      $k \leftarrow k + 1$ 
7:      $x_p \leftarrow x$ 
8:      $x \leftarrow \Phi(x_p)$ 
9:      $\text{err} \leftarrow |x - x_p|$ 
10:  Fin Tantque
11:  Si  $\text{err} \leq \text{tol}$  alors
12:     $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow x$ 
13:  Fin Si
14: Fin Fonction
```

$\triangleright$ ou $\frac{|x_p - x|}{|x| + 1}$

$\triangleright$ Convergence

Algorithme Méthode de Newton scalaire

Données :


f : $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$,
 df : la dérivée de f ,
 x_0 : donnée initiale, $x_0 \in \mathbb{R}$,
 tol : la tolérance, $\text{tol} \in \mathbb{R}^+$,
 kmax : nombre maximum d'itérations, $\text{kmax} \in \mathbb{N}^*$

Résultat :


α_{tol} : un réel tel que

```
1: Fonction  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \text{Newton}(f, \text{df}, x_0, \text{tol}, \text{kmax})$ 
2:    $\Phi \leftarrow (x \mapsto x - f(x)/\text{df}(x))$ 
3:    $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \text{PtFixe}(\Phi, x_0, \text{tol}, \text{kmax})$ 
4: Fin Fonction
```

Plus simple, plus court ... ???




(a) représentation usuelle




(b) Représentation point fixe avec

$$\Phi : x \mapsto x - \frac{x^2 - 1}{2x}$$

Figure: Exemple 1, méthode de Newton, $\alpha = 1$, racine de $f : x \mapsto x^2 - 1$ avec $x_0 = 0.40$,




(a) représentation usuelle




(b) Représentation point fixe avec

$$\Phi : x \mapsto \frac{x^2 \cos(x)}{x^2 \sin(x) - 2x \cos(x)} + x$$

Figure: Exemple 2, méthode de Newton, $\alpha = \frac{1}{2} \pi$, racine de $f : x \mapsto x^2 \cos(x)$ avec $x_0 = 2.00$,



(a) Représentation de la convergence, e_k en fonction de k



(b) Représentation de l'ordre de convergence en échelle logarithmique, e_{k+1} en fonction de e_k . Ordre théorique 2

Figure: Méthode de Newton, convergence et ordre

Alternative à la méthode de Newton lorsque l'on ne connaît pas la dérivée de la fonction f :

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}.$$




Proposition : Convergence méthode de la sécante (Admis)


Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur un certain voisinage d'une racine simple α de f . Soient x_{-1} et x_0 donnés dans ce voisinage tels que $f(x_{-1}) \neq f(x_0)$, la suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ définie par la méthode de la sécante

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})} f(x_k), \quad \forall k \in \mathbb{N}. \quad (23)$$

est localement convergente d'ordre $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$.




(a) $f(x) = x^2 - 1$, $x_{-1} = 0.000$ et $x_0 = 2.000$




(b) $f(x) = x^2 \cos(x)$, $x_{-1} = 1.000$ et $x_0 = 3.000$

Figure: Méthode de la sécante



(a) Représentation de la convergence, e_k en fonction de k



(b) Représentation de l'ordre de convergence en échelle logarithmique, e_{k+1} en fonction de e_k . Ordre théorique $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$

Figure: Méthode de la sécante, convergence et ordre

1 Recherche des zéros d'une fonction

- Points fixes attractifs et répulsifs
- Ordres
- Algorithme générique du point fixe
- Points fixes pour la recherche de racines
- Méthode de la corde





- Méthode de Newton
- Méthode de la sécante

2 Résolution de systèmes non linéaires

- Point fixe
- Méthode de Newton
- Exemples

Soit $c \in \mathbb{R}$ donné.

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2) = -x_1^3 + x_2 - \frac{1}{2} & = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = \frac{1}{25} (10x_2 + 1)^2 + c - x_1 & = 0. \end{cases} \quad (24)$$



Soient $U \subset \mathbb{R}^N$ un ouvert et $\mathbf{f} \in \mathcal{C}^0(U; \mathbb{R}^N)$

Trouver $\alpha \in U \subset \mathbb{R}^N$ tel que

$$\mathbf{f}(\alpha) = 0 \iff \begin{cases} \mathbf{f}_1(\alpha_1, \dots, \alpha_N) &= 0 \\ \mathbf{f}_2(\alpha_1, \dots, \alpha_N) &= 0 \\ \vdots & \\ \mathbf{f}_N(\alpha_1, \dots, \alpha_N) &= 0 \end{cases}$$

On pose, par ex., $\Phi(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + \mathbf{f}(\mathbf{x})$, : $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = 0 \iff \Phi(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ Point fixe

Trouver $\alpha \in U \subset \mathbb{R}^N$ tel que

$$\Phi(\alpha) = \alpha \iff \begin{cases} \Phi_1(\alpha_1, \dots, \alpha_N) &= \alpha_1 \\ \Phi_2(\alpha_1, \dots, \alpha_N) &= \alpha_2 \\ \vdots & \\ \Phi_N(\alpha_1, \dots, \alpha_N) &= \alpha_N \end{cases}$$

- 1 Recherche des zéros d'une fonction
 - Méthode de dichotomie ou de bisection
 - Quelques définitions et résultats
 - Points fixes d'une fonction (dimension 1)
 - Points fixes attractifs et répulsifs
 - Ordres
 - Algorithme générique du point fixe
 - Points fixes pour la recherche de racines

- Méthode de la corde
- Méthode de Newton
- Méthode de la sécante

- 2 Résolution de systèmes non linéaires
 - Point fixe
 - Méthode de Newton
 - Exemples

Théorème : *Point fixe de Banach* ★★★★★



Soit $\mathcal{B}$ un espace de Banach et $U \subset \mathcal{B}$ un sous-ensemble fermé. On suppose que $\Phi : U \longrightarrow U$ est une application strictement contractante, i.e.

$$\exists L \in [0, 1[, \quad \|\Phi(\mathbf{x}) - \Phi(\mathbf{y})\| \leq L \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|, \quad \forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in U \times U. \quad (25)$$

Alors

- ① Φ admet un unique point fixe $\alpha \in U$ (i.e. unique solution de $\mathbf{x} = \Phi(\mathbf{x})$).
- ② La suite des itérés $\mathbf{x}^{[k+1]} = \Phi(\mathbf{x}^{[k]})$ converge vers α pour toute valeur initiale $\mathbf{x}^{[0]} \in U$.
- ③ Pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\|\alpha - \mathbf{x}^{[k]}\| \leq \frac{L^{k-l}}{1-L} \|\mathbf{x}^{[l+1]} - \mathbf{x}^{[l]}\|, \quad 0 \leq l \leq k \quad (26)$$

- 1 Recherche des zéros d'une fonction
 - Méthode de dichotomie ou de bisection
 - Quelques définitions et résultats
 - Points fixes d'une fonction (dimension 1)
 - Points fixes attractifs et répulsifs
 - Ordres
 - Algorithme générique du point fixe
 - Points fixes pour la recherche de racines

- Méthode de la corde
- Méthode de Newton
- Méthode de la sécante

- 2 Résolution de systèmes non linéaires
 - Point fixe
 - Méthode de Newton
 - Exemples

$\mathbf{f} : \mathbb{R}^N \longrightarrow \mathbb{R}^N$ une fonction suffisamment régulière. On définit la **matrice Jacobienne de $\mathbf{f}$** , notée $\mathbb{J}_{\mathbf{f}}$, par

$$\mathbb{J}_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_N} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_N}{\partial x_1} & \frac{\partial f_N}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_N}{\partial x_N} \end{pmatrix}$$

On a alors $\forall \mathbf{h} \in \mathbb{R}^N$ à l'ordre 1

$$\mathbf{f}(\mathbf{x} + \mathbf{h}) \approx \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbb{J}_{\mathbf{f}}(\mathbf{x}).\mathbf{h}. \quad (27)$$

On a $\forall \mathbf{h} \in \mathbb{R}^N$ à l'ordre 1

$$\mathbf{f}(\mathbf{x} + \mathbf{h}) \approx \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbb{J}_{\mathbf{f}}(\mathbf{x}).\mathbf{h}. \quad (28)$$

trouver $\boldsymbol{\alpha}$ tel que $\mathbf{f}(\boldsymbol{\alpha}) = 0$.

Si $\mathbf{x}^{[k]}$ est proche de $\boldsymbol{\alpha}$, alors avec $\mathbf{x} = \mathbf{x}^{[k]}$ et $\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{x}^{[k]} + \mathbf{h}$

$$\mathbf{f}(\boldsymbol{\alpha}) \approx \mathbf{f}(\mathbf{x}^{[k]}) + \mathbb{J}_{\mathbf{f}}(\mathbf{x}^{[k]}).\mathbf{h}$$

On résoud le système linéarisé

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}^{[k]}) + \mathbb{J}_{\mathbf{f}}(\mathbf{x}^{[k]}).\tilde{\mathbf{h}} = 0 \Leftrightarrow \mathbb{J}_{\mathbf{f}}(\mathbf{x}^{[k]}).\tilde{\mathbf{h}} = -\mathbf{f}(\mathbf{x}^{[k]}).$$

On pose $\Phi(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - ((\mathbb{J}_{\mathbf{f}}(\mathbf{x}))^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{x}))$. la méthode de Newton s'écrit alors

$$\mathbf{x}^{[k+1]} = \Phi(\mathbf{x}^{[k]}) = \mathbf{x}^{[k]} - \left((\mathbb{J}_{\mathbf{f}}(\mathbf{x}^{[k]})) \right)^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{x}^{[k]}) \quad (29)$$

Théorème : (*Admis*)

Soit $\mathbf{f} \in \mathcal{C}^3(\mathbb{R}^N; \mathbb{R}^N)$. On suppose que la matrice Jacobienne appliquée en $\mathbf{x}$, $\mathbb{J}_{\mathbf{f}}(\mathbf{x})$ est inversible dans un voisinage de $\boldsymbol{\alpha}$, avec $\mathbf{f}(\boldsymbol{\alpha}) = 0$. Alors pour tout $\mathbf{x}^{[0]}$ suffisamment proche de $\boldsymbol{\alpha}$ la suite définie par

$$\mathbf{x}^{[k+1]} = \mathbf{x}^{[k]} - \left(\mathbb{J}_{\mathbf{f}}(\mathbf{x}^{[k]}) \right)^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{x}^{[k]})$$

converge vers $\boldsymbol{\alpha}$ et la convergence est d'ordre 2.

Comment fait-on pour calculer $-\left(\mathbb{J}_{\mathbf{f}}(\mathbf{x}^{[k]}) \right)^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{x}^{[k]})$?

Théorème : (Admis)

Soit $\mathbf{f} \in \mathcal{C}^3(\mathbb{R}^N; \mathbb{R}^N)$. On suppose que la matrice Jacobienne appliquée en $\mathbf{x}$, $\mathbb{J}_{\mathbf{f}}(\mathbf{x})$ est inversible dans un voisinage de $\boldsymbol{\alpha}$, avec $\mathbf{f}(\boldsymbol{\alpha}) = 0$. Alors pour tout $\mathbf{x}^{[0]}$ suffisamment proche de $\boldsymbol{\alpha}$ la suite définie par

$$\mathbf{x}^{[k+1]} = \mathbf{x}^{[k]} - \left((\mathbb{J}_{\mathbf{f}}(\mathbf{x}^{[k]}))^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{x}^{[k]}) \right)$$

converge vers $\boldsymbol{\alpha}$ et la convergence est d'ordre 2.

Comment fait-on pour calculer $-(\mathbb{J}_{\mathbf{f}}(\mathbf{x}^{[k]}))^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{x}^{[k]})$?

On résout le système linéaire

$$\left((\mathbb{J}_{\mathbf{f}}(\mathbf{x}^{[k]})) \right) \mathbf{h} = -\mathbf{f}(\mathbf{x}^{[k]})$$

Remarque : Si l'on ne connaît pas explicitement la Jacobienne de f , il est possible de calculer une approximation de celle-ci en utilisant des formules de dérivation numérique.

Méthode de Newton scalaire

Données :

f : $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$,
 df : la dérivée de f ,
 x_0 : donnée initiale, $x_0 \in \mathbb{R}$,
 tol : la tolérance, $tol \in \mathbb{R}^+$,
 $kmax$: nombre maximum d'itérations, $kmax \in \mathbb{N}^*$

Résultat :

α_{tol} : un réel tel que

```
1: Fonction  $\alpha_{tol} \leftarrow \text{Newton}(f, df, x_0, tol, kmax)$ 
2:    $k \leftarrow 0, \alpha_{tol} \leftarrow \emptyset$ 
3:    $x \leftarrow x_0$ ,
4:    $err \leftarrow tol + 1$ 
5:   Tantque  $err > tol$  et  $k \leq kmax$  faire
6:      $k \leftarrow k + 1$ 
7:      $xp \leftarrow x$ 
8:      $x \leftarrow xp - f(xp)/df(xp)$ 
9:      $err \leftarrow |x - xp|$ 
10:  Fin Tantque
11:  Si  $err \leq tol$  alors
12:     $\alpha_{tol} \leftarrow x$ 
13:  Fin Si
14: Fin Fonction
```

Méthode de Newton vectorielle :

$$\Phi(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - ((J_{\mathbf{f}}(\mathbf{x}))^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{x}))$$

$$\triangleright x \leftarrow \Phi(xp)$$

Méthode de Newton scalaire

Données :

f : $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$,
 df : la dérivée de f ,
 x_0 : donnée initiale, $x_0 \in \mathbb{R}$,
 tol : la tolérance, $tol \in \mathbb{R}^+$,
 $kmax$: nombre maximum d'itérations, $kmax \in \mathbb{N}^*$

Résultat :

α_{tol} : un réel tel que

```
1: Fonction  $\alpha_{tol} \leftarrow \text{Newton}(f, df, x_0, tol, kmax)$ 
2:    $k \leftarrow 0, \alpha_{tol} \leftarrow \emptyset$ 
3:    $x \leftarrow x_0$ ,
4:    $err \leftarrow tol + 1$ 
5:   Tantque  $err > tol$  et  $k \leq kmax$  faire
6:      $k \leftarrow k + 1$ 
7:      $xp \leftarrow x$ 
8:      $x \leftarrow xp - f(xp)/df(xp)$   $\triangleright x \leftarrow \Phi(xp)$ 
9:      $err \leftarrow |x - xp|$ 
10:  Fin Tantque
11:  Si  $err \leq tol$  alors
12:     $\alpha_{tol} \leftarrow x$ 
13:  Fin Si
14: Fin Fonction
```

Algorithme Méthode de Newton vectorielle

Données :

$\mathbf{f}$: $\mathbf{f} : \mathbb{R}^N \longrightarrow \mathbb{R}^N$,
 Jf : la matrice Jacobienne de f ,
 $\mathbf{x0}$: donnée initiale, $\mathbf{x0} \in \mathbb{R}^N$,
 tol : la tolérance, $tol \in \mathbb{R}^+$,
 $kmax$: nombre maximum d'itérations, $kmax \in \mathbb{N}^*$

Résultat :

α_{tol} : un élément de $\mathbb{R}^N$ proche de α .

```
1: Fonction  $\alpha_{tol} \leftarrow \text{Newton}(\mathbf{f}, Jf, \mathbf{x0}, tol, kmax)$ 
2:    $k \leftarrow 0, \alpha_{tol} \leftarrow \emptyset$ 
3:    $\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x0}$ ,
4:    $err \leftarrow tol + 1$ 
5:   Tantque  $err > tol$  et  $k \leq kmax$  faire
6:      $k \leftarrow k + 1$ 
7:      $\mathbf{xp} \leftarrow \mathbf{x}$ 
8:      $\mathbf{h} \leftarrow \text{Solve}(Jf(\mathbf{xp}), -\mathbf{f}(\mathbf{xp}))$ 
9:      $\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{xp} + \mathbf{h}$ 
10:     $err \leftarrow \text{Norm}(\mathbf{x} - \mathbf{xp})$ 
11:  Fin Tantque
12:  Si  $err \leq tol$  alors  $\triangleright$  Convergence
13:     $\alpha_{tol} \leftarrow \mathbf{x}$ 
14:  Fin Si
15: Fin Fonction
```

Rappel : Point fixe scalaire. Et le cas vectoriel ... ???

Méthode de point fixe scalaire

Données :

Φ : $\Phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,
 x_0 : donnée initiale, $x_0 \in \mathbb{R}$,
 tol : la tolérance, $\text{tol} \in \mathbb{R}^+$,
 kmax : nombre maximum d'itérations, $\text{kmax} \in \mathbb{N}^*$

Résultat :

α_{tol} : un réel tel que $|\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}| \leq \text{tol}$
(ou $\frac{|\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}|}{|\alpha_{\text{tol}}| + 1} \leq \text{tol}$)

1: **Fonction** $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \text{PtFixe}(\Phi, x_0, \text{tol}, \text{kmax})$

2: $k \leftarrow 0$, $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \emptyset$

3: $x \leftarrow x_0$, $\text{fx} \leftarrow \Phi(x_0)$,

4: $\text{err} \leftarrow |\text{fx} - x|$ $\triangleright$ ou $\frac{|\text{fx} - x|}{|x| + 1}$

5: **Tantque** $\text{err} > \text{tol}$ et $k \leq \text{kmax}$ **faire**

6: $k \leftarrow k + 1$

7: $x \leftarrow \text{fx}$

8: $\text{fx} \leftarrow \Phi(x)$

9: $\text{err} \leftarrow |\text{fx} - x|$ $\triangleright$ ou $\frac{|\text{fx} - x|}{|x| + 1}$

10: **Fin Tantque**

11: **Si** $\text{err} \leq \text{tol}$ **alors** $\triangleright$ Convergence

12: $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow x$

13: **Fin Si**

14: **Fin Fonction**

Algorithme Méthode de Newton scalaire

Données :

f : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

df : la dérivée de f ,

x_0 : donnée initiale, $x_0 \in \mathbb{R}$,

tol : la tolérance, $\text{tol} \in \mathbb{R}^+$,

kmax : nombre maximum d'itérations, $\text{kmax} \in \mathbb{N}^*$

Résultat :

α_{tol} : un réel tel que

1: **Fonction** $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \text{Newton}(f, \text{df}, x_0, \text{tol}, \text{kmax})$

2: $\Phi \leftarrow (x \mapsto x - f(x)/\text{df}(x))$

3: $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \text{PtFixe}(\Phi, x_0, \text{tol}, \text{kmax})$

4: **Fin Fonction**

Rappel : Point fixe scalaire. Et le cas vectoriel ... ???

Méthode de point fixe scalaire

Données :

Φ : $\Phi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$,
 x_0 : donnée initiale, $x_0 \in \mathbb{R}$,
 tol : la tolérance, $\text{tol} \in \mathbb{R}^+$,
 kmax : nombre maximum d'itérations, $\text{kmax} \in \mathbb{N}^*$

Résultat :

α_{tol} : un réel tel que $|\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}| \leq \text{tol}$
 (ou $\frac{|\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}|}{|\alpha_{\text{tol}}| + 1} \leq \text{tol}$)

```

1: Fonction  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \text{PtFixe}(\Phi, x_0, \text{tol}, \text{kmax})$ 
2:    $k \leftarrow 0, \alpha_{\text{tol}} \leftarrow \emptyset$ 
3:    $x \leftarrow x_0, \text{fx} \leftarrow \Phi(x_0)$ 
4:    $\text{err} \leftarrow |\text{fx} - x|$                                  $\triangleright$  ou  $\frac{|\text{fx} - x|}{|x| + 1}$ 
5:   Tantque  $\text{err} > \text{tol}$  et  $k \leq \text{kmax}$  faire
6:      $k \leftarrow k + 1$ 
7:      $x \leftarrow \text{fx}$ 
8:      $\text{fx} \leftarrow \Phi(x)$ 
9:      $\text{err} \leftarrow |\text{fx} - x|$                                  $\triangleright$  ou  $\frac{|\text{fx} - x|}{|x| + 1}$ 
10:  Fin Tantque
11:  Si  $\text{err} \leq \text{tol}$  alors                                 $\triangleright$  Convergence
12:     $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow x$ 
13:  Fin Si
14: Fin Fonction
    
```

Algorithme Méthode de point fixe vectorielle

Données :

Φ : $\Phi : \mathbb{K}^N \longrightarrow \mathbb{K}^N$,
 $\mathbf{x}_0$: donnée initiale, $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{K}^N$,
 tol : la tolérance, $\text{tol} \in \mathbb{R}^+$,
 kmax : nombre maximum d'itérations, $\text{kmax} \in \mathbb{N}^*$

Résultat :

α_{tol} : un réel tel que $\|\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}\| \leq \text{tol}$

```

1: Fonction  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \text{PtFixeVec}(\Phi, \mathbf{x}_0, \text{tol}, \text{kmax})$ 
2:    $k \leftarrow 0, \alpha_{\text{tol}} \leftarrow \emptyset$ 
3:    $\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x}_0, \text{fx} \leftarrow \Phi(\mathbf{x}_0)$ 
4:    $\text{err} \leftarrow \|\text{fx} - \mathbf{x}\|$                                  $\triangleright$  ou  $\frac{\|\text{fx} - \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\| + 1}$ 
5:   Tantque  $\text{err} > \text{tol}$  et  $k \leq \text{kmax}$  faire
6:      $k \leftarrow k + 1$ 
7:      $\mathbf{x} \leftarrow \text{fx}$ 
8:      $\text{fx} \leftarrow \Phi(\mathbf{x})$ 
9:      $\text{err} \leftarrow \|\text{fx} - \mathbf{x}\|$                                  $\triangleright$  ou  $\frac{\|\text{fx} - \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\| + 1}$ 
10:  Fin Tantque
11:  Si  $\text{err} \leq \text{tol}$  alors
12:     $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \mathbf{x}$ 
13:  Fin Si
14: Fin Fonction
    
```

Rappel : Point fixe scalaire. Et le cas vectoriel ... ???

Méthode de Newton vectorielle

Données :

$\mathbf{f}$: $\mathbf{f} : \mathbb{R}^N \longrightarrow \mathbb{R}^N$,
 $\mathbf{Jf}$: la matrice Jacobienne de $\mathbf{f}$,
 $\mathbf{x0}$: donnée initiale, $\mathbf{x0} \in \mathbb{R}^N$,
 tol : la tolérance, $\text{tol} \in \mathbb{R}^+$,
 kmax : nombre maximum d'itérations, $\text{kmax} \in \mathbb{N}^*$

Résultat :

α_{tol} : un élément de $\mathbb{R}^N$ proche de α .

```

1: Fonction  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \text{NewtonVec}(\mathbf{f}, \mathbf{Jf}, \mathbf{x0}, \text{tol}, \text{kmax})$ 
2:    $\Phi \leftarrow (\mathbf{x} \mapsto \mathbf{x} - \text{Solve}(\mathbf{Jf}(\mathbf{x}), \mathbf{f}(\mathbf{x})))$ 
3:    $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \text{PtFixeVec}(\Phi, \mathbf{x0}, \text{tol}, \text{kmax})$ 
4: Fin Fonction
    
```

Algorithme Méthode de point fixe vectorielle

Données :

Φ : $\Phi : \mathbb{K}^N \longrightarrow \mathbb{K}^N$,
 $\mathbf{x0}$: donnée initiale, $\mathbf{x0} \in \mathbb{K}^N$,
 tol : la tolérance, $\text{tol} \in \mathbb{R}^+$,
 kmax : nombre maximum d'itérations, $\text{kmax} \in \mathbb{N}^*$

Résultat :

α_{tol} : un réel tel que $\|\Phi(\alpha_{\text{tol}}) - \alpha_{\text{tol}}\| \leq \text{tol}$

```

1: Fonction  $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \text{PtFixeVec}(\Phi, \mathbf{x0}, \text{tol}, \text{kmax})$ 
2:    $k \leftarrow 0, \alpha_{\text{tol}} \leftarrow \emptyset$ 
3:    $\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x0}, \mathbf{fx} \leftarrow \Phi(\mathbf{x0})$ ,
4:    $\text{err} \leftarrow \|\mathbf{fx} - \mathbf{x}\|$  ▷ ou  $\frac{\|\mathbf{fx} - \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\| + 1}$ 
5:   Tantque  $\text{err} > \text{tol}$  et  $k \leq \text{kmax}$  faire
6:      $k \leftarrow k + 1$ 
7:      $\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{fx}$ 
8:      $\mathbf{fx} \leftarrow \Phi(\mathbf{x})$ 
9:      $\text{err} \leftarrow \|\mathbf{fx} - \mathbf{x}\|$  ▷ ou  $\frac{\|\mathbf{fx} - \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\| + 1}$ 
10:  Fin Tantque
11:  Si  $\text{err} \leq \text{tol}$  alors
12:     $\alpha_{\text{tol}} \leftarrow \mathbf{x}$ 
13:  Fin Si
14: Fin Fonction
    
```

- 1 Recherche des zéros d'une fonction
 - Méthode de dichotomie ou de bisection
 - Quelques définitions et résultats
 - Points fixes d'une fonction (dimension 1)
 - Points fixes attractifs et répulsifs
 - Ordres
 - Algorithme générique du point fixe
 - Points fixes pour la recherche de racines


- Méthode de la corde
- Méthode de Newton
- Méthode de la sécante

- 2 Résolution de systèmes non linéaires
 - Point fixe
 - Méthode de Newton
 - Exemples

Représentation de 4 suites de Newton avec
 $c = -3/2$

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2) = -x_1^3 + x_2 - \frac{1}{2} & = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = \frac{1}{25} (10x_2 + 1)^2 + c - x_1 & = 0. \end{cases}$$


Conclusion?




Représentation de 4 suites de Newton avec
 $c = -3/2$

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2) = -x_1^3 + x_2 - \frac{1}{2} & = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = \frac{1}{25} (10x_2 + 1)^2 + c - x_1 & = 0. \end{cases}$$


Conclusion?



Très difficile, si l'on n'est pas suffisamment proche d'un point fixe, de prédire vers lequel on converge.



(a) Bassin d'attraction des racines




(b) Nombre d'itérations de convergence

Figure: Méthode de Newton


Exemple complexe : $z^3 - 1 = 0$, fractale de Newton

on peut poser $z = x + iy$, et le système équivalent devient

$$\begin{cases} f_1(x, y) = x^3 - 3xy^2 - 1 = 0 \\ f_2(x, y) = 3x^2y - y^3 = 0. \end{cases}$$




(a) Bassin d'attraction des racines




(b) Nombre d'itérations de convergence

Exemple complexe : $z^3 - 1 = 0$, fractale de Newton




Méthode de Newton, zoom 1 sur les bassins d'attraction

Exemple complexe : $z^3 - 1 = 0$, fractale de Newton




Méthode de Newton, zoom 2 sur les bassins d'attraction

Exemple complexe : $z^3 - 1 = 0$, fractale de Newton




Méthode de Newton, zoom 3 sur les bassins d'attraction

Exemple complexe : $z^3 - 1 = 0$, fractale de Newton




Méthode de Newton, zoom 1 sur les nombres d'itérations

Exemple complexe : $z^3 - 1 = 0$, fractale de Newton




Méthode de Newton, zoom 2 sur les nombres d'itérations

Exemple complexe : $z^3 - 1 = 0$, fractale de Newton




Méthode de Newton, zoom 3 sur les nombres d'itérations

Exemple complexe : $z^5 - 1 = 0$, fractale de Newton




(a) Bassin d'attraction des racines




(b) Nombre d'itérations de convergence

$$[-1.5, 1.5] \times [-1.5, 1.5]$$

Exemple complexe : $z^3 - 2z + 2 = 0$, fractale de Newton



(a) Bassin d'attraction des racines. En rouge zone de divergence



(b) Nombre d'itérations de convergence. En blanc zone de divergence

$$[-2, 2] \times [-2, 2]$$