

Feuille d'exercices 8

Espaces Euclidiens

Exercice 1

Soit $E = \mathbb{R}^4$ muni de son produit scalaire canonique et de la base canonique $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$.

1. Déterminer une base orthonormale du sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ donné par les équations

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ z + t = 0 \end{cases}$$

2. On note F le sous-espace de la question précédente. Donner la matrice de la projection orthogonale p_F sur le sous-espace vectoriel F , dans la base canonique.

Solution

1. On trouve comme base $\mathcal{C} = \{(1, -1, 0, 0); (0, 0, 1, -1)\}$ qui est clairement orthogonale, on prend donc comme base orthonormale obtenue en normalisant tout simplement les deux vecteurs :

$$\mathcal{D} = \left\{ \underbrace{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}, 0, 0\right)}_x; \underbrace{\left(0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right)}_y \right\}$$

2. La formule de la projection est donnée par

$$p_F(v) = \langle v, x \rangle x + \langle v, y \rangle y$$

et donc il n'y a qu'à calculer les valeurs pour les vecteurs de la base canonique, on obtient

$$Mat_{p_F} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 2

Soit $E = \mathbb{R}^n$ muni de son produit scalaire canonique et soient f et g deux endomorphismes symétriques de E .

1. Montrer que $\ker(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ sont des supplémentaires orthogonaux, c'est à dire que

$$\ker(f) \oplus^\perp \operatorname{Im}(f) = E.$$

2. Montrer que $g \circ f$ est symétrique si et seulement si $f \circ g = g \circ f$.

Solution

1. On montre déjà qu'ils sont orthogonaux : si $x \in \ker(f)$ et $f(z) = y \in \text{Im}(f)$, on a

$$\langle x, y \rangle = \langle x, f(z) \rangle = \langle f(x), z \rangle = \langle 0, z \rangle = 0$$

Il reste à montrer que noyaux et images sont supplémentaires, mais c'est évident par le théorème du rang qui stipule que $\dim(E) = \dim(\ker(f)) + \dim(\text{Im}(f))$.

2. Comme f et g sont symétriques, on a pour tout couple $(x, y) \in E^2$,

$$\langle g \circ f(x), y \rangle = \langle f(x), g(y) \rangle = \langle x, f \circ g(y) \rangle$$

il va donc de soi que si $f \circ g = g \circ f$, alors $g \circ f$ est symétrique.

Réciproquement si $g \circ f$ est symétrique, on a pour tout $(x, y) \in E^2$

$$\langle x, g \circ f(y) \rangle = \langle x, f \circ g(y) \rangle$$

autrement dit si on fixe un y , on a pour tout x , $\langle x, g \circ f(y) - f \circ g(y) \rangle = 0$, ce qui implique que $g \circ f(y) - f \circ g(y) = 0$ et donc on a bien $g \circ f(y) = f \circ g(y)$. Comme la remarque vaut pour tout y , on a bien $g \circ f = f \circ g$.

Exercice 3

Soit E un espace Euclidien muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et $f : E \rightarrow E$ une "application symétrique", c'est que à dire que pour tout couple $(x, y) \in E^2$, on a

$$\langle f(x), y \rangle = \langle x, f(y) \rangle.$$

Montrer que f est nécessairement une application linéaire (donc un endomorphisme symétrique).

Indice : calculer pour $(x, y, z) \in E^3$ la valeur de $\langle f(x+y) - f(x) - f(y), z \rangle$

Solution

Montrer que $f(x+y) = f(x) + f(y)$ revient à montrer que $f(x+y) - f(x) - f(y) = 0$, c'est à dire que $f(x+y) - f(x) - f(y)$ est orthogonal à tout vecteur de E .

On calcule :

$$\begin{aligned} \langle f(x+y) - f(x) - f(y), z \rangle &= \langle f(x+y), z \rangle - \langle f(x), z \rangle - \langle f(y), z \rangle \\ &= \langle x+y, f(z) \rangle - \langle x, f(z) \rangle - \langle y, f(z) \rangle = \langle x+y-x-y, f(z) \rangle = 0 \end{aligned}$$

La même chose pour montrer que si $\lambda \in \mathbb{R}$, $f(\lambda x) = \lambda f(x)$.

Exercice 4

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice.

1. Montrer que la matrice tAA est symétrique et en déduire qu'elle est diagonalisable.
2. Montrer que si X est un vecteur propre de tAA associé à une valeur propre λ , on a

$${}^t(AX)AX = \lambda {}^tXX$$

3. En déduire que les valeurs propres de A sont positives.

Solution

1. On a

$${}^t({}^tAA) = {}^tA {}^t({}^tA) = {}^tAA$$

donc cette matrice est symétrique et d'après le cours elle est diagonalisable.

2. Si λ est une valeur propre associée à tAA , on a

$${}^t(AX)AX = {}^tX {}^tAA X = {}^tX(\lambda X) = \lambda {}^tXX$$

3. On a donc par la question précédente $\lambda = \frac{{}^t(AX)AX}{{}^tXX} = \frac{\|AX\|^2}{\|X\|^2}$ est un nombre positif.

Exercice 5

Soient $a_1, a_2, \dots, a_n$ des réels positifs.

1. En appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz aux vecteurs $X = (a_1, \dots, a_n)$ et $Y = (1, \dots, 1)$, montrer que

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 \leq n \sum_{i=1}^n a_i^2$$

2. Etudier le cas d'égalité
3. De même, en supposant que les a_i sont strictement positifs et tels que $a_1 + \dots + a_n = 1$, montrer que

$$n^2 \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}.$$

4. Etudier pour ce deuxième exemple le cas d'égalité.

Solution

1. On applique simplement la formule :

$$\langle X, Y \rangle \leq \|X\| \|Y\|$$

On a donc

$$\sum_{i=1}^n a_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^n 1^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

ce qui donne bien une fois l'inégalité mise au carré

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 \leq n \sum_{i=1}^n a_i^2.$$

2. Le cas d'égalité de l'inégalité de Cauchy-Schwarz correspond au cas où X et Y sont liés, c'est à dire lorsque tous les a_i sont égaux.
3. Cette fois on prend $X = (\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_n})$ et $Y = (\frac{1}{\sqrt{a_1}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{a_n}})$. On a alors par Cauchy-Schwarz

$$\langle X, Y \rangle = n \leq \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right)^{\frac{1}{2}}$$

et il ne reste qu'à mettre au carré.

4. A nouveau, égalité lorsque X et Y sont liés, c'est à dire qu'il existe un λ réel tel que pour tout i , on ait

$$\sqrt{a_i} = \frac{\lambda}{\sqrt{a_i}},$$

c'est à dire que tous les a_i sont égaux à λ . Sauf que par hypothèse, on a de plus que $a_1 + \dots + a_n = 1$, donc nécessairement les a_i sont tous égaux à $\frac{1}{n}$.

Exercice 6

Soit $E = \mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique et f l'endomorphisme de E dont la matrice dans la base canonique est la suivante :

$$A = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

1. Donner une base du noyau et de l'image de f .
2. En déduire que f est une projection orthogonale.

Solution

1. Avec les calculs qu'on a fait assez de fois montrant que $\ker(f) = \text{Vect}\{(-1, -2, 1)\}$, et $\text{Im}(f) = \text{Vect}\{(5, -2, 1), (-2, 2, 2)\}$.
2. Démontrer que f est une projection orthogonale, c'est démontrer que $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont orthogonaux, et on vérifie en effet que $(-1, -2, 1)$ est orthogonal aux deux vecteurs de base de $\text{Im}(f)$.

Exercice 7

Soit $\mathbb{R}_2[X]$ l'espace vectoriel des polynômes de degré plus petit que 2.

1. Montrer que la formule

$$\langle P, Q \rangle := \int_{-1}^1 P(x)Q(x)dx$$

définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}_2[X]$.

2. Construire une base orthonormale pour ce produit scalaire, à partir de la base canonique $\{1, X, X^2\}$ de $\mathbb{R}_2[X]$.

Solution

1. La formule définit bien un produit scalaire :
 - C'est évidemment une forme bilinéaire symétrique sur $\mathbb{R}_2[X]$, par linéarité de l'intégrale ;
 - Elle est définie car si $\langle P, P \rangle = 0$, on a

$$\int_{-1}^1 P^2(x) dx = 0,$$

donc $P^2 = 0$ une fonction positive et continue est d'intégrale nulle si et seulement si elle est nulle, donc $P = 0$.

- Positive car bien sur pour tout polynome P ,

$$\langle P, P \rangle = \int_{-1}^1 P^2(x) dx \geq 0$$

car il s'agit d'une intégration de fonction positive.

2. On part de $1, X, X^2$ qu'on l'on normalise avec le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt.

On normalise 1 : on a $\langle 1, 1 \rangle = 2$, donc on pose $P_1 = \frac{1}{\sqrt{\langle 1, 1 \rangle}} 1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

On utilise le processus habituel ensuite en posant

$$P_2 = X - \langle P_1, X \rangle P_1$$

mais on aurait pu se rendre compte avant que $\langle 1, X \rangle = 0$, on obtient tout de même $P_2 = X$ et on normalise à nouveau pour trouver le deuxième vecteur de base

$$P'_2 = \frac{1}{\sqrt{\langle P_2, P_2 \rangle}} P_2 = \sqrt{\frac{3}{2}} X.$$

On recommence pour le 3ème vecteur de base : on pose

$$P_3 = X^2 - \langle P_1, X^2 \rangle P_1 - \langle P'_2, X^2 \rangle P'_2.$$

On calcule donc et on obtient facilement $\langle P_1, X^2 \rangle = \frac{\sqrt{2}}{3}$ et $\langle P'_2, X^2 \rangle = 0$. On a donc

$$P_3 = X^2 - \frac{\sqrt{2}}{3} \frac{1}{\sqrt{2}} = X^2 - \frac{1}{3}$$

et il ne reste plus qu'à normaliser le vecteur pour qu'il soit de norme 1, c'est à dire poser

$$P'_3 = \frac{1}{\sqrt{\langle P'_3, P'_3 \rangle}} P_3 = \sqrt{\frac{5}{8}} (3X^2 - 1)$$

et donc une base orthonormale est donnée par

$$\mathcal{C} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}} X, \sqrt{\frac{5}{8}} (3X^2 - 1) \right\}.$$

Exercice 8

Soit E un espace euclidien et f un endomorphisme symétrique de E tel que pour tout $x \in E$, $\langle f(x), x \rangle = 0$.

1. Quels sont les valeurs propres de f ?
2. En déduire que f est nul.

Solution

1. Si λ est une valeur propre de f , on a pour tout vecteur propre associé x

$$\langle f(x), x \rangle = \langle \lambda x, x \rangle = \lambda \langle x, x \rangle = \lambda \|x\|^2$$

mais $\langle f(x), x \rangle = 0$ donc comme le produit scalaire est défini, on a $\lambda = 0$. La seule valeur propre possible de f est donc 0.

2. Par le cours on sait que l'endomorphisme f est diagonalisable, avec pour seule valeur propre 0. Cela veut donc dire qu'il est semblable à la matrice nulle, et donc $f = 0$.

Exercice 9

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique. On suppose qu'il existe un $k > 0$ tel que A^k soit la matrice nulle. Montrer que A est nécessairement nulle.

Solution

La matrice A est symétrique, donc par le cours diagonalisable dans une base orthonormée, c'est à dire qu'il existe une matrice P orthogonale et une matrice D diagonale telles que

$$A = PD^tP.$$

Maintenant on a

$$0 = A^k = (PD^tP)^k = PD^k{}^tP$$

mais alors on a $D^k = 0$ et donc clairement D est la matrice nulle, et A l'est aussi.

Exercice 10

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. La matrice A est-elle diagonalisable ?
2. Trouver une base orthonormale de diagonalisation et exhiber une matrice orthogonale P et une matrice diagonale D telles que

$$A = PD^tP.$$

3. Faire de même avec la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Solution

1. La matrice A est symétrique donc diagonalisable, et même dans une base orthonormée.
2. On commence par diagonaliser comme d'habitude : on trouve le polynôme caractéristique $\chi_A = -(X+3)(X-3)^2$ et on voit après un petit calcul supplémentaire que

$$E_3 = Vect\{(1, -1, 0), (1, 0, -1)\} \quad \text{et} \quad E_{-3} = Vect\{(1, 1, 1)\}$$

Il reste à appliquer le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt à tout cela, comme on l'a fait à l'exercice 7.

On normalise le premier en posant $e_1 = \frac{1}{\sqrt{\langle (1,1,1), (1,1,1) \rangle}}(1, 1, 1) = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$.

On construit le deuxième vecteur à partir de $(1, -1, 0)$:

$$e_2 = (1, -1, 0) - \langle (1, -1, 0), (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}) \rangle (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}) = (1, -1, 0)$$

car oui, ils sont déjà orthogonaux, il ne reste plus qu'à normaliser et poser

$$e'_2 = \frac{1}{\sqrt{\langle (1, -1, 0), (1, -1, 0) \rangle}}(1, -1, 0) = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}, 0).$$

On finit par construire le troisième vecteur :

$$\begin{aligned} e_3 &= (1, 0, -1) - \langle (1, 0, -1), (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}) \rangle (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}) \\ &\quad - \langle (1, 0, -1), (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}, 0) \rangle (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}, 0) \end{aligned}$$

Et on trouve donc $e_3 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1)$. Il ne reste plus qu'à le normaliser, et on pose donc

$$e'_3 = \frac{1}{\sqrt{\langle (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1) \rangle}}(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1) = (\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}}).$$

On a donc notre base orthonormale de diagonalisation $\mathcal{C} = \{e_1, e'_2, e'_3\}$ et d'après le cours, en posant

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{-2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad D = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

on a bien $A = PD^tP$.

3. On fait la même chose avec B . D'une part elle est symétrique, donc diagonalisable en base orthonormée d'après le cours. On trouve comme polynôme caractéristique

$$\chi_G = -(X-3)(X-6)(X-9)$$

et comme sous espaces propres respectifs $E_3 = Vect\{(2, 2, -1)\}$, $E_6 = Vect\{(-1, 2, 2)\}$, $E_9 = Vect\{(2, -1, 2)\}$.

Reste à orthonormaliser, et à nouveau avec le procédé de Gramm-Schmidt on finit par aboutir par exemple à la base

$$\mathcal{C} = \{(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{-1}{3}), (\frac{-1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}), (\frac{2}{3}, \frac{-1}{3}, \frac{2}{3})\}$$

et donc en posant

$$P = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{-1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{-1}{3} \\ \frac{-1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

on a bien $A = PD {}^tP$.