EXAMEN

INSTRUCTIONS. La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, *la clarté et la précision des raisonnements* entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. Toute réponse non justifiée ne recevra aucun point. Tous les documents papier sont autorisés ; les appareils électroniques sont interdits.

Exercice 1 (Espaces de configurations). Pour $n \geq 1$, l'espace de configurations de n -points d'un espace topologique X est le sous-espace

$$\text{Conf}_n(X) := \{(x_1, \dots, x_n) \in X^n ; x_i \neq x_j \text{ pour } i \neq j\}$$

de X^n .

- (1) Décrire le type d'homotopie des espaces de configurations de points $\text{Conf}_n(\mathbb{R})$ de $\mathbb{R}$, pour $n \geq 1$.
- (2) Montrer que l'application continue

$$\begin{aligned} p_i : \text{Conf}_n(\mathbb{R}^d) &\rightarrow \text{Conf}_{n-1}(\mathbb{R}^d) \\ (x_1, \dots, x_n) &\mapsto (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, x_n), \end{aligned}$$

qui oublie le i^{e} point, est une fibration, pour $n, d \geq 1$ et décrire sa fibre.

- (3) Montrer que, pour tout $n \geq 1$, les espaces de configurations $\text{Conf}_n(\mathbb{R}^2)$ sont connexes par arcs et que leurs groupes d'homotopie supérieurs $\pi_k(\text{Conf}_n(\mathbb{R}^2)) \cong \{0\}$ sont triviaux, pour $k \geq 2$.
- (4) Montrer que l'espace de configurations de points $\text{Conf}_2(\mathbb{R}^d) \sim S^{d-1}$ est homotopiquement équivalent à la sphère de dimension $d - 1$, pour tout $d \geq 1$.
- (5) Montrer que la fibration $p_i : \text{Conf}_n(\mathbb{R}^d) \rightarrow \text{Conf}_{n-1}(\mathbb{R}^d)$ admet une section, c'est-à-dire une application continue $s : \text{Conf}_{n-1}(\mathbb{R}^d) \rightarrow \text{Conf}_n(\mathbb{R}^d)$ telle que $p_i \circ s = \text{id}_{\text{Conf}_{n-1}(\mathbb{R}^d)}$.
- (6) Montrer qu'il existe un isomorphisme (bijection dans le cas $k = 0$)

$$\pi_k(\text{Conf}_n(\mathbb{R}^d)) \cong \prod_{j=1}^{n-1} \pi_k\left(\bigvee_j S^{d-1}\right),$$

pour $d \geq 3, n \geq 1$ et $k \geq 0$.

Exercice 2 (∞ -catégorie). Dans une ∞ -catégorie $\mathfrak{X}$, on appelle *objets* ses 0-simplexes $x \in X_0$ et *morphismes* ses 1-simplexes $f \in X_1$. Un morphisme $f \in X_1$ a pour *source* $x := d_1(f)$ et *but* $y := d_0(f)$; on le note alors $f : x \rightarrow y$. Pour tout objet $x \in X_0$, on appelle *morphisme identité* de x le 1-simplexe $\text{id}_x := s_0(x) : x \rightarrow x$ image de x par l'application de dégénérescence $s_0 : X_0 \rightarrow X_1$.

Deux morphismes $f, g : x \rightarrow y$ sont *homotopes à gauche*, noté $f \sim_G g$, s'il existe un 2-simplexe $\sigma \in X_2$ tel que

$$\partial\sigma = (g, f, \text{id}_x) \quad \begin{array}{ccc} & x & \\ \text{id}_x \nearrow & & \searrow g \\ x & \xrightarrow{f} & y \end{array}$$

et ils sont *homotopes à droite*, noté $f \sim_D g$, s'il existe un 2-simplexe $\tau \in X_2$ tel que

$$\partial\tau = (\text{id}_y, g, f) \quad \begin{array}{ccc} & y & \\ f \nearrow & & \searrow \text{id}_y \\ x & \xrightarrow{g} & y \end{array}$$

Dans la suite, on admettra que ces deux relations sont équivalentes.

- (1) Montrer que la relation d'homotopie à gauche sur l'ensemble des morphismes de x vers y est une relation d'équivalence, pour toute paire d'objets $x, y \in X_0$.

On note $\iota: \Delta^0 \sqcup \Delta^0 \rightarrow \Delta^1$ le morphisme d'ensembles simpliciaux défini par le coproduit $\iota := \iota_0 \sqcup \iota_1$ des deux morphismes $\iota_i: \Delta^0 \rightarrow \Delta^1$ définis par $0 \in \Delta_0^0 \mapsto i \in \Delta_0^1$, pour $i = 0, 1$. On note $\mathfrak{Y}^{\mathfrak{X}} = \mathfrak{Hom}(\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}) = \text{Hom}_{\Delta\text{Ens}}(\mathfrak{X} \times \Delta^\bullet, \mathfrak{Y})$ l'espace des morphismes de $\mathfrak{X}$ vers $\mathfrak{Y}$. Pour toute paire d'objets $x, y \in X_0$, on définit l'espace des morphismes de x vers y comme l'ensemble simplicial $\mathfrak{X}(x, y)$ obtenu par le produit fibré (pullback)

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{X}(x, y) & \longrightarrow & \mathfrak{X}^{\Delta^1} \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow \iota^* \\ \Delta^0 & \xrightarrow{(x, y)} & \mathfrak{X}^{\Delta^0 \sqcup \Delta^0}, \end{array}$$

où le morphisme (x, y) d'ensembles simpliciaux envoie le 0-simplexe de Δ^0 sur le 0-simplexe $\Delta^0 \sqcup \Delta^0 \rightarrow \mathfrak{X}$ dont l'image de la copie de gauche Δ_0^0 est envoyée sur x et la copie de droite de Δ_0^0 est envoyée sur y .

- (2) Donner une description des 0-simplexes de $\mathfrak{X}(x, y)$ en terme de morphismes de la ∞ -catégorie $\mathfrak{X}$.
 (3) Donner une description des 1-simplexes de $\mathfrak{X}(x, y)$.

On admettra que $\mathfrak{X}(x, y)$ est un complexe de Kan, pour toute paire d'objets $x, y \in X_0$.

- (4) Décrire la relation d'homotopie $\sim$ des 0-simplexes de l'espace $\mathfrak{X}(x, y)$ des morphismes de x vers y .
 (5) Montrer que la relation d'homotopie $\sim$ est équivalente à la relation d'homotopie gauche $\sim_G$.

On définit la *catégorie homotopique* $\text{Ho}(\mathfrak{X})$ d'une ∞ -catégorie $\mathfrak{X}$ de la manière suivante. Ses objets sont les objets X_0 de $\mathfrak{X}$ et ses morphismes sont les classes d'équivalence $[f]$ de morphismes $f: x \rightarrow y$ pour la relation d'homotopie mentionnée aux questions précédentes. On définit la *composition* $[g] \circ [f]: x \rightarrow z$ en remplissant le Λ_1^2 -cornet $(g, -, f)$ de $\mathfrak{X}$ par un 2-simplexe $\omega \in X_2$ et en posant

$$[g] \circ [f] := [d_1(\omega)].$$

- (6) Montrer que cette composition est bien définie et associative.

Les *morphismes identités* de la catégorie homotopique sont les classe d'équivalence $[\text{id}_x] = [s_0(x)]$ des identités de la ∞ -cartégorie $\mathfrak{X}$. On supposera dans la suite que ces données forment bien une catégorie. La *catégorie fondamentale d'une ∞ -catégorie $\mathfrak{X}$* est la catégorie fondamentale $\tau_1(\mathfrak{X})$ de son ensemble simplicial sous-jacent.

- (7) Montrer qu'il existe un isomorphisme naturel $\tau_1(\mathfrak{X}) \cong \text{Ho}(\mathfrak{X})$ entre la catégorie fondamentale et la catégorie homotopique des ∞ -catégories.

Un *foncteur* entre deux ∞ -catégories $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{Y}$ est un morphisme d'ensembles simpliciaux $F: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$. On admettra que l'espace des foncteurs $\mathfrak{Y}^{\mathfrak{X}}$ est une ∞ -catégorie. Une *transformation naturelle* $\alpha: F \rightarrow G$ entre deux foncteurs $F, G: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ est un morphisme de F vers G dans l'espace des foncteurs $\mathfrak{Y}^{\mathfrak{X}}$.

- (8) Montrer qu'il existe un isomorphisme naturel d'ensembles simpliciaux

$$\mathfrak{N}\text{Fun}(C, D) \cong \mathfrak{N}D^{\mathfrak{N}C},$$

où C, D sont deux catégories, où $\text{Fun}(C, D)$ est la catégorie des foncteurs de C vers D et où $\mathfrak{N}$ est le nerf d'une catégorie.